



Biblioteka przyrodzoza
Komitetu Naukowego
Akademii Umiejętności w Krakowie

L. Inw. 530
Nr. porządk. Skł. 1221-5





ПЕЧАТНИЙ ЗАВЪДЪ
ВЪ САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГѢ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ



JACOBUS THEODORUS KLEIN
 Secr. Civ. Gedan.
 Reg. Soc. Angl. Sodalis.
 Aet. LIX.

Seslingh. 1743. 2. 1/2.

IACOBI THEODORI KLEIN
 HISTORIÆ
 PISCIIUM
 NATURALIS

PROMOVENDÆ
 MISSUS PRIMUS

DE
 LAPILLIS EORUMQUE NUMERO
 IN
 CRANIIS PISCIIUM,
 CUM PRÆFATIONE:

DE
 PISCIIUM AUDITU.

ACCESSERUNT
 I. ANATOME TURSIONUM
 II. OBSERVATA IN CAPITIS RAIÆ.

Virgil. V. Zueid. 229.

Dixit: eumque inis sub fluctibus audit omnis Nervidum Phorocque Chorus.
 CUM FIGURIS.



GEDANI, LITTERIS SCHREIBERIANIS. 1740.



H. Boerhave, Epist. Thesauro rer. natur.

A. Sebæ præmissa.

Quid habet homo, in quo suavius semet oblectet, quam ut sensuum ope cognoscat ea, quæ adorandus unice, & omni amoris tene-ritudine diligendus, naturæ Autor creavit in u-sus mortalium, horumve curiosæ objecit con-templationi? Facultates certe organorum mira-biles, sensibus nostris liberaliter adeo datæ, spe-culationi huic famulantur inprimis, quo men-tem ducant in cognitionem corporum, quibus instruitur ornaturque rerum universum.

REGIÆ
SOCIETATI LONDINENSI
IN AMPLIFICANDIS HUMANI GENERIS
OPIBUS
LONGE CELEBERRIMÆ

ILLUSTRI SOCIETATI
VESTRÆ annis abhinc aliquot
adscriptus, quod insigni Benevolentia Ve-
stræ debeo, amplissimis Nominibus Ve-
stris meditationes meas qualescunque pe-
culiari scripto demisse offero. Quum res
non adeo obvia, nec admodum trita sit,
quam mihi examinandam sumpsi, non nisi
primas ejus in præsentî ducere lineas mihi
licuit. Cum DEO & die forte Supple-
menta

menta quædam non minus curiosa & gra-
ta subjungam. Ceterum, quicquid est
Opellæ hujus, limatissimo Vestro Judicio
eo libentius subjicio, quo certius confido,
Vos pro solita Humanitate Vestra cona-
tum meum in re quidem tenui, sed ardua
satis, nec ab aliis in antecessum trans-
acta, æqui bonique consulturos esse.

Nihil mihi pretiosius fuerit Favore
Vestro, VIRI omni Venerationis & Ob-
servantiæ cultu prosequendi. Hunc fa-
vorem à VOBIS mihi enixissime expeto,
quem officiis paratissimis & summo in pro-
movendis scientiis ardore, dum vixero &
valuerò, demereri amitar. Dabam e
Museo pridie Non. Maji MDCCXL.

PRÆ.



PRÆFATIO
DE
PISCUM AUDITU.



§. I.

Pisces dicimus: Animalia apoda pinnis natantia. (a)

(a) Ab hac definitione scilicet sunt: serpentinum genus, pinnis carens: Cancri: Aspidi:
Tettæ: Cochleæ: Comætores: immo Amphibia, sine bipeda, (ut Mamæ Clavi) sine
Quadrupeda, ut Phoca, quæ promiscuè ab Antiquis, non sine rerum confusione,
Pisces nuncupantur.

§. II.

Multa Historia Pisicum interservientis usque adhuc desiderantur: miti-
mus reliquæ: mancanti modo accusantes eorum Historiam Auditis.

§. III.

Evidem, quod ad Cetaceos attinet, qui interna pleraque cum Qua-
drupedibus communia habent, de eorum Auditu, ejusque meatu & Orga-
nis possum apud Autores nonnullas: verum circa Cartilagineos & Spinolios
(quos vocant) res magis obscura, tot licet tractata curis & vigiliis.

§. IV.

An ejusmodi pisces audiant, nec ne? an mentibus auditoriis externis præ-
diti, nec ne? & quænam sint organa auditus? probatissimorum autorum
senten-

sententiae differunt; negant alii, alii affirmant; quidam aucipites provinciarum explanandi depouuerunt.

§. V.

Inter affirmativam & negativam veritatibus nobis semper placuit Affirmativa, animus tamen non est, cum his, qui hunc sensum plicibus denegant, lectam controversiam trahere; non enim gloriam nobis, sed veritatem venari volupe est, quae, si non luce clarior mox apparet, inanibus opinionum nebulis impedita, sepius neglecta manet, & ostentationem assensuque convitiis pervenire neque; multa enim cognoscuntur, quae naturalis scientiae caliganti lucem aliquam fecerant, si non omnia jam deprehendisse crederemus.

§. VI.

Evolvamus in limine opella ipsos autores, & audiamus loquentes de auditu plicium Cartilagineorum & Spinofoorum, ut appareat, quid ab illis sit praestitum, quibus testimonis, experimentis & rationibus vel pro affirmativa, vel pro negativa, usi sint. Sic nemini erimus molesti, nec fraudabimus merita laude Viros consummatos, qui in hac arena ante nos delectarunt; Illi vero, qui praeposere exclament, inaniter collocatam operam nostram, forte lucrabuntur gradus, quibus ad operis huius trunci & mutili, quod credunt, absolutionem ipsi pervenire possint; hoc si praestabunt, pergratum nobis erit, utpote in publicam orbis literati redundans utilitatem.

§. VII.

Inter Principes Celeberrimus *Rajus Lib. I.* quern adiecit ad Historiam Plicum *Willughbeij pag. 3.* scribit: „Plices omnes, praeter Cetaceos & forte etiam cartilagineos, auriculis externis & meatibus auditoriis carere, non solum mihi, sed etiam fides esse videatur;” mox autem addit: „Se demonstrarum, plices omnes audire, quavis, quo organo audiant, nondum fit conperitum.” *pag. 6.* verba ejus sunt sequentia: „Cum aurem plices nervis auditoriis careant, eos audire (si tamen omnino audiant) nobis certe nondum plane constet, quod vero plices Obtusius audiant, quam animalia illa, quae in aere respirant, libenter concesserim.” & paulo post: „Cum plices disciplinae capaces non sunt, (b) hinc sensu disciplinae l. e. Auditui admodum imperfecto donatos esse.” *Willughbejus* in plicibus cartilagineis *pag. 45.* observavit: „Foramina lecus oculum utrumque in os apertum, cuius ultera esse putat, partim ad aquam in os excipendam, quam per branchias iterum expellant, partim ad sonos admittendos, aut

„ditus erant.” Ejusmodi foramina pone oculi angulum posteriorem designat *Cani glauco, p. 55.* Vulpeulaeque *Bellonii lunulata,* auditui forte interviencia *p. 59.* Ipse, ni fallor, Clarissimus *Rajus* foramina *Serrae plicis p. 61.* post oculos meatibus auditoriis esse credit. De *Pastinaca marina Rondeletii Willughbejus p. 67.* hac habet: „Quae ut aurium figuram imitatur, ita eorum fortasse usum praestant, adeo grandia sunt, ut minimum digitum facile admittant, inque os ipsum pervolant.”

& in *Raje* levis undulata Cerebro *p. 76.* offendit praeter nervos olfactorios aliud par nervorum, quos auditorios putat, qui in duo Corpora glandulosa, gelatinae aut Amylo similia, innumeris ramulis sparguntur, quavis & aliis ramos mittant. Corpora haec Cui foraminum illorum, quae ultra oculos inveniuntur, contigua esse dicunt, unde foramina illa pro meatibus auditoriis habet, & plices hocse auditu gaudere minime dubitat. Ad latera Cerebelli duo offendit foramina in Cranii osse, in quibus latuit substantia Ceruminis aurium; ut praetermittamus *Rajam clavatum p. 74. & 77.* Squatinam *p. 80.* Torpedinem americanam *p. 81.* & plures qui vocantur Cartilaginei, vel Vivipari vel Ovipari. Circa Spinolos nulla apud peripisciscissimum *Willughbejum,* quantum legimus, mentio fit meatibus auditoriis, nisi quod superiora ex quatuor foraminibus majoribus in capite *Molz Salicani* fortasse meatibus auditoriis esse connotaverit. Ceterum *Zelliani Lib. IX. Cap. VII.* sensu audiendi accerrimo esse Lupum, Chiron, Salpam, mugilem dicit; De *Rondeletio* infra.

(b) An plices omnis disciplinae adeo incapaces dici queant, huiusmodi: Causum eorum agunt Testimonia de improbandis ad Obitum, in sequentibus sphis proleat.

§. VIII.

Aucipitem in spho precedenti audivimus Clarissimum *Rajum,* num Plices audiant, nec ne; nihilominus tamen circa initium *Capituli IV. Libri I.* de Plicum auditu amplectitur illorum sententiam, qui plices omnino non audire statuunt, eumque in finem *Rondeletium Lib. IV. cap. 9. & Lib. VII. serv. 45.* ad dicenda testimonia de plicibus auditu sonitu Campanae accurrit; tunc cibi capiendi gratia & similibus experimentis, productis, solummodo modum (rem utriusque altioris indaginis) se ignorare fatetur; *Rondeletio* vero eumque secuto *Kircher* dubitis, an foramina ante oculos posita organa esse, verisimile ipsi videatur; Nec obstat, quod in appendice ad *Willughb. p. 22.* circa experimenta de plicium auditu iniecerit dubium Clarissimus *Rajus;* cum ipse quidem cautela, ut tolli queat dubium, addat, de qua §. sequ. circa finem.

§. IX.

Neque Plinio ignota fuerunt ejusmodi experimenta de congregandis ad certum sonitum piscibus, qui H. N. X. 79. hac habet: „Pisces quidem auditum sonitum habent nec foramina, audire tamen eos palam est; utique nec membra habent nec foramina, audire tamen eos palam est; utique cum pluri congregari ferat ad cibum conivertunt in quibusdam vivariis spectatur, & in piscinis Calaris genera piscium ad nomen venire quosdam lingulos, Inter plures de ejusmodi experimentis testimonium ferentes, addimus adhuc Marcum Aurelium Severinum, Rondelletum & Robertum Boyleum. Severinus de respirat. pisc. disputat. Prima pag. 51. a. meminisse piscium aliorum in vivariis Historum Campanae solennis cibatus monti, medium in locum, Sodalium Cenobitarum more, rapide convehunt; & post q. non solum ad Alitum qui tradidit Aconitum, sed & ad Rondelletum, Alotus ad vespertinam, „sonos vilas exire atque gessere, & demum ad Andr. Laurentium in oper. anat. hist. q. 65. p. 41. „pisces optime audire noverint illi, qui mugilum nocturne interfuerint venationi, Ipse Rondelletus p. 106. extra dubium ponit, quod plane constet, audire pisces; hinc p. 107. hac habet: „quomodo permulti pisces cicures facti adhuc ad nos vocati, nisi audiant? experimenta mox addens, quod non procul ab Ambiano in villa quadam Divi Antonii Trocha nutritur, quae vocata ad cibum properat, & de manu capit; Glani pariter & Cyprini in vivario adium nobilissimi Viri a Janaco pulato NB. pariete ad cibum confugiant. Boyle vero historia de piscina in hortu prope Genium, cuius pisces ab hortulano, quem videre nequeunt, certo sono convocantur, *Boyle Works P. III. p. 41.* hac est: „There is a pond on this side of a hill, where the wall being so high, that men could not look over it, nor be at all seen over it by the fish in the ponds, yet that he (an credible person) has several times observed these fish to be called together by the Gardener with a certain noise he made forthat purpose; neither this Gentleman, nor one else, could be discover'd by the fish, that readily, obey'd the summons. Quodsi hac testimonia Excellentissimo Rati innocuissent, nulli dubitamus, quin aliqua parte captivam inde tenuisset, se non frustra cautulam de piscibus, pullanda campanam ad eam convocandis, in appendice ad Willigbheji H. Pifion Nat. pag. 25. proposuisse; verba ejus hae sunt: „si campana pone parietem collocaretur, & nihilominus ea pulsata & latibus egressi pisces eo se recipiant, unde sonitus exiret, Nec silentio praetercamus Praxidum, relinqueretur dubitandi locus. Nec silentio Ducissa Helstatie horum Adonidis referens, ubi Cyprini laci ad tinnium campanae portatilis, quaque

cuniqua hora diurna pulsaverit, in Ichthyotrophio convocantur, ac illico congregantur cibatus causa.

§. X.

Ex dictis igitur apparet, quosdam Autores hasitare, plurimos in eo convenire, quod pisces audiant. Omnibus nihilominus tamen non certo constare, quae parte audiant; & licet Severinus post Julium Casarium Placentinum lapillos five Officula, pro organis internis auscultatoris agnoscat, externum tamen meatum auditus nullum manifestum piscibus esse dicit; retineamus ipsius verba, quod autor non in omnium manibus est: quae pag. 32. b. sic sonant: „Audire pisces palam est atque intervallo. Est enim quaedam intervallum auditui eorum, sicuti aer auditui terrestrium, ut traditur ab Aristotele, secundo de Anima. Nulla tamen pars ei est manifesta, quae sensus minuitret audiendi; &c. de organis vero internis pag. 35. hac habet: „Facultatis auditoriae (piscis) non sunt expertes, sed quantum horum natura capit, participes, constantibus auscultatoris „Organis internis apprimere nobilibus, quorum unus, cum sit lapillus malleo respondens sensus percussorio. hic capite gestus suam facit audiendi promptitudinem; quod adnotavit „Aelianus lib. IX. cap. 7. & si reclamare facilius Andreas Gessalpinus in 5. quest. peripatetic. „

§. XI.

Ecce difficultates permixtae! quae etiam Willigbhejm in dubio reliquerant, an oblongum in utraque ultima fronte parte oculis proxima insculptum foramen Zyganx auditui Obstruere aut utriusque (addidit forte Clariss. Ravius verba ut arbitror) intersit: similes difficultates etiam Julium Casarium Placentinum in declaratione Tabulae XII. p. 217. Pentathefei a recta, quam incedere potuisset via deduxerunt, ut circa meatus auditorios Lucii piscis in ipsis Olactioris detegendis nimis occupatus fuerit, quem ea propter Clariss. Willigbheji Lib. de anatomico Cerebri (ubi Willigbheji p. 6.) nominetis, quafi unicus sit, qui in hunc errorem incedit, notavit. Neque Beatus Artedus, Saecker, cuius praematuram mortem dolemus, has difficultates superavit, etiam si plures pisces, vivos praeterim, dissecuerit, quin potius in Ichthyologiae Parte II. p. 19. §. 45. sententiam tulit: „Pisces cetaceos omnes meatus auditorios externe habere, reliquos vero omnes iisdem carere, & consequenter sonos sine voces non videri percipere, praecipue, cum vocales non sunt; nihilominus tamen pag. 22. concedit, pisces Obstruere quodam auditui sensibus articulas exaudire putat. Praeternitimus hac, nec hoc loco examinare volumus, an tuto asserere poterit, nullos pisces praeter Cetaceos vocales esse, quod vel Lamiz vel Cobitides fluviales adeo insoni non sunt. Mutuus pariter Petri Marryris Lib. XVI. Hist. Nat. c. 37. relationem de piscibus

piscibus canonicis, nec non piscem Hajul, qui capus ejulare (*Newhoff. Chir. p. 380.*) & Scorpium, qui Gallus marinus See-Hahn & gallulare dicitur imminente tempestate. vid. *Micraelii Pomeran. Lib. VI. §. alior.*

§. XII.

Auditis itaque Virorum celeberrimorum rationibus in utramque partem collatis, perpenis quoque eorundem Testimonis de experimentis circa Auditum piscium, in illorum castra transimus, qui piscibus sensum auditus tribuunt, idque eo libentius, quo probabilius nobis videtur, Agere, in qua degunt pisces, intervallum ipsis nullo impedimento esse ad audiendum, quin potius, argumentis delumpto ab homine, qui sonos verbaque in contiguo hypocausto incedentes per parietem audire non solum, sed & intelligere potest, in eo simul confirmamur, Pisces nec obtusius (§. 7.) audire, quam reliqua animalia, sed æque perfecto auditu, sibi proprio, præditos esse, ac alia animalia perfecte audiunt. Inter hæc forte dantur plura furdastia, quam inter pisces obtusius audientes. Nemo sane dixerit: Pisces inprimis ejusmodi Carellaginos, quorum integri oculi singulati membrana, licet tenuissima, clausi, ex gr. Galeum Acanthium live Spinacem in aqua obcurtus videre, vel omnes debilius ofascere, quam reliqua animalia in libero iere. Porro autem, non concessio, pisces obtusius audire, feryerunt tamen, quod habeant Organa auditus, meatusque auditorios, quibus medianibus morus tremulus ad organa, vel debilis sensus auditus, peringere possit, licet difficillime meatus in plurimis piscibus fuit demonstrandi, quod longe sunt subtiliores meatus externis piscium Cetaceorum valde subtilibus.

§. XIII.

Sunt præterea, quibus in mentem venit: Pisces non nisi exferro capite & aperto ore manes audire, dum verò capita demittunt, cum reliquis sonum non percipere, illisque os apertum, membranis certis medianibus, loco meatus auditorii esse; probabilius enim ipsi videntur, pisces aperto ore extra undas, quam per cutem à lateribus audire; quasi vero tympanum reliquorum animalium non sit curatissimum, vel (si in re ardua ludere liceat) quasi surdiorum illas piscium excubitis nocte divilis, exferro capite o-que aperto, Natura privative facultatem audiendi, ad modicum temporis spatium concesserit, ut scilicet Excubitores, audita hora, a stationibus liberari possint, qui, à capita demittunt, facultate audiendi rursus privantur.

§. XIV.

Circa Lapidum, sive Officulorum in Craniis Piscium eorumque numeri investigationem, periculum faciemus, an Organa Auditus, Meatusque auditorios, gradatim in clariore luce exponere valeamus, admodum contenti, sibi tentando quædam ostendimus non plane vel integra vel nullius momenti, quod superesse possit, iuxta meritoque Peritissimus in Arte Anatomica nobisque magis ocularis indagandum relinqvemp.

§. XV.

§. XV.

DE

LAPILLIS EORUMQUE NUMERO IN CRANIIS PISCUM.

Communiter dicuntur *Lapilli* Lapidès, Ichthyolithi, quod ad substantiam quasi Siliciam accedunt, nobilissima Porcellanæ inhar in pierisque vel pellucidam vel semidisphanam, unde etiam Gemmae Antiquis dicti; colliti possunt, quam piscium Ossa, vel quæ vocantur arille, spinæve. *Cassero & alii* Officula audiunt. Lapidès Umbra *Aldrovandæ*, sic dicti Lapidès Sr. rinde erit, Lapillos an Officula vocet; extra dubium tamen ponimus, lapillos huius, tanquam partes Constitutivas intra Cranium piscium arte col- ligatos cum Cerebro generari, ac ad certam magnitudinem pro destino volumine piscium, augmenta capere. Si quis ejusmodi lapillos in sedu- lam inquisitionem vocaret, confidimus fore, ut ex laminarum vel fibra- rum numero & crassitudine, pro generum & specierum diversitate, an- modum in arborum truncis scdis circularum numerus annos, quibus vi- ventis planta duravit, indigat. Mirum, quam variis ludant figuris, lapil- losque piscium unius familiæ, ut Lucii cum Salmonibus, &c. Rhombo- rum & Rhomboidalium aliorum, Cobitidum, Alofarum vel Clupeorum, Acllorum & reliquorum, affinitatem quoque figurarum inter se habere; vel enim ad ellipsoideam aliamque in longum ductam, quandoque angulosam, vel ad circulaarem similesque figuras inclinant, forma tantum qua magnitu- dinem, incituras, crenas, radios &c. se distinguunt. *Mercato in Me- ruller. p. 187.* peculiare videntur, natura lapillos in capite piscium gigni, ubi simul pisces aptiores talibus lapillis gignendis, inter quos & paguros (&c.) exponit, nec non materiam, unde fiant, quæ mucosa & glutinosa. *Fallo- pium* reitellens, qui lapidum materiam lapideum in mari succum statuit; *Assalut* vero in *notis suis*, nobis perivadere cupit, lapides in piscibus gi- gipi Bezardicus fir. Modum fendi vel generationem talium lapidum A- liorum iudicio & enucleationi relinqvimus; nobis animus non est, nisi ob- serva-

servationes de Lapillis, eorumque numero & nonnulla phaenomena circa illorum investigationem obvia commemorare.

- (2) Cum *Figuræ Absconque res omnino aliter se habet, conficiunt Wernil. Musium pag. 19. seq. in primis Libellis memorialis incomparabilis Rezaumii in Hist. Reg. Svec. anni 1712, & Supplementum 26. 1715.*

§. XVI.

Antequam autem lapillos, quos ipsi in Craniis piscium hactenus invenimus, eorumque numerum exponamus, evolventes historiam, quor illo- rum & in quibus piscibus antea jam fuerint detec- ti.

§. XVII.

Plinius, Athenæus & Elianus à Salicis & Severino allegari observant lapides in Cerebro Avellorum, aut non nisi Majores duos; Idem Plinius XXXII. H. N. 9. eisdem notavit in pisce Banchi ex Mugilini genere. Phalarchus, Libro de fluminibus, in Scioropide pisce, fluminis Arate, quem Salicinus à nemine visum esse dicit, lapidem grauo similem vidit, adven- sus quartanae febris morbos valde utilem. Bellonius de aquat. mentionem facit lapillorum Umbræ, Spari & Maritimi, qui species est Alcellorum. Sal- vianus in capite Tineæ lapillos binos exiguos observavit. Athenæus Lib. VII. in cerebro Denticis, qui Synodontes Paulo Joco Cap. XII. Mercurius p. 187. Synodontidas in Capite piscis modo dicti Synodontis, sive Denticis, Genime à Plinio dictos, de quibus Mus. Calceolar. p. 96. „quia „in candore splendere quovomodo videantur: formam habent oblongam, „altera tamen parte gibbiam.“ De hoc pisce Fr. Bonifacius carmine de natura aquat. in Routelet. p. 20.

Si quando piscem mandis dōdēq̃a, caverō,

Nūmrum lapides in capite ille gerit.

Nam nūm cum sola distent ætate Synagris

Et Synodon, siet hic major, æt ille minor.

Synagridos geminis geminis Synodontidas ergo

Anteferos, aliqui la bonitate valent.

Plata de Synodontidis, nec non de lapidibus piscis Umbræ, infra §. 29. seq.

Idem Bonifacius de Hepato, pag. 19.

Felle caret —

Sed lapis in Summo vertice durus inest.

item de Cestreo p. 93.

Et gerit in cerebro pharmaca mira suo.

Nam quos reperceris lapides operatus in illo

Nephritum excutient comminuentque quam.

De

De Coracino lapide vid. Aldro. Mus. Metall. p. 795. & Musco Mascardo p. 747. 101.

„Nel capo del Peice Catarina, o Corvo detto da Vene- „tiani, trovai un pietra del nome proprio chiamata, di bianco colore, „se di varie forme, gona all' doli et di intellanti, confer. Mus. Cal- „ceol. p. 96. & P. 16. nota ad In. Cap. VIII. hic

„In Coracini capite „lapillos invenitur, quæ perorum collo pro anulis suspensum rego- „tate & Dentalis pucata lapidibus vic. rurius al-bro. aul. l. Sic quoque ve- „terum Genime Tracoma, Sauræ Sc. prout Synodontida aut piscium

lapi- „norum Draconis, Saur. Sc. In Tiburonum capitebus lapides in- „veniri testatur Hætt. Hætt. Voyage Voy. de Jammara l. p. 23. circa fin. pagine:

„The Stones in the Head of this fish are good for tooth who cannot make „Water, and for pain in the liver, vim. Rochefort calls these stones the „Sclerky, Cervicæ.

„Majera Mascardo p. 140. & Mus. Calceolaria- „mum 196. aliam lapidem in capite Tiburonum agnoscere videntur; in „illo eam sequentia

„I trovai una pietra nel capo del Peice Tiburone „de. Mus. indico, e di color bianco con concava da una parte, in Cal- „ceol. Mus. leguntur hæc:

„Lapis faris mazus, in colore albicus, „sunt poudere gravis & ex parte conc. v. s. quæ in gustaveris, nihil sumis ab „piscis.

„Ejusmodi lapidem a Calceolo arto delatrum nelli sumis ab „Amico ex Mo. coria reduce, qui poudus VI. 3 superat; ut silentio præ- „termissis Percarum lapides, Pharmacopolis familiares, Carpinum purios, „sive trepentes Carologines, quæ & in aliorum piscium laucibus, varianti- „bus falcem figuræ, sive triangulari, sive lent-formi, sive ovali, utriusque „convexa, immixtus ostend. nunt, & plures alios. Hæc. Item adhuc monemus, „nemini audiam. in auctorum parces, quæ duos piscium lapillos, „sive unum par minoritudo. Næpe recentiores, & inter hos Welschius & „Brachius de pluribus solentis fuerunt ille Hætt. I. Ol. XXVIII. in cy- „prius, se minus, coridem in percis, muscels fluv. ar libus, capitibus, in „Chrysephre marina, Thymalis & in fandiis ob tervat; Brachius verò „in Act. Lat. Sue. An 1727. p. 63. non solum Calceolum reliquit piscium, „quoræ lapides colligat, verum etiam coru idem i ximen fluvio: com- „mendavit sequentibus:

„Inter neglectas diuque deinde raris Lithogra- „phis nostræ partes Historiæ selychiorum hanc invenio centeni desor- „bitur enim origam coru & generatious modum, sive ut in æ virtutem „medicam respicias, utriusque igitur est, & a nemine hæc usquam „quod testam, nec eam natum. Per selychios autem intelligo — gemi- „nos quosdam exiguos & candidos lapillos, qui inter plerorumque pisci- „um Crania generantur, & ratione coloris & substantiæ lapideæ inter se con- „veniunt, sed figura atque natura ordine inter se distunt &c.

„Wfl. „turbulent, Lpillos Crani est præterestibus; Archo. in Tr. l. libryol. p. 28. „in capite Percæ fluv. atis balcani duo dissimila oblonga, plana & dura seu „lapideæ testam inveniunt.

P 2

§. XVIII.

§. XVIII.

Julius Caserius Placentinus Pensetbesi p. 217. omnibus palmam præripuit; utpote, qui primus tria paria lapillorum in cerebro Lucii detexit: & si non adulteri nullum involvit periculum, audeamus dicere, neminem *Casero* simul propius ad organa auditus piscium accessisse, via licet, quam pro meatu auditorio elegit, plene regia non fuerit, conf. *ipsius descriptio Tabule XII*. Ejus vestigia laticule videtur *Suerius (supra §. p.)* quod mentionem facit lapilli malleo respondentis sensus percussoris. *Georgius Bucius*, vel ipse *Charleonus in Mantissa anaton. Exercitationum pag. 17. & Quæst. Zoi.* p. 207. nervorum auditoriorum quidem conspicuorum, & Officulorum meminir, an aurem in vesiculis utrinque duos an solitarios deprehenderit lapillos, certo non constat ex verbis: „Nervi auditorii, item sunt conspicui, & in laterum ibidem consilio, vesicula tenuissima, ævoque sunt, in quibus Officula duo auditoria talparum pedibus consimilia reperiuntur.“ De tercio pare, quod Offis lenticularis titulo investitur *Casarius*, nulla apud *Severinum* & *Charletonum* mentio.

§. XIX.

Ut propius ad rem, quam nobis proposuimus, accedamus, sciremur, quod desideratissimi *Bromellii*, Amici olim zelumatiissimi, nec non illustris *Dn. de Heucher* (qui ad *Lutus Thelauri* sui, lapidibus imprimis nobilioribus abundanti, copiam latis amplam lapidum primi Ordinis ex cranio piscium depoluit) exempli excusati, investigationem in ejusmodi lapillos, unice in gratiam Musæi Nostris, susceperimus. Tunc indistincte, prout fortuna tulit, ex variis piscibus, & crudis & coctis, lapillos collegimus, duobus omnino contenti; non enim circa initium Collectionis cogitaveramus, plures in Piscium Cranis dari, quam duos; hinc quoque est, quod Benevolus Lector in Tab. II. quorundam piscium non nisi duos pro hac vice, five unum par, offendit: temporis enim penuria facilem nobis abstinuit, in similibus investigationem resuscitare & reliquos lapillos evocare; iuventis autem nostris *fortius quatuor*, five *duobus Peribus* in nonnullis piscibus, curam nostram cogitationemque in rem inopinatam consulimus, si-mulque varios ex propter consilium auctores, usque dum in manus venerit laudatus *Casarius*; & ecce, Oe, quod appellat lenticularis, animam movebat, ut sedulo & in *Terrium Par* inquiremus. Hoc ligacius Filia natu minimis, sub moderamine nostro, in nonnullis eorum piscium Cranis apprehendit; unde est, quod tandem nobis propolueramus experimentum cum Cranis Cobitidis fluvialis, *Smerling*, & cum Cranis Lucii, *Hechte*, pro duobus extremis inter pisces diversæ magnitudinis assumpsis. Res ex voto succellit; nimirum quæ ex Cranis Lucii, ac ex capitis Cobitidum plurimorum, tria reportavimus Officulorum paria. Quæ autem ratione tractaverimus duo crania Lucii cruda, alterum minus, alterum latis

insigne, & quæ nobis non nisi nostro, quod dicitur, Marte inquirentibus Phenomena sortuito apparuerint, hoc loco prius exposuimus, quam lapillos omnium piscium, quos hæcenus collegimus, exhiberemus.

§. XX.

Medis magnitudinis *Lucii Capite truncato*, Calvariam præparavimus. Tab. I. f. 1. & 2. Ad latera, circa basin Cerebri, deprehendimus utrinque sub. antiam Officam, semipellucidam, Ovalis parumque convexæ figuræ. In verso Cranio, ut magis commode & circumspiciat aperiri possit, sic, ut te nua plane illa particula Offica, apparebat *Vesicula* luteæ diaphana, & alt. quæque, ovalis figuræ, quasi induta, (Vesicula tenuissima *Charleoni* f. 17.) per quam transparebat *lapilli* utrinque bini, major alter, alter minor, in fluido crystallino conspiciunt, pluresque propagines; Vesiculae, in pellicula recentis seminis ex fructu mali Granati comparanda, solutæ, Calvariam in Spir. Vini immerimus, eodem Cerebro, licet minus circumspice, exemplo, fig. 3. *Casarii* Off. lenticulare investigaturi, ad alterum latus inflaram five bullatam vesiculam priori vicinam & anteriori cerebri partem respicientem invenimus, in qua tertii parii *lapilli* transparentes habitabant. Singuli lapilli, five Officula sua habent periclitæ, cum quibus forte nervuli, vel radices tenuissimæ, quæ determinare non aulam, vel alæ utriusque coherent. Tali modo, etiam si Cerebrum superficialiter tractaverimus, tria paria *lapillorum* in situ naturali, inseparabilem nexum cum Cerebro habentium, obtinuimus.

§. XXI.

Uterius *Casarii* experimenta examinari cupidi, sumptimus aliud *Lucii majoris Cranium* Tab. I. f. 1. Cujus in superficie mox offendimus dextra paria foraminum, five foramina externa viginti (*Casarius* non nisi Nates, sed portis pro explorandis ductibus, Seta, quæ a) immissa per foramen d); rursus, parum inflexa in b) serra commovebat cum c) eationem habebant omnia modo dicta foramina amp. copiam inuicem concinabant, & delectant. Nares A. A. A. niaguz, parula, duplici, uterque vel septo obliquo distinctæ utrinque In Narum foramina, ut c) tanto ipso, ut quod uterque foramen lumen incidere possit, membra, prout umbratilis in foramine videri potuit, p. 11. Sinistro (in figura) fig. II. a) foramina immissa serra surrabat sponte in ductum, qui ostenditur ad Cerebrum tendens; Ductus ille parietis orbitæ oculi continetur.

- gus; b) est validus nervus; reliqua in ipsa figura. Tandem per membranam k) fig. 1. quæ tres, vel quatuor lineas densissimas nuda ossa expandit, missum statim in foramen B. fig. 1. Hæc, quæ maximam longitudo, libenter intrabat, sequæ NB. occultabat in Calvaria. Reliquimus eandem in statu quo, & Cranio ad justam menuram figuræ Ildæ serra diviso, ac aperta Calvaria & detecto Cerebro fig. III, serra, prout apparere reflexa, altera extremitate, quæ foramen B. fig. 1. immissa fuerat, distincte osculabatur lapillum secundæ partis fig. 1. a. b) propter umbram, quam ossa Calvarie luminis opposita inducebant, vesicula cum lapillis binis in figura III. b) penicillo distinctius exprimi non potuit. Quenam vero diverticula sint, quæ serra reflexa perreperit, & utrum c) fig. III. Ossis petrosi, aut alius, nescio cuius, vices subeat, peritiores, qui se Anatomicos proficientur, judicent; similiter, quid obliare possit, quo minus major lapillus pro incide, proximus illi minor & longiusculus pro malleo, five percussorio, proximior vero & minimus orbicularis ac creatus pro ossis lenticulari Casserii, five orbiculari, vel loco (spedisi, foramina demum B. B. E. I. pro meatibus Auditorii externis, & vesicula ovalis figuræ, diaphana, §. 20. pro tympano habenda? Officula distinctius sunt hustranda in Tab. II. fig. 1.

§. XXII.

- Ut quoque custodire, quæ fieri potuit, solum ex majori pisce *Cerebrum* (quod in Sp. V. conservamus) appareat, inversum, summaque induritia delineantur exhibemus Tab. I. E. IV. ubi a) *vesiculum* (vel si navis sacculum) in qua Os lenticulare Casserii, b) vero *Vesiculum* cum binis *nas-joribus lapillis*, velut incude & percussorio utrinque, in situ naturali, ostendunt; plexus vel nervulorum, vel cavarum propaginum, vel filamentum, & reliqua, in figura ultro seise offerunt. Quibus omnibus & singulis cum Tab. XII. Casserii collatis, haud difficilem apparet, pro virum nostram infirmate in vestigiis eius omnes contendiisse nervulos nostros, ut rem ipsam in clariore exponeremus luce.

§. XXIII.

Animus nobis est, ut & Cranium Mustelæ maculosæ & ex piscibus cartilagineis Cranium Sturionis diligentius perlustraremus; si res ex voto succederet, post Syllabum Tabule I. *Breviolo Lectori*, quid in his, minimum in alterutro eorumdem observaverimus, rationem reddidit.

§. XXIV.

SYLLABUS TABULÆ I.

Fig. 1. & 2. Calvaria Lucii minoris inversa. (§. 19.)

a. a. a. Denotant corpusculum membranaceum, five vesiculum dis-

- phanam utrinque, in qua bini lapilli, major & proximus illi minor.
- b. b. Ex illis minor, longiusculus, percussorius; in situ naturali. Utrinque sunt mobiles. Reverti si consideratur calvaria, anterior pars est a, posterior vero ß.
- Fig. 3. Cerebrum exentum, in basis confidens; antica pars a, postica ß.
- a. Bullula membranosa, in qua tertius lapillus, five Os lenticulare Casserii transparet.
- b. Idem Officulum exampum ab utraque parte delineatum.
- Fig. 1. Cranium Lucii majoris, five Elocis Plageoplaci *Arædi* (§. 20.)
- a. h. Foramina minora, præter minima: insignera quantitate viscerum humoris succosive deferentia.
- A. A. A. Nares; quas recte descripsit *Arædius*: magnæ, patulæ, duplicem aperturam utrinque habentes, cum distantia notabili inter duo foramina; mox ante oculos fixæ.
- B. Foramen: An meatus auditorius externus?
- i. Membrana: intra Nares apparent, venulis sanguiferis, ramosis, picta.
- k. Membrana: in cavitatem foraminis B. circiter quatuor lineas densissima, structura a membrana Narium diversâ.
- Fig. II. Pars Cranii, juxta meatus auditorios separata, & inversa.
- a. Canalis ad Cerebrum tendens; an ductus Olfactorius inferens? Orbiculi Oculi contiguus; quem sponte transeat serra porcina Foraminis A. E. I. immissa.
- b. Nervus finis validus; similiter Orbiculi oculi incumbens; qualis an Olfactorius? de Nervis Olfactoriis *Arædius* in *Philos. Ichthyol.* p. 43. quod recte transite a Cerebro ad Nares extendantur.
- Fig. III. Calvaria; detecto Cerebro appareat serra, quæ foramen B. fig. I. intra. Antica pars a, postica ß.
- a. Quo loco serra incurvata, altera extremitate corpus membranaceum, five Vesiculum tenuissimam, quæ duo continet lapillorum paria, & notanter lapillum secundæ partis tangit; quæ, dum movetur, jucundo aspectu majorem osculatur, rursusque redit in locum suum.
- b. Corpus illud, quod modo diximus, membranaceum; sub umbra, quam extantia ossa inducebant, dimidio minus pictum.
- c. An pro esse petroso, an pro Criciformi habendum?

Fig.

Fig. IV. Cerebrum externum & inferum, cum nervulis & plexibus propagatum, quoniam observare licuit. Anterior pars a, posterior b.

- a. Vesicula, ubi os lenticulare; versus anteriorem partem cerebri.
b. Vesicula duorum Lapillorum majorum; versus posteriorem partem cerebri.

§. XXV.

Ipsos denique lapillos ex Craniis variorum Piscium desumcos, & a Pare dulcissime proliis ab utraque parte delineatos exposicuri, plerumque Ordinem temporis, quo successivè ex Craniis eruti sunt, observabimus, modo Unicum par, modo duo (vidi §. 18.) modo tria exhibicuri; nulli dubitantes, in omnium piscium Craniis minimum tria & quidem diversa plane lapillorum paria existere; sed patientia opus est exquisitissima, ut experimenta repetere possis oculis digitoque attentis; vel vices multa & varia venatio ad capienda tria paria in craniis Atellorum minorum (Pomochlen, Dorich) instituta, non tamen, nisi unicuique, nimirum par primum, quod mox obvium, repositum; tandem ex detectis latebris, scilicet minutis faculis inter propagines, reliqua duo paria, acu mediante, apprehensa; nec crederes, hæc, cum primo pare comparata, lapillos eximie parvitaris obsovere. Neque suspicaris, *Caryæ Lætas*, omnes lapillos, vel officula in omnium piscium craniis paria loca habere, ubi delitescant. Facilius inveniuntur in capitibus productis piscium spinosorum, & quæ in longiuscula ac lata rostra exeunt; detecto pare primo, sive duobus majoribus oculis, proximi illis à parte posteriore craniis, sunt lapilli pericallorii. Tertium par non procul ab extremo lapidis primi paris, rostrum versus, in singulari quidem membrana, nexum tamen cum reliquis habente, deprehenditur; in aliis craniis ex gr. Cyprinorum similiumque, tria paria actus in antica parte utriusque, ibique intra ossa primæ vertebree proxima & requirere cartilagini opposita quasi sepulta hærent, ut cultro acuto opus habes, ad detegendos faculos, in quibus lapilli; Longe difficilior eorum apprehensio est in nonnullis piscibus cartilagineis, cum horum Crania, inter cartilagineas, quandoque Oleoginolas; quod in capitibus Sturionum ad nauseam usque experti sumus; itaque non statim intermittere vacationem, ubi illico non appereant, quas secturis, piscum gemmæ.

§. XXVI.

SYLLABUS TABULÆ II.

Fig. I. a. Lapillorum tria paria Lucii, sive Elocis, rostro plagioplateo: Hecht.

- b. Major lapillus denovo pictus; ex pisce cocto, in cuius rimula subdidit alter lapillus percussorius. Nam in coctorum piscium

dissectis craniis lapilli secundi ordinis in majorum rimulis, quæ in parte parum concava sunt, (si ellipticam vel aliam in longum ductam figuram habent) vel in foveculis, ab altera parte majorum lapidum conspicuis (ubi ad circulem figuram incitant) rupe vesicula, subsidentes inveniuntur.

- Fig. 2. Salmo nobilis; musculis cinereis; Lachs; reliquorum ex hac familia lapilli parum differunt.
1. Salmo *Arcted* Vnus; vix pedalis; Salmulus; *Gedanesium* Möllitz. Salmones reliquos, imo Truttas, sapore grato & rubedine carnis antecedit; duo paria.
4. Trutta; Fohire; Forelle. Salmonata, Trutta maculis rubris, Lachs-Fohire, similibus gaudet lapillis.
5. Thymallus; Elsche, Elsche; piscis delicatulus; salubrior Trutta.
6. Marena *Schoneveldi*; Marene; piscis in deliciis, tam coctus, quam infumatus; tria paria.
7. Harengus; Hering.
8. Cuculi Species, maris balrici. Vulgo, Scorpæna (cujus tres varietates habemus) & oculus, sub nomine See-Hahn veniunt; duo paria; post tabulam sculpam accessit tertium par.
9. Scorpæna, rictu rante piscatriciis; duo paria; eundem & tertium par.
10. Atellus minor; viridis; maris Balici; grunibone Pomochel; si facilius: Dorich; circa littora *Gedanesium* IX. vel X. species occurrunt, magnitudine corporis, (quidam enim nunquam pedalem longitudinem excedunt) Capitis forma, colore & ceteris diversa; si pro varietatibus habere velis, mihi hoc loco perinde. Tria paria.
11. Lucio-Perca *Gesu*. *Schonev*. Sandat; Sannat; tria paria.
12. Perca major; simpliciter Balich; maxime pedalis sunt longitudinis; tria paria.
13. a. Perca minor; Lacus Tuchelini, sive Tuchum, haud procul a Gedano: Kaulbarich; Horum mentio fit in *Epit. Drayad. Phil. Z.* 320. Pisces sepius ad 8. pollices excreverunt, inque luminis decies sunt; quandoque pro singulis 9. vel 12. pondus grossos, b. Perca minor Vistulæ, Habique recentis. Tria paria.
14. Mustela maculosa; omnium nobilissima; *Schonev*. Quæppe; duo paria.
15. a. Silurus, Wels; parvulus fuit; in magnam molem excreverunt; tria paria.
b. Silurus; cuius caput duos in diametro superavit pedes. Tria paria;

ria; quæ feliciter Illustr. Dn. de Heucher nuperrimè *Varisave* apprehendit, & nobiscum communicavit.

Fig. 16. Rhombus aculeatus, *Schoner. Steinbutte.*

17. Rhombus, sive Paster macula rotundis, miniatris; stricte nobis Plunder; infumaci, nobilissimi *Mentleses* & *Heufes*. Post absolutam tribulam accesserunt reliqua paria.

18. Rhombus squamulosus, non aculeatus, minor; Blatteus.

19. Cyprinus nobilis; Karpe; duo paria; accessit Collectioni nostræ tertium par, quod a Cyprini lati tertio pare parum differt.

20. Cyprinus latus; Brama; Brassem; Pralem; huius congeneres, ut Weischf. &c. lapillos figura similes habent. Tria paria.

21. Carassius, maximè moduli; latissimus; dictus aureus: Gold-Karassch. Tria paria.

22. Carassius, simpliciter Karassch; corpore productiore minor.

23. Capito; *Gedaneusfluss*; Geister; duo paria.

24. Capito; qui Zerta; quod carnem habet aristas plenam.

25. Rutilus; Rubellio, *Schoner. Romage*. Duo paria.

26. Tinca; Schley; medietate ætatis; duo paria.

27. Aculeatus; Stichling; Strehburtel; tanta multitudine capiuntur, ut incolis Iutitz Nehringe in cocturam Olei crassi, vulgo Trahn, cedant.

28. Tobiasius; Tobias. Sandspiring. Accesserunt reliqua paria.

29. Anguilla; Aal.

30. Halcutus; Eneaficholi species; qui Latulus primus: Breidings; prout Sardelle vel Anchovies conduntur sale.

31. Halcutea, qui Latulus alter, Ukeley. Dorso ex viridifusco; quod supra lineam longitudinalem rufus sequitur color; infra lineam ad latera & in ventre argenteus. Duo paria.

32. Cobitis, qui est fundulus: Grundling; duo paria.

33. Cobitis nobilissimus, fluviatilis; Smerles; Schmerling; tria paria; sanguis VI. lapilli sunt bis (nimirum ab utroque latere) non solum in naturali magnitudine, sed etiam sub microscopio delicti.

34. Sturio; Stör; ex capite 2 1/2 poli. longo. Tria paria. Lapillus percussorius, huius L. quodammodo similis, nec non os lenticulare simul sub microscopio picti.

35. Barbus; Barbe; fluminis Albis; duo paria. Accommodata manu *Generose Nats* Illustris Domini de Heucher capta. Perenni memoria Ejus exemplum induit, in colligendis pro Genitore piscium

scium lapillis primi ordinis, quorum copiam 1737. Dresdæ vidimus, retineamus, quod ad reliquos investigandos nos excitavit.

§. XXVII.

Spem inieciimus §. 22. ulterius perlustrandæ Crania Scurionis & mustelle macula æ. Periculum sulcepimus. Fig. A. Tab. II. exhibet caput Tab. II. Scurionis ad quodruplum abbreviatum; ubi a) meatus Olfactorii externi, sive N. res, b) vero meatus auditorius ad Opercula Branchiarum, figura cro. centus Lat. Dissecto capite Ductum auditorium periculi sumus intra cranium cartilagineos usque ad corpus membranaceum, in quo tria (Fig. 34. §. 25.) invenimus lapillorum paria. Meatus Olfactorii a, 4.) & ro. ostendimus structuram cavitatis alterius Narium foraminis, (sepro relecto, Capitellum Papaveris satis apprimè referentis, fig. d). Fig. B. s. vero sacculus tertii ordinis lapidis sive Ossis lenticularis; γ γ, meatus auditorius internus cavatus; in statu naturali similes plexus formans quales in Lat. 4. & mustella maculosa observavimus. Reliqua his in Anatomia comparata veritas investiganda relinquinus; ex dictis interim patet, meatus & Organa auditus in picibus cartilagineis pariter se habere ac meatus & organa auditus picium spinosorum.

§. XXVIII.

Li. TAB. III. exposuimus Cerebrum Mustelle Maculose, satis feliciter T. III. ex Cranio desumptum, ita ut maxima pars meningis, s. matris tenuis, appareat.

Fig. 1 Cerebrum in basi condens.

Fig. 1.

a) Vescicula, continens bias lapillos; cum ductibus suis & propaginibus, ubi, ni fallimur, plexus c. c. c. vices canalis semicircularis tubere videntur, quod cavatos deprehendimus, prout in Scurione.

b) Latibulum tertii lapilli, quem hac vice ex vescicula sue solvere nolimus, libentius illatum cerebrum cum propaginibus in Spin. V. conservaturi;

a) anterior, β) posterior pars cerebri.

Fig. 2. Inversum Cerebrum, ubi in Vescicula a) a) lapillus distinctus transparet. b) b) locus tertii lapilli. c. c. c. Canales qui in fig. 1.

a) anterior β) posterior pars cerebri.

Fig. 3. Adjungimus Cranium Perce minoris, in quo foraminula ad auditum sive a) a), meatus olfactorios sive b. b. indigian.

C 2

§. XXIX.

§. XXIX.

Forse, si DEUS vires suppeditaverit, supplementa lapillorum & phœnomena in aliis piscibus obvia, pari alacritate cum curioso doctis communicabimus; Etenim post absolucam Tabulam II. ex plurimis piscibus, quorum non nisi unicum vel duo paria lapillorum modo exhibentur, vel reliqua omnia, vel tertium insuper desideratum lapillorum par obtinuumus. Lapillos ipsos in Capsula quadrata ex Orichaleis lenialis facta, & cera nigra, quantum satis, repleta, gentianorum more, dissoluiimus, parum insuper solliciti, de quorundam perverso iudicio, qui, Aspitana sectantes Condimenta, effusiunt, carne consumpta, piscium Ossis, non nisi scilicet porrigenda esse.

§. XXX.

Restat, ut lapides Umbrae piscis, quem Græci *Dolmus*, sive scianoni dixerint, in Mul. Metall. *Aldrov.* p. 796. & lapides St. Petri in collect. *Vrayss.* *Tentam.* XVIII. p. 612. quorum mentionem §. 16. fecimus, paulo propius consideremus. De ipso pice Umbra Autores discrepant, prout pluribus legere licet apud *Aldrov.* de *Piscibus* p. 73. *sepp.* Ipse vero *Aldrovandus* Umbræam Coracino simillimum esse perhibet, ita, ut Coracinus pro Umbra & Umbra pro Coracino Romæ vendantur, ejusque lapides eandem facultatem cum lapillis Coracini habeant, nimirum contra dolorem Colicorum. vid. *Aldrov.* de *pisc.* p. 13. *Musæo mustaria* p. 146. *Musæum Celestiar.* p. 26. & *Paul. Jov. cap. VIII.* unde *Belonus* de *agat.* p. 113. quod pragensis hujus piscis enclitus aurifici argento inclusos, divendendos solcant, appellentque *Pierres* de colique. *Bouffuetus* vero *alk. l. p. II.* præsertim contra nephriticos dolores utiles prædicat:

In pretio Umbra etiam nunc est, velut extitit olim,

Divitibus liquidem comperit iste cibis.

Ejus enim caro siveis & est, & candida, qva fit

Albui jus fieri qva & Gelatina solet.

In capite inventi lapides conferre feruntur

Arqva morbo, nephriticisque simul.

Quin etiam panos saepe intestina scinz

Sqvæmque exusta graviter excutiant.

Similes laudes celebrant *Mercatus Metallib.* p. 187. & *Connercium Litterarum Norimb.* an. 1733. p. 216. Nosrum non est, in virtutes Lapillorum inquirere; tamen tamen poterit *Marchais Vey. de Guinée* l. p. 31. Ubi de lapidibus Coliques, ex Afellorum majorum capitibus (secundum Acoerem) & Bouges, ex Cochles, hæc addit: „On les prend (les Coliques) dans les têtes des mortues; je pensé pourtant, que ces pierres & les „Bouges

„Bouges ont à peu près autant de vertu les unes que les autres, c'est à „dire: peu ou point.”

§. XXXI.

Aldrovandus præter Auratæ & Denariis piscium lapillos in *Mul. Metall.* quinque communicavit Icones, quorum fig. 1. 2. 3. Corvuli live Coracini, scribit, quod sit gibbosus *juxta partem anteriorem*, & *tuberculum quoddam habens, cum appendice, eminentem, juxta partem posteriorem; hanc non multum discrepare à lapide Piscis Umbrae, cum durus & candidus uterque sit, (vid. supra §. 16.) in eo tamen ambo differre, quia lapis Umbrae juxta partem posteriorem aliquantulum bifidus.* Ejusmodi lapides in *Basiliæ Beileri* continuatione Retiorum perperam sub nomine Afellorum veniunt. Cum illis comparanda tria paria qva liberalitati Fautoris, Magnifici Domini *Vasentinus Schreff Consulis* Gedan. debemus. Horum accuratas figuras fieri scribit, qvi Tab. I. Fig. 1. exhibentur lapides, parum & non nisi in inferiore parte tuberculisqve inter se differunt; atamen neque Umbrae neque Corvuli lapides duxeris, quod uterque candidus non est; sed in superiore parte coloris intente pullis in inferiore quasi ex Ochro pollens; interim pices, ex quorum capitibus delampi lapilli, ad unum idemque genus, in Tab. IV. lit. D. D. addimus, nulli dubitamus. Tercium par, quod etiam lapilli in inferiori parte toti candidi, & in superiore parte colore luteo carnis simili, leviter saltem, in eminentis tincti. Absoluit Tabula *Celest.* §. P. *Breyms* nobilium communicavit similen Lapidem, erat autem illi luteioribus aliquantulum ponderosior & major; hunc pro vero Umbrae esse. Alius apud *Eundem* Asiaticum, coloris ignave pulli, irregularis forme & figuræ, levis, quasi sit superioris partis cortex lapideus, in inferiore parte ita granulatus & scaber, ut, impræsis in loco, ubi regulariter tubercula micant, exortiosi passus videatur; observatu dignus, quem ab utraque parte pictum ostendimus in Tab. V. Fig. E.

§. XXXII

Quod ad lapides St. Petri, qui etiam lapides Afellorum in *Collect. Fragtilia. Tentam.* XVIII. vocantur, attinet, satis nobis conperit habuere Afellos majores, Cabellum live Stochilithes, ejusmodi lapides non solum Nauchero, cujus amicam utimur, paucis Sale conditum ex Oceanis superavimus. Hujus lapillis unus cum parte Crani vid. in Tab. VI. Fig. II. & mox dijudicibus, quod plane nullam cum lapidibus St. Petri similitudinem habeant. Quicquid autem sit, illi, quorum figura in alleg.

Tentam. Coll. Vratit. ad An. 1721. Dec. Class. IV. Art. 7. n. 3. exhibentur, vocantur LAPIDES SANCTI PETRI, quod imaginatam faciem humanam repræsentent, in memoriam Petri Piscatoris. Ibidem dicitur, in *Officina Regia Berolinensi substituti in locum Officii Manati*, & cum nobis aliquot abhinc annis inuenerat Beatum Neumannum M. D. & Chemie Practicæ Prof. Publ. celeberrimum, Cranium possedisse piscis, in quo fluctuabant lapides modo dicti, idem Cranium superrime ex liberalitate humanissimi Domini *Conradi*, qui in locum Beati Neumanni successit, nâli funus; quæpropter publicas ipsi reterimus grates. Apero Cranio, duos euidem desumptissimos lapides candidissimos, & nuntiâli pellucidos, aut nihil commune cum simulo crano humanæ faciei habentes; Gemmas potius *Plum Syndontidas* esse suspicamur, quod adeo in candore splendent; Conferatur Tab. IV. ubi a, cranium pronum, b, supinum, c, lapides desumpti & ab utraque parte delineati. Sunt autem Syndontides pisces live Dentices proximi Auratis & Pagnis, Romanæ advecti ex Illyrico Dalmatizque litoribus. *Id genus autem absum Medici magnopere deserviantur*, prout scribit *Paulus Jovius de Romanis piscibus cap. XII.* & ante alios *Petrus Aponeus*, qui *ruinâ ilia tempestate divini Conciliatoris cognomen* (unde forte cognomen Lapidum St. Petri nâli sunt Syndontida) in ea optimarum literarum *strage* promeruit. *Is enim pisces semel coctos, asservatosque & præsertim vorarum conclusos operculis mortiferam qualitatem acquirere, mandantesque certo plerumque veneno inficere, ratione atque experimento deprehendisse affirmavit*; non tamen confundendi sunt lapides St. Petri cum *Pisce Sancti Petri*, live *Circulo Romanorum*, & *Zaphiro Venetorum*, qui e genere piscium planiorum est, similitudine liris, ipsa dorâ acie aculeata, capite extenso, ore latissimo, de quo *P. Jovius cap. XXVII.*

§. XXXIII.

Atque hæc sunt, quæ de PISCUM LAPILLIS compendiò dicenda modo habui. Quodliq. mendarum, quos lubenter evitare cupio, illaque vitæ periculis cuiusdam *Piscium Carisæ quincorum & Spinaforum de sensu à UDI-TUS* ejusque *Organis* minus feliciter egi, veniam in re facis ardua me impenitaturum eo certius confido, quo facilius me oculatoris rem in claritudine exponet, ubi lippitudine me laborasse observaverint. Eandem materiam, inter alia Observata digna in piscibus *Cetaceis* reassumpsi, cum fortuito ad manus venerunt *Tursionem* i. *Phocænarum* Femina prius, postea *Mas*. Horum *Anatomem* videre cupidus cum Viro in excellenti arte Veridissimo *Dochilino*que *Dn. de la Motte* Jun. M. D. & Practico hæc de re conveni. *Vir humanissimus* voto annuens pisces successive in ædibus meis Cultro anatomico subiecit, mihiq. & Amicis præsentibus summa facilitate, quæ demonstranda & quæ investiganda desideravimus, ad oculum exposuit. Gratiæ ac propter publicas Ipse habeo, nec non, quod rogatus Observata conscribere

scribere voluit; unde est quod TIBI, LECTOR BENEVOLE, Schedulam memorialem *Viri Doctissimi*, cui non nisi pauca adjuncta, cum delineationibus rerum huc pertinentium Appendicis loco exponam, tandem Colophonem addent nonnulla a me observata in *Capite Regie* dentibus acutissimis recurvis. Quod autem iusto serius prodierit *MISSUS PRIMUS*, Chalcographis necessitatem imposuit, cunctanter utendi celo. Priorum Tabularum quætor eorum benevolenter in se suscepit Nobilissimus & Generosissimus *CLIFFORTIUS*, Vir ad bene agendum & ad commoda Historiæ naturalis promovenda natus. Curatissime Figura sculpsit venustissime assiluit; nec credo, TE, Amantissime Lector, siquid in Celamine desideraturum; hoc solummodo TE rescire desidero, quod *Vir Optimus* modo cumulataverit, cum, præter omnem præsumptionem vel expectationem, non solum æneas sed & prælo mandatis Tabulas præstas Quætor affectuose ac liberaliter obulci, ut iisdem in gratiam hujus Milis uterer. Pietas ingratitudinis tæbe me laborare judicaret, si TIBI id reciderem, quod *Vir Honestissimus* nunquam publicasset. Omnia simul in Tua commoda, quæ ex publico commodo Tus sunt, redundant, & quodliq. in super Conatus meos TIBI interveniendi qualescunque in bonam accipias partem, iniqui rerum stimulators me non deterrebunt, quin propediem TIBI *Tentamen de PISCIBUS, qui PULMONIBUS gaudent*, ad iustum numerum & ordinem naturalem redigendis exhiberem.

Elianus in Præfat.

Nunquam omnia omnibus placent, aut studio videntur digna omnibus omnia.

I. ANATOME PHOCÆNÆ,

AUCTORE DN. DE LA MOTTE; GEDANENSI, M. D.

Nuperime, die 25. April. a. c. 1739. à - - - - *Jac. Theod. Klein*, rerum naturalium indagatore - - - - ad *Phocæna Anatomien* celebrandam vocatus; consiliis hujus Viri simul fulsus, ut quam accuratissime occurrentia adnotarentur. Quocirca, ut Progressus hujus Sectionis bene cederent, Autores consilio hunc in finem varios, Anatomien *Phocænae tractantes*. Fuerunt itaque Duces nostri Viri Præcellentes: *Wilielmeus*, vel potius *Rogius*, in *Hist. Pisc.* J. D. *Major* in *E. N. C. Edn.* *Tyson* *Anatomy of a Porpoise* London 1692. 4to. J. A. *Kuhn* in *Coll. Vratib.*, *Blasius &c.* Via horum Excellentissimorum Virorum sic frata, vestigia eorum secuti sumus, & quæ à nobis reperta, fideliter notata sunt, hinc & descriptionem nostram qualemcumque anatomicam quam modeste aliorum addimus labori; verum contententia in Sectione nostra cum illorum Virorum Anatomie huc iterum exponere, supervacaneum duximus.

I. *Pisces*, *Fomina*, prius nobis oblati, longitudine erat quatuor pedum ab extremo rostri ad exitum medie caudæ.

Umbilicus egre distingui poterat; & loco leviter notato, cute adipemque remotis, vasis ejus optine conspiciebantur; distabat autem *Umbilicus* 7. pollices à *Vulva*.

II. *Vulvae* latera comitabantur rimæ duæ, quarum dextrum altera, altera sinistrum occupabant latus, *Mammæ* dictæ, de quibus infra.

III. *Foramina* duo subciliis, in unoquoque rostri latere *Nares* designabant, unumque pollicem cum dimidio ab apice rostri, latera versus distans.

IV. *Meatus auditorii* ab oculi cantho exteriori duos remotos erat pollices, foramen formans minutissimum. Cetera ad externa pertinentia elegantiissime descripsi *Major E. N. C. Dec. A. III. Tyson &c.*

V. Adnoto jam Cultro anatomico, cute adipemque separam, *Musculi* vix se præbent, quorum hic describere nonnullos animus est.

Lineæ albe lineamenta aderant à fibris tendinosis amborum rectorum formata.

VI. *Panniculus carnosus* statim sub adipem conspiciebatur, egre verò separari poterat ob fibras per adipem sparsas.

VII. *Musculorum primus* erat *Obliquus ascendens*, longus, gracilis, sine inscriptionibus tendinosis, ruberrimus; carnosa pars duos pollices lata. Oriebatur in ea parte Sterni, ubi pars cartilaginosa secunde Costæ vertebræ Sterno inferius; conjungitur aponeurosi sua cum scapulari minori; finitur juxta *Vulvam* in aponeurosin, quæ caudam usque progreditur; ad

Hypo-

Hypochoondria aponeurosi sua tendens, infra musculum descendente ex-panditur; subcillus tandem evadit dorsum petens.

VIII. *Obliquus descendens* est musculus latus, totus fere carnosus. Oriebatur à mucrone Osis interni; inferebatur musculo recto, cuius fibræ carnes tam antice cum fibris rectis connexæ erant, ut fere vix illa separari percutiant negarentur. Infero ad inferiora accurate investigare non potuimus, obstant enim parces genitales, quas ulterius examinare animus erat.

IX. *Transversalis* est Musculus largus; Oriebatur à costis vertis, sparsas regens, muniensque peritoneum parte sua tam carnosa, quam aponeurotica, terminabatur infra musculum rectum in aponeurosin quasi validam, ubi etiam conjungebatur cum musculo transversali, ab opposito latere proveniente.

X. *Rectus* est Musculus longus, validus, densis stipatus fibris, sine inscriptionibus tendinosis; à humero dexteri apice ortum trahens, rectoque inferius inferiora petens.

XI. *Ventralis anticus* est Musculus largus, novem costis inferius distans, costis suis, septem nempe veris & duabus spuris; oriebatur à primo costæ veræ; tendebat corpore suo supra omnes costas spurias; veras autem ad partem usque cartilaginolam sequebatur; circa finem harum costarum leviter anteatur aponeurosi parte autem carnosa ad vertebrae progrediebatur.

XII. Aderant & *Pectoralis*, *Scapularis*, *Romboideus* alique, quorum verum & jam descriptor in *Phocæna* mare tradituri sumus descriptionem, redabant eam placet adhuc inquirenda; hinc Musculi supradicti cultro jam examinari iugiter.

XIII. Aperimus jam *Abdomen*, intestina solo visu in remota & crassa distans præstant, hic præterea tactu magis manifestantur. *Tenuia* latera præter dextrum obdebant, colore viridi imbuta; Signum præcænet illa putredine infectum fuisse. In latere sinistro intestina crassa situm obdebant, præter carnes prædix.

XIV. *Intestini*, *Intestinum*, *Lienem*, *Pancreas*, *Glandulam magnam Mesentericam*, at a *Mesenterio* *Kodius* locis cit. descripta sunt, invenimus.

XV. *Hepar* in duos divisiu erat Lobos: in summitate horum Lobos præcænet quidam aderat, triangularis figuræ, fere ut Lobus minimus hepatis in homine.

XVI. *Vesicula fellea* invenit nullam, sed loco Vesiculæ alius repperit est ductus mox describendus.

XVII. *Descriptio felle carere*, omnes ferme, quos evolvimus auctores, fidei autoritate Plinii, autumant, hinc accuratissimam Hepatis sulcæpimus anatomien, persuaas, viridem colorem intestina tenuia occupantem, de his

XXX. *Vafa Genitalia*: Penis in vagina recurvus latens, longitudinis duodecim fore pollicum. Ad latera penis similia aderant Officula ut in femina. Testiculi in abdomine abeondis post Sectionem in conspectum veniunt.

XXXI. in capite vermiculorum lumbriciformium amplissima copia, iterum iterumque suis locis reperta, ut & Meatus Auditorius & nervi ad Olfactum.

Hucusque Doctissimus de la Motte.

Additiones.

Ad Nam. 1. *Femina longitudine erat quatuor pedum*: Inter pisces qui vocantur Cetacei, Turfiones minime sunt magnitudinis; rarissime enim Ulas duas cum dimidia, sive pedes quinque, cuiusvisque mensura, superat; in eo quoque a Delphinis differunt, qui saepius decem pedes excedunt.

II. *Foramina duo subtilissima* — *Nares*: vix tantillum amplitudine perexigua differunt a foramine pone oculos utrinque unico, quod est meatus auditorius externus. Illa, Olfactoria foramina, prae auditorio singulari caractere a natura sunt donata: Singulis enim Olfactoris itacula alba sive crinulosa leucaceae quinque vel sex lineas longas, incurvas & unicus, quales ex verrucis faciem humanam aliquando infestantibus oriri solet, alte inhaerent; tales crinuli in pilibus annosis raro non derasi; in fetu vel edito vel exsiccato semper adiacent; in dissectis vero pilibus non nisi in mare ad unicum foraminulum ejusmodi observavimus crinululum illud. addidi alterum Tab. IV. fig. 6 ubi littera a) indigat prae foraminulorum Olfactorii pro externo meatu intervenientium; lit. b, b, b, sunt tres nervi directi, quorum unus alter pro Olfactu. Quosque in figura A, lit. c, d, cernere licet, quippe eorum ductus in rete quoddam nervorum vel in extremos quasi ramulos ramosos & implicatos nervorum b, b, b, super rostrum ex foramine in Osse frontis lit. a), inverso autem Cranio fig. B, ex communi quasi stipite c e e, radiato in cerebro, procedendum terminantur. Hinc est, quod hujus totis nervi confusio propter tenuitatem suam in adipem curatus observari vel evolvere non poterit; nihilominus tamen nulla dubitandi ratio intercedit, quin foraminula bina utrinque externos meatus Olfactus absolvant, & detectorum nervorum vel

T. IV.
fig. 6 a
b.

Fig. A.
c, d.

alter

alter vel plures reliqua officia sensui Olfactus praestent, etiam si Celeberrimus *Rajus apud Willagb. p. 32.* duo foramina subtiliora crani pilis nares suspicatus sit; *Aristoteles autem Lib. J. Hist. Anim. cap. 9. & Plinius H. N. XI. cap. 37. Sect. 50.* Olfactus vestigia negaverint, insignissime licet Delphinis olfacere stantur, quod & *Plinius Lib. X. cap. 70.* de reliquis pilibus profertur, quippe, quod non omnes eadem esca capiuntur, sed prius, quam appetunt, odorantur. Mirum sane! negare Olfactus organa & tamen odorari vel olfacere; idem est, ac si dixeris, olfacere sine Olfactu, vel, idem esse & non esse.

IV. *Meatus auditorius* — *foramen foraminis minutissimum*: Quod ad Delphinus in specie attinet, *Plinius* scribit: „Delphinum audire manifestum est; nam & canes muleantur, & capiuntur, attoniti sono; quantum audiunt, mirum;“ & *Rajus* de Delphino apud *Willagb. p. 29.* „Nullum meatum, neque ad odorandum, neque ad audiendum habet, si Aristoteles credimus, cum tamen odorari & audire certum est. At meatus habere, quibus audit, nos ex Anatome deprehendimus. Hi post oculos sunt tenues admodum & exigui, veluti in vitulis marinis, & multa pinguedine circumrecti, ut vix appareant, sed in calvaria auris internae continuo tota manifesta sit. Alii in Phocaena meritisissimus *Rajus* ipse meatum auditorium non observavit. *Philos. Transact. Epit. II. 842.* ibi: „We observed not in this fish any Ear-holes or meatus auditorii at all, where in alio *Aristoteles* agree with us &c.“ & apud *Willagb. p. 29.* vocat ad *J. D. Majoris Observationem* 20. *E. N. C. An. III.* qd. Olfactui obicere licet, figuram dedit. Ut itaque omnia paulo clarius elucescant, sollicitus pro meo modulo lingua ad Audirem pertinencia investigavi, insum iteras aliquando, pro diversio respectu, figuras fieri, easdemque in gratiam Conosciturum in arte incidi curavi. Ne autem in longum & latum, contra institutum, dilaber, mox figuras ipsas, quantum sufficit, explicamus.

Fig. 1. Integrum os petrosolum a parte, qua meatus auditorius ipsi infertur, ubi lit. a) particula cutis perforat. Foraminulo externo immixtum tenuem setam porcinam, quae in canale, colore ex albo in ceruleum vergens per b, ultra c) intrabat. Crassities hujus ductus circa regionem literae c) apparet, quod reliquum est, adipem gradatentem involutum reliquis, contraster *Tyffonis Phocaena* p. 16.

Fig. 2. Idem os petrosolum a parte avera conspiciunt.

Fig. 3. a & b aliud os petrosolum casti ita divisum; ubi lit. a) malleum eum

D 3

cum tendine suo, lit. b, incudem, lit. c, stapedem explicant.

γ est pars aversa dimidiati Offis petrosi hujus figuræ zeiz sub lit.
β; ubi tria apparent foramina: a, communicat cum b, & c, eff-
que illud idem foramen, quod a, fig. 2.

Fig. 4. Fig. 5. a. Facta connumoda apertura offis petrosi malleus a, altero processu in rimula b, quasi in alveolo mobilis, altero autem processu offi orbiculari flapedis perforati c, incumbens; ubi lintera d, tendit fute for validus, qvi tamen una cum incude pignu non potuit ad evitandam confusionem lucis e umbræ. Ad linteram f. separacim exhibeo a, malleum, b, ossiculum in quo alveolus finitri processus mallei, c.) vero incudem.

Fig. 7. Cochlea a suo tegmine denudata, in magnitudine naturali; foraminulum a) fig. 7. axem cochleae transiens terminatur in foraminulo. a) fig. 7.

Fig. 8. Fig. 9. Cochlea eadem sub microscopio picta.

Fig. 9. Pars offis petrosi (quæ est figura 2, b,) sub oculo armato delineata, vices ni fallor subire videretur Labyrinthi; foraminulum a) fig. 9. meatum communicat cum lit. a) fig. 7. & 8; lit. b) vero est canalis in foraminulo ad basin stapedis exiens; c) nervo designatum foramen.

Hæc sunt, quæ circa organa auditus Phocænz observare potui.

VII — XII. De fibris muscularibus Balene vid. *Pbil. Transact. No. 767. p. 139.* & aliorum piscium *No. 308. p. 191.* Crassiores & longiores sunt Piscium fibræ musculares, quam animalium in acre viventium; quare? vid. *Ibid. p. 106—108.* confer. *Núm. 271. p. 22*

XVII. *Delphinus felle carere* — *autores — autumnum*. *Aristoteles* lib. 2. *Hist. Animal.* cap. 18. *Camelus Delphinoque inesse felle negari* à *quibusdam ait; & Plinius* XI. cap. 37. *felli*. 74. *simpliciter scribit*, *Delphinus felle non habere*; hinc est, quod & *Celeberrimus Rayus* in *Willughb. H. Pisf.* p. 20. de *Delphino* dixerit, *Fel nullam conspici* & *pag. 32. circa finem verba hæc habet*: „Ve-

imposuisse videtur, Phocænam felle, ob absentiam veficæ felleæ, carere, quod non incidit in subsequenter Plinii textum, qui paulo post, nimirum *Secl. 75.* discretis verbis scribitur: „*Serpentibus porcione maxime copiosum (fel) & piscibus est autem piscibusque toto in flumine, sicut Accipitri milos, præterea in jecore est fel & ceteris omnibus vitibus a natum maxime in multo, ceteris vitibus*

Hinc Dnas de la Morre: Illustres Autores a continente ad continentum argumentasse. Audiamus etiam Harduimum in not Plin. Sic 75 ad verba, *utulus galea*, ibi: — Ea quoque animalia, quæ vesicula telis destituantur — affirmare visus est.

(Pim.) lelle carere, hoc est, eo fellic vellicat. anadurke vius est
 nonnulli habere bis receptaculum, quoniam regem conueniunt, can-
 nemque bibulum, quod ab Hepare recte ab in urethrum — sunt
 signum bise fellic vellicat duo. Vellicat et canalis Prius virulo
 marum addunt, *Philosoph. Lib. 2. Itq. animal. cap. 18.* — po-
 terunt, non legat, etiam canalis biliaris non reclarabit in
 urethrum, sed ducit Pancreaticum miferatur. Conferatur iuliper
 C. *Plant. Wygod. Obseruatio in Supplemento IV. Collect. Vratil.*
 1782. pag. 3. *Arctia quoyce in Prib. Ichtyol. pag. 30.* Vellicat
 canalis in omnibus piscibus habet adesse tribuit, sed ad frum
 diversum, ut in Coralligene, in Ph. Hecet, in Wygodani; in *Ichth.*
Relectur Lib. III. cap. XX. In gybus Hepate ipsi (fem) ad-
 heret, vel est in ipsius humum per vengas biliaris tra-
 hens, vel in ipsa est hepatis substantia et in eo fere, immittit
 ut obrutus, ut vix appareat, nisi conquiras erodis.

XXI. *Glandula Mammaria bicus pifci format. Ariftr. Lib. 2. de Effc.*
An. cap. 13. Delphinus non habet papillas mammarias, quadrupedum modo, fed veluti rivulus duos urinae fingulos, ex quibus lac fluit, quod a feclatibus carulis ligitur. *Rondelet. Lib.*
cap. 13. "Non folent Delphini, fed & Balanzæ
 & Tritones, & cetæ papillis
 pectus nuda, ne quid in
 aqua fiant; — Eadem partium fubflantia manans in corpore
 fluat, venis arteriisq; permixtus in corpore glandulofa & adipe
 pore diftribuitur. Lac compreflum exprimitur, quod caruli
 ore excipiunt." *confer. Tyloni Poëana p. 23.*

Vermiculus immensis. Duo eorum in magnitudine natura-
li; tertius, qui longissimus est, sub microscopio, picti, Tab. 7. IV.
V. Fig. 5. albi plures, plerique rubicundi fuerunt; illi videntur
mares, hi Feminae; quod etiam in Lumbricis Laporum observa-
tur. *Trocheta* *A-* *B-* *C-* *D-* *E-* *F-* *G-* *H-* *I-* *K-*

loris; ceterum vermiculi, teretes, insecti, & quasi granulati sunt. Si calculum probabiliter addere licet, reipublica horum vermium sub singulis Ossibus petrosis numerum millenarium longe superaret.

XXVI. *Medullam spinalem.* Hanc cum paribus XXXVI. nervorum solutam & in Tabula lignea explicatam conservo; Cranium quoque alterum Phocenz maris ita præparatum est, ut non solum meatus auditorii, verum etiam nares, prout delineati, illi conferventur.

r. IV.
fig. C.

XXVII. *Pennis.* Hujus figuram cum altero testiculo & vesica, dimidio abbreviati Fig. C. Tab. IV. ostendit; ubi a, Testiculus, b, vesica, c, vasa seminalia, d, Ossiculum alterum, quale ad latera mammarum Feminz num. XXII.

- - D.

XXIX. *Ductus Thoracici.* Hunc ex more ad naturalem magnitudinem delineatum publici juris facere operæ precium fore judicavi, Tab. IV. Fig. D.

Ibid. *Vena subclavia manutus dissecta.* Ante nimirum, quam de investigatione ductus Thoracici cogitavimus.

SENECA.

Bonarum rerum est successus non fuerit, cónatus ipse honestus est.

II. OB-

II. OBSERVATA IN CAPITIS RAJÆ.

Mense Novembri 1739. Naucleus Godesensis, mihi familiaris, Turdegallia redux, duo *Capita Rajæ*, sed in rostra, quod doleo, & ad latera, præter intentionem suam, a Sodalibus navis mutilata, nec non *Caput Aselli* maximi, paucosale condita mihi obtulit. De Aliciolo vide supra pag. 21. §. XXXII.

Quod ad *Rajæ* attinet, hanc speciem, quod sciam, nullibi descripiam habemus. Galeorum capita pronuntiabant; sed asseverabat Naucleus, Capita esse *Rajarum*, eandemque Corpora in phanas continuis, more *Rajarum*, attenuata & ab uno extremo ad alterum quatuor carceres pedes lata post anum appendices, caudamque densis aculeis muricaram, habere,

In *Supina Capitis parte* observavi membranam, quam *Rondeletius* Nebulam appellat, oculis, qui medicis moduli sunt, obtentam, qualis & in Galeo *Acanthia* aliisque Canaliculis. Pone oculos foraminis annulati, in os quidem pertrahi, sed simul, valvula facis valida intercedente, cum Branchiis pronis communicationem habentibus; exinde colligo, quod plerumque his foraminibus plurimam aquæ copiam, ad pulsum, excipiat, quam per Branchias rucius expellit.

In *prona parte Os* magnum. Mandibule atque innumerisque dentibus instructæ, describunt obtusum angulum in medio. Dentes, & radice sursum ad medietatem usque cavata, mox in cuspidem acerrimos, humatos, reflexæ. Nares, ovate figuræ, in longum & latum producuntur, velut ex duplicato pectine, radis undularis, constructæ. Reliqua externa manca & truncata in turpulo reliquis, lpe fræsus, fore, ut aliquando vel integer pilicis, vel caput omnibus suis partibus integrum, ad manus meas ventiret.

Aperto *Cranio* cartilagineo laceraveram Meningem; reliqua juncundum aspectum præbebant.

Cerebrum reni-forme; Cerebellum fere Cordis figuram; ambo appropriatos sibi Nervos Olfactus, visus & Auditus distincte spargere videntur ad destinata loca; a peritoribus curatius ubiervandos.

E

Ex

Ex medulla spinali rami, serie duplicata & dense in substantiam spinæ cartilagineæ vegetant.

Cranii parte illa detecta, quam suspicabar sedem organorum auditus, loco vesiculæ, quæ maxime diaphana in pilicibus spinolis est, offendit reticulum quoddam lobatè expansum, rete Ektasaram consue quodammodo simile; sub quo lapilli, quos ad organa auditus pertinere reor, sese manifestabant.

Ex altero Capite lapillos ipsos solvens, ecce experimentum improvifum: quippe, inter digitos pedetentim solvebatur sic dictus lapillus major, in substantiam spissamentum coloris albi Pictorum quam similitudinem successeive abiens; hinc est, quod intrados reliquerim ceteros, ut sifum corundem naturalem exhibere integrum mihi maneret.

Omni cura omnia picta, singula quoque celo curatissime expressa
T. VI. sunt in Tab. VI. Fig. 1.

No. 1. Mandibulæ Piscis ad naturalem magnitudinem. Sub inferiori Dens, sursum ad medietatem usque cavatus.

No. 2. Nares

No. 3. indiginat Oculorum regiones.

Lit. A Cerebrum.
B Cerebellum.
C Medulla spinalis.

No. 4. Thalamus lapillorum a latere inspectus.

a a — Idem a partibus tam prout quam supin.

b — Lapillus major.

aa. Loca secundi & tertii paris lapillorum.

ec — Canales, quos percurrunt fluctantes nervuli diaphani, convenientes, ubi literæ d & e.

f. Nervorum por, ni fallor, ad oculi regionem tendens.

g. Forte nervi olfactorii.

No. 5. Corpus quod vices ossis petrosi sustinere opinatus sum. Ejus substantia Cartilaginea cultello, qua fieri potuit, attenuata; detectis insuper canalibus flexuosis. Sub reticulo, quod integrum, latitant lapilli.

Jam

Jam consideratis & Cetaceorum, & Cartilagineorum, & Spinosorum, qui vocantur, *Pisium Organis Auditus*, eorundemque sedibus, palam fit, in illis singulorum genera a se invicem differre & structuræ & substantiæ. Etenim *CETACEI* pilices, quorum scelera sunt vere ossia, & cetero respectu cum arboribus veris & mere lignosis comparari possunt, gaudent, ad insula aliorum animalium, & ossibus vere petrosis, & organis auditus vere ossibus; *Pisces* autem *CARTILAGINEI*, quorum scelera sunt cartilaginea & summe elastica, conferenda cum plantis marinis, quæ *Ketacophyta* audiunt, habent, loco ossis petrosi, simile quid cartilaginem, & organa auditus substantiæ tartareæ, friabilis, vel nimia maceratione solvendæ; *Pisces* demum qui dicuntur *SPINOSI*, quorum Scelera assuetudinem habent cum plantis marinis, substantia Corallii æmule, solvent fere lapides auditus organa, corallii quodammodo æmula, vel ad porcellanæ compositam maceriem proxime accedentia.


Ex antea dictis etiam patebit Cartilagineorum lapillos circumspecte esse tractandos, & cavendum est, ne cranium ante æquæ ad macerationem, nedum ad longum tempus, committatur, quam lapilli, quos sectaris, deprehendi fuerint; Hi nihilominus leviter digitis tangendi, ne vel in pulverem vel minimum in particulas abiit; ultimum in osse orbicularis Sturionis expertus sum.


RELIGIO MEDICI.


Engish Edit. p. 7.

The world was made to be inhabited by Beasts, but studied and contemplated by Man: 'tis the Debt of our Reason we owe unto God, and the Homage we pay him for not being Beasts.














IACOBI THEODORI KLEIN
HISTORIÆ
PISCUM
NATURALIS

PROMOVENDÆ
MISSUS SECUNDUS

DE
PISCIBUS PER PULMONES
SPIRANTIBUS

AD
IUSTUM NUMERUM ET ORDINEM
REDIGENDIS.

ACCESSERUNT SINGULARIA:

- DE
I. DENTIBUS BALÆNARUM ET ELEPHANTINIS.
II. LAPIDE MANATI ET TIBURONIS.

Horatius:

Delphinum sylvis appingit, fluctibus Aprum, qui variare cupit rem
prodigialiter unum.

CUM FIGURIS.



GEDANI, LITTERIS SCHREIBERIANIS. 1741.

Cic. in Oratore:

Aggrediar, non tam perficiundi spe, quam
experiundi voluntate.

GENEROSO.
MAGNIFICO. CONSULTISSIMO.
DOMINO.
DNO. DANIELI.
DE.
SUPERVILLE.

SERENISSIMI PRINCIPIS.
CELSISSIMI MARCH. BRAND. CULMBAC.
CONSILIARIO. INTIMO. ET. ARCHIATRO.
PRÆSIDI. COLLEGII. MEDICORUM.
QUOD. BARUTHI. EST.
DIRECTORI. MINARUM.
RERUMQUE. MEDICIN. ET. MINERAL.
ACADEMIARUM.
CÆSAR. LEOPOLD. ET. REG. BEROL.
MEMBR O.

NO-

NOMINIBUS TUIS


*missum hunc
inscribere jussit Amor, jubet Pietas.
Singularis FAVOR, quo me, TIBI
nondum quidem cognitum, amplexus
es, & quo duce ante lustrum, ac
quod excurrit, ad lares nostros, vel
mecum colloquendi gratia, descendi-
sti, conciliavit Amorem Tuum.
Hoc nihil suavius mihi cadere potuit.
Animum adjeci Amabilitati Tuae ob-
strictum; & quod nemo TIBI præ-
ferendus Fide, Amor Tuus tam
altas*

*altas egit radices, ut Bonitati,
quæ parentes facit, æquiparandus
sit. Publicum proferam documentum:
Sollicitius egisti, ut CELSISSIMO
FRIDERICO MARCHIONI
BRANDENBURGO-CULMBACEN-
SI, PRINCIPI OPTIMO placere,
cum TIBI me adeo placere voluisti.
Nec sufficit; Omnes simul curas, ne
quidem rogatus, defixisti in salute mu-
sei olim mei; quod post fata mea ser-
vari in ævum aliter non potuit, quam
ut in thesauris PRINCIPIS deponere-
tur. Depositum servasti gratum acce-
ptumque, cujus sint indicio singularia
pigno-*

pignora clementer mihi collata, quæ in
PRINCIPIS GRATIOSISSIMI perpe-
tuum memoriam posteris meis commen-
dabo.

Postulat itaque Pictas, ut ar-
rham Tui Amoris caram grato pe-
ctori, quod dignius rependere non pos-
sum, animoque tenerrimo recondam.
In cuius auctoramentum accipe pagel-
las has pari benevolæ affectu, quo me
in arduis prosequeris. Vale, & qui-
dem athleticæ; Vale diu, meque
amare perge. Dabam e museo XIX
Calend. Februarii MDCCXLI.

DE



DE
PISCIBUS, PER PULMONES
SPIRANTIBUS,
AD
IUSTUM NUMERUM ET ORDINEM
NATURALEM REDIGENDIS.

§. I.



Nemo facile inficiat ibi, quod in *Historia naturali* studii la-
bor sit infinitus, memoræque obnoxius, quandoque non
levibus, a) hinc (monente *Rondeleto*) „omnia cir-
„cumspicienda, diligenter observanda, experientia,
„quando licet, comprobanda, qui tot tamque miranda sunt naturæ
„opera, vi nondum tanta penitus, etiam a diligentissimis, percipiet po-
„tuerint, semperque resistent aliqua perscrutanda. Hoc adeo verum, ut
longe ablit, qui probe noverit, qui vel primis labris utigerit *Piscium*
historiam naturalem, iuxta naturæ muniam implicitam esse, quam vi facili
negotio abici possit. Accedit antiquorum æque ac recentiorum inere-
dibilis discrepantia, quæ perpetuas hinc studio tenebras offuderant; refor-
midum pariter credulitas, imo autoritas, sæpius nociva, quam *Hanne-*
mannus b) „illam piscium vocat, quæ tot jam secula homines occæca-
vit, ut nimium tribuerint autoribus, siquæ spretæ Naturæ libere ab-
„sponderint. Multæ exinde sunt errorum hallucinationes, unde suspecta red-
ditur multorum piscium *historia*.

a) Confutatur ceteris. *Certh. Linnaei in observat. ad Regnum animale* No. 2.

b) *Spk. N. G. G. Det. II. Det. V. p. 476.*

*A

§. II.

§. II.

Ut silentio preternavigemus *Hyfres ineptos Formis Cuba*, quis unquam vidit *Scalopendram cetaceam*? cuius formam *Rondeletius* a) bona fide exhibet acceptam ab iis, qui in India eam piscem vidisse affirmarunt. Quis, quæso, crederet *Ludoico Granatensi* b) quæ de eorum admirabilis formæ liberaliter narrat. Quid sibi velit *Balena musculus* c) ignoramus. Nemini *Balena vera musculorum* nomen barbatum unquam fuit obvia. Quia ratione autoribus indifferenter cetacei audiog *Balene*, hecimus; c) sumus; d) adeo incompleta est *Balena*, licet maxime in *Lib. 1. de* peribilibus animalibus, historia. Quid de *filulis* in cute *duplicibus*, quandoque mirabilibus, dicendum? Non possumus oon meminisse utrum *Rondeletius* e) *Polos*, *Pistula* pileibus quibusdam, per puliones ipi, *canibus*, *mentis* five ductus, quo spiritum hauriunt, & aquam in ora collectam reiciunt, ab forami plati parte ad extremam perforatus, duplex, septoque distinctus, nariumque ostium foraminibus ad palatum deductis quodammodo proportionem respondens. In extrema parte NB *mutam foramen* apparat figura C hære, in quo operculum est, ex eæne *pingvi filulis* impolitur, quod eas aperit & operit. — Hic obiter reprehendenda est ejus audacia, qui Suevix picturam edidit; siquidem *Balenas*, *canibus* adeo eminentibus expressit, ut aures esse dicas, quo fit, ut plura alia ex pictoris potius arbitrio, quam ex auctoris sententia depicta esse credam, ut ex aliorum piscium figuris conicere licet.

a) De Pife. Lib. XVI. cap. XI.

b) In sua castigatione ad sum cap. XVI. Lib. XVI. de *creacione mundi*, Conf. M. A. B. *historia* *Descriptio* *Naves* 17. p. 134. & *Conf. Hist.* *Lib. 6. c. 16.*c) In tantum *Rondeletius* Lib. XVI. cap. XI dubium cohibet; *Antiquos*, *Gilbert*, *Balenas*, *omnes* *sciam* *dumtaxat* *bellum* *navigantes*, *que* *nunc* *piscatores* *Saxoniæ* *de* *His* *spis*, *ad* *Hyfres* *et* *Orcas* *aliquas* *pergrantes* *de* *Balenas* *perissimas* *belas* *revertuntur* 11d) Porro *Orcas* *occidit* *dede*, *introducendi* *nonnulla* *Balenas* *in* *utraqve* *mandibula* *dentate*; *Sic* *Gilbert* *minor* *in* *utraqve* *mandibula* *dentata* *alibi*, *non* *nisi* *area* *est*, *ut* *de* *revera* *dentis* *Balenas* *altes*, *certum* *tamen* *historia* *valde* *incompleta* *hæc* *ad* *huc* *est*.e) Lib. XII. cap. X. *conf. infra* §. XXXVII. in *notis* b)

§. III.

Vereor, ne eo referendo fiat, quæ *Sibbaldi* in *Phalologia* de *Baleinis duplici filula* instructis nobis reliquit; quem viri in Ichthyologia celebres secuti sunt, unde: *Balena duplici filula* in rostro; quæ *Sibbaldi*

Sibbaldi dicitur *Tripinia*, nares habens cum rostro acuto &c. *Balena* *filula* *duplici* *in* *fronte*, quæ *Sibbaldi*: *Tripinia* *maxillam* *inferiorem* *rotundam* *Sc.* *habens*; Porro *Linckii*: a) *Balena* *filulis* *mirum* *in* *modum* *ad* *Nares*, *insit* *cornum* *cochlearum*, quæ *vulgo* *audium*, *prominentibus*; & *plures* *variorum* *aurozum*. Forte præter eorum culpam ejusmodi *filula* *præternaturales* *talibus* *piscibus* *inscripser*, quod vel minus accuratas nacti sunt figuras, vel frivole pictas. Foris & *Sibbaldi* non vapulat, si per *filulas* *duplicatum* *fontem* *vel* *duplicem* *ductum* *hydragum* *in* *cranio* *indigare* *vult*, in cuius locum alii dux *filulas* *in* *extrema* *parte* *capitis*, *cum* *em* *dupliciter* *perforantes*, *introducunt*, *hæc* *in* *nonnulli* *veritas* *sunt* *errores*; & *quidam*? Si enim *Balenas*, *altes* *Fingfish*, b) *similiter* *Nordkaper*, c) *ex* *omnium* *aurozum* *unanimi* *consensu*, imo *Delphaces* *vel* *Porcelli* *maria* d) & *piscis* *Norval* e) *unicum* *foramen* *in* *cute*, *aut* *duplicatum* *fontem* *sive* *filulas* *dus* *in* *cranio* *habent*, *necesse* *est*, ut *quadruplices* *filulas* *supponas* *in* *cranio* *illorum* *piscium*, quorum *duo* *distin* *foramina* *in* *cute*, per quæ *ejaculantur* *aquam*, *urgere*, *vel* *eiam* *Wormi*, *Tulpi*, *Scheuchzeri* & *plurium* *aurozum* *figuras* *sequi* *velis*, qui *Norvalium* *pictum* *exhibent* *ex* *duobus* *filulis* *aquam* *distinctis* *radis* *reicientem*, (*Valerianus* *ex* *tribus*); quod *tamen* *non* *facile* *affirmabit*, nisi qui ejusmodi *piscis* *vel* *eorum* *crania*, *nec* *vidit* *nec* *oblivavit*. Multos itaque secesserunt minus accuratæ figuræ, quibus non statim fides danda, alias & apud ipsum *Rondeletium* *Pristis*, *piscis* *Carillaginus*, cum *filula* *in* *capite* *piscis*, *in* *modum* *degenerat* *in* *piscem* *Cetaceum*; quem ipse *Rondeletius* pro tali habuit. f)

a) In *Colubr.* *Præf.* *Torone* *X. c. 1. p. 79.*b) *Ud.* *21c.* *unde* *neue* *Waldschmidt* *Schiffen* *Plat* *11.* *cap. VII.*c) *Reil* *Cap.* *11.* *Sp. p. 217.*d) *Ud.* *11c.* *§. XXIX.* & *§. XXXI.* *in* *notis*.e) *Ud.* *11c.* *§. XX.*f) *Lib.* *VI.* *cap. XI.* *Altero*, *de* *Caris* *p. 69.*

§. IV.

Unde vero *Rondeletius*, & qui eum secuti sunt, relatum habent, *Orcam* *dentibus* *levis* & *ferratis* *instructum* *esse*, nos omnino late. Vnde *dicimus* *Orcam*, *hactenus* *piscem* *erraticum*, in *Familium* *Delphaceum* *quem* *Theodorus* *Hygens* *Leviathanem*, i. e. *Baleenam* *omnes* *reliquos* *in* *ingruidine* & *ingruidine* *superantem*, *statuit*; *nec* *oblivit* *exhibitionem* *crania* & *dentium* *hujus* *piscis*.

§. V.

Sane, & nostris temporibus Narrationes aliquando sunt vagæ; quædam falsæ; quibus, si illico fidem habemus, vagari utique concinnatus historiam, ne dicam plane falsam. Exemplum sit narratio inter *Nova Berolinensia Anno 1730 No. 121* relata:

„Piscatores Almidenses in portu Ulissiponensi eodem anno necasse Balzenam, cuius longitudo fuit 65 ped., crassities 32 - altitudo 10 - Oris autem circumferentia 52 in quo VI. homines erecti commode constare poterunt. Os dentibus fuit instructum NB. CCXL., quorum XII. NB. VII. ped. reliqui III. cum dimidio pede. Ia. „Ultimo capite fistula duz - oculi 9 pollices longi, eorumque dissimilis ab invicem 9 ped. cum 9 polli.”

Itæ utriori descriptione. An fuerit in utraque mandibula dentata, nec ne, relatio deficit; mancam valde, si exanimi subicitur, huius piscis historiam subministrans, imo, quod ad dentium magnitudinem, nec non numerum, attinet, omnem fidem superans. Haud aliter relatio comparata est, quæ *Novis Lipsiensibus Anno 1740 sub No. 11. 16 Febr.* inserta de Balzenæ & ejus Catulo (qui, nondum bimestris, minimum 18000 libras pendente crederetur) juxta Bitayam, ad Castellum de Urdiale, necatis:

„Mater longa fuit 26 Ulus Holland. vel LII. pedes, crassa pedes LVI, „cuiuspinna XXVI ped. longæ; lingua pendens 47½ libras. Virga „corneæ superavit 816, oleum crallum ex adipe 26100 libras.”

Manca pariter in reliquis, quæ ad naturalem hujus Balzenæ historiam omnino desiderantur. Nec mirum; quippe avaræ & insanabiles suruncolorum manus Balzenarum naufragorum integritati parcere nolunt, ut viri curiose docti lucrarentur tempus vite examinandi vasa illorum volumina, prout de rusticiorum inhumanitate congeritur *M. G. Hannen in Ad. Meth. Haffn. II. 67.* occasione Balzenæ anno 1679 in Fionia captæ.

§. VI.

Hæc & quæ plura, quibus difficultatis aliquod subesse suspicio foret, sufficienter probant, quod in sensibili, prout vel cæco manifestum sit, *Sensu* utique adhuc veretur. Ideo non parum finis solliciti de conquirendis subditis & admentis, ut viam nobis aperiremus eludendi, & pisces, quæ fieri poterit, ad naturalem ordinem redigendi, quos merito antecedent PISCES, sic dicti, CETACEI.

§. VII.

Operam hanc delusam excludunt, quibus constat, id ipsum maxima ex parte jam præstitum. Sed forte eos lætabit, haud pauci magis fidenter quam vere tradita esse: quod nomen cum pæce Illulæum & Dodiffimorum Vitrosum in medium prolatum volumus; magni facientes alio-

tati

rum lucubrationes, vigilias & sudores, quos, nullis difficultatibus deterri, strenue sustulerant, ut *Historiam piscium naturalem*, erit nondum ex omni parte, promotam redderent; imo, veritatis summo pre studio, peramanter cupimus, ut *Vir in Historia naturali consummati* propositiones nostras, nondum quidem absolutas, si solvendas judicabunt, absolvent, corrigant, amica manu rejiciant, meliores imperientur, & opelle huius ævi bonique consilium, in melius vertendo hallucinationes nostras. Tacere non omnem spem profligam credimus, fore, ut opera nostra vel aliqua ex parte prodelle possit, minimum illis, qui in hoc studio historiz naturalis vel parum, vel plane non, versati. Nantium a) quippe gregem in talem ordinem & ad ejusmodi characteres redigere periculum faciemus, qui non facile fallere queant vel illos, quorum opes indigemus, non solum ad adipiscendos pisces ex diversis maribus, sed quoque ad addicendam *horum Historiam ex illorum observationibus & reinonibus*; quæ, si solidis nitantur fundamentis, lacere præferre possunt *Khybologie critice*, ne Apros in mari pro piscibus venemur. Hoc nihil habet iustæ reprehensionis. Natura enim simplicitate sua ordinem a sapientissimo Creatore sibi præsertum servat sequiturque plane absolutum, quæ, si nimio studiorum amictu bullacum exhibemus, difficile assequimur, quælimo studiose negligimus. Ordinem igitur naturalem secuti, indoctum quidem simplicissimamque methodum ex illo pendendam experiri lumen respondit votis nostris de longinque adunpendis, respondisse simul in Ichthyopolis nostris undique enim pisces desideratos, citra periculum frustrationis, nacti sumus ex manibus plebeculæ gentis, utriusque lexus.

a) Quorum descriptio in *Navig. I. §. 1.* Confutatur plurimum definitiones *Cetæbræ, Navi ap. Wallingh. & vocat servat in Ich. Sam. locum.*

§. VIII.

Vix enim, ac non vix quidem, *Nauticam Gentem* edoctam redderes, quid ex gr. sibi velint: *Pisces Cetacei, Cartilaginei & Spinofi*; cum vel *Brachii* hæc dispositio aliquando, & multum quidem imposuit, ut piscibus cetaceis numerarentur ex genere *Plocarum animal Marini*, manifeste valde & hominum genio se accommodans, pilolum, in ostiis fluminum præcipue habens, & granine ac alga velens b), *Tavos Marini, Rosignari, Leonei Marini* h) & paria & circa cartilagineos vero *Attilas, Hylas, Acenferes, Streptos* &c. quæ in capite branchias habent, ne edentuli & ovipari sunt, commiscerint cum *Canibus* vel *Lamnis*, Galeis similibusque, quorum branchia pone caput ad latera, sub cute incisa, latent, & qui in super vivipari, voracissimæque bellæ sunt, plurimum horrendis dentibus instructæ. Hanc confusionem jam *Paulus Jovius* c) suis temporibus miratus est; „quomodo nimum „*Sturio* maleficus esse possit, quum dentibus omnino caret, sic fortasse a

„natura

natura formatus, quoniam piscibus non alatur; ridiculumque sit dicere, Saurionem in pisces gesserit per ipsam tantum lasciviam.

- a) V. d. *Verum Historem* p. 183. *Class. Terr. ab omni natura pulsum*, & infra §. XLIII. seq.
b) *Xth. Cap. 8. Qui p. 221. Rondel. p. 491.*
c) *De Romanis piscibus Cap. 17.*

§. IX.

Minus a recto tramite aberrant, quibus familiaris facta fuerit simplicissima *Dispositio*, quod alii gaudent

PISCES {PULMONIBUS} & quod PISCES
 {BRANCHIIS}

PULMONIBUS præditi sine omnes, qui *Fistulam* (vel plures, si verum) in *summo capite* habent, unde aquam in ore collectam cum impetu rejiciunt; sub cute glabra & facile vulneranda adiposi, caudæque constanter horizontalis brevis; Pisces, cute glabra, adiposi, cauda horizontali, aquam haustam per *fistulam* in capite cum impetu rejicientes; ita enim e longinquo dignosci possunt; brevissime: *Omnes Physeteres*, i. e. *Flatores*; nam *Quere* Flatores significat, & *Hosychie Quere* fistulam Pileum Cetaceorum denotat. Porro, quod PISCES BRANCHIATI duplici modo sint considerandi: vel enim habent

BRANCHIARUM {Spiracula pone CAPUT
 {Opercula in CAPITUM

Spiracula sita sunt vel {ad *Latera Thoracis*
 {in ipso *Thorace* i. e. in parte corporis prona.
Vix ac ne vix evidenti branchiæ per *Spiracula* pone caput palam conspicue sunt, sed sub cute tenaciter latent, sicut per incisionem lunatas constanter quinque, vel per toranulam, aut oblonga aut rotunda, siue unicam siue plura indicant, ac non nisi violenta manu, & cum interitu piscis deregenda; hinc talium piscium BRANCHIÆ, siue in caput vegetent, ut in *Anguilla* omnium autorum, quæ *Arredo* Muræna est, siue in lateribus vel in thorace radicate subsistant, nobis audiunt

OCCULTÆ siue OPERTÆ.

Opercula branchiarum in capite piscium boreat consuevit, suntque {OSSEA siue spinosa
vel {MEMBRANACEA ad pulsum a) mobilia & aperibilia, sic, ut si ne difficultate vel discrimine vix observari & numerari possint BRANCHIÆ; hinc nobis:

DETECTÆ siue APERTÆ;

& in hoc *Rondeletio* b) ac *Severino* c) recessimus, qui *ordine inverso* Branchias in capite OPERTAS, *Spiracula* vero pone caput donatas APERTAS dixerunt; Nihilominus cuilibet liberum erit, loqui cum laudatis Autoribus, dum-

Commodo distincta habetur ratio branchiarum, quas vel *Opertas* vel *Apertas* salutarerunt. Pisces in Nuce omnes exhibet Tabula præsens:

PISCES vel gaudent {PULMONIBUS; quorum universalis Character: *Ferax*, aliis
 {*Fistula*, in summo Capite, unde aquam cum impetu rejiciunt.
 {sub incisuris lunatis, constanter quinque.
 {ad *Latera* {sub *foraminulis* {oblongis {unico vel
 {*atriisque* {vel *rimis* {rotundis {plurib.
BRANCHIIS {pone Caput, {in parte prona; sub incisuris constanter quinque; veluti in buccis
 {occulitis, {sub operculis oisicis
 {in Capite, apertis, {sub operculis mentibranceis {aperibilibus.

- a) In animalibus terrestribus pullos cordis quod duplus dicitur dum semel respirant; cum vero eies piscis hinc res omnium sit expedita, dissuas opercula ad pulsum mobilia.
b) De *Piscibus* Lib. 17. p. 125.
c) De *Respirat. Pisci.* *Disp.* l. p. 124.
d) *Arredo Phil. Nat.* p. 22 *Petromyzum* i. e. *Lampetra* non labore branchias agit, sed pulmones, *Quare* in medio capite ducta continuat inter corpora pulmonum longiora & latiora extendi procedit, & cum apertis pulmonum utriusque preceps debile non committitur. *Id. Disp.* *Sec.* p. 122 in *Ordo* vero *Cetor.* *179* p. 69 scribit: quod *Petromyzon* *ferax* *piscum* seu *branchiarum* utroque septem habet. De hoc pisce in *Argo* 71.

§. X.

Res, pro hac vice, nobis erit cum PISCIBUS, qui PULMONIBUS præditi; quos omnes (§. IX.) PHYSETERES appellavimus. Ne autem novam rem nos inculpent, qui magis delectantur nominibus, quibus indiscriminatum ubi sunt antiqui: Cetaceorum nimirum piscium, & *Beluarum* marinarum, lubenter rationes subiungere volumus, quibus per nos nomina illa dederimus. Novimus *Cetum* communiter significare omnem piscem majorem, qui *catulas* parit non ova pontis, cum tamen in eo sensu & *Cæter* *Caribæ*, & *Galei* & *forent* *Ceti*, vel pisces *Cetæi*, i. e. catulos vivos, (eodem modo, quo vipera, ut loquimur *Hist. Lib. 1. cap. V.*) non ipsa ova, excludentes; a) Porro, quod, præter reliquos, *Belæna* vera, omnium facile maxima, cæntula est & adeo imbellis, ut non nisi a veribus adiposicis eicam quærat; a) contra *Lamie* & cæteri ex horum familia ob truculentiam & voracitatem pariter *Belles* audiunt, cum tamen pulmonibus non gaudeant, hinc æquivoca *Cetorum* & *Beluarum* nomina misimus. Magis, primo intuitu, nobis arstitit *Titulus: Plagiarius* i. e. cauda lata, vel plana, *Plat-Schwanz*, sub quo *Petrus Arctæus* in *ordine* *Veto* omnes

omnes *Pisces Pulmonibus* respirantes comprehendit; verum enim vero, re paulo attentius considerata, a sententia *plurimum Piscium Investigatoris*, hoc in passu, nobis recedendum esse, advenimus. Prout enim nova nomina quandoque nova partium incommoda, non ab omnibus facile resolventa b, sic veram equidem est, quod *Plagiarii*, quod interna, cum *Quadrupedibus* pilosis (quidni etiam cum illis, quæ pilis carent, e. gr. cum *Armadillo*) magnam partem conveniunt; porro, quod *pilæ* laterales, sanquam partes extrinsecæ, si excoriantur, cum pedibus *quadrupedum*, imo cum manibus humanis c) comparandas alii, nemo telas ab externo habitu dijudicabit, sed cultro anatomico vel securi opus habebit, qui comparationem inspicere velit; neque in dolos & alie proprietates piscium in externo corpore conspici possunt, *Arted. Phil. Ichth. p. 87*. Quod vero ad *dentes* attinet, a quorum & pinarum numero d) characteres generis desumendi, notum est, non omnes pisces *Plagiarios* esse *dentatos*, e) etiam *Clavifimus Autor* laminas corneas nonnullis *Balenis* dentium loco esse, nobis perlegendæ cupias, de quibus tamen vid. *Rondel. Lib. XVI cap. XI. p. 476*; & nisi unicuique, quod sciam, animal pilosum, nimirum *Tamandua* quadrupedem, haberemus edentulum, difficulter, habito respectu ad *dentes*, cum reliquis *Quadrupedibus* comparari poterunt *Plagiarii* qui *Balena vera Zorodrageri* — *Balena aliticans* — *Balena edentula Dalei*, quæ NB nec *dentes* nec laminas habet; imo plures pisces, qui communiter appellantur *Cetacei*. Quid ergo obtineat, quo minus *Physeteris*, antiquissimum quidem sed multisfariæ vagum nomen modo amplectemur, hocque titulo *PISCIDUM ORDINEM PRIMUM* insigniremus? f)

f) Ceterum *Carcharias* *Pantlus* *Pisces* *Bovem* *Belluam* esse, nullus dubitat. *De Pys. Rem. Cap. 111.*

a) Sic *Tab. Columna in Different. de pargura p. XXXI.* *Lancei*, *Carcharias*, *Melus* cetæci generis esse putantur, & *pag. XXXVII.* plus singuli vires cetaceos appellat *Conf. Balen. de aquat. Lib. I. Cap. 2. de cetaceis vulgaribus* *griseby*; ibi: „*griseby* habens, „*essum loco*“, alios alie majores, qui speciei pisces nominantur, quarum nonnulli cetæci sunt generis. Omnes tam magnæ, quam parvæ ova parant; quamvis non solum a *quadrupodibus* amphibilib, sed etiam cetæcis viviparis scortendi „*mhi* vili sunt.“ Ecce negrificationes cetaceorum *Piscum*, nec leves!

b) *Vie delatius schenckermi arsther. tab. p. 31.* ad titulum *Orphides*. „*Steue* „*Shapmen* müssen nicht eingelspect werden ohne Wof, und hat Luydus in seiner neuen *Wörter-Buch* noch mehr viel *Wörter*.“

c) *Conf. epist. Transact. Phil. 111. g.* de pinat *Piscorum* & *p. L. Scholium in Menstruorum* *religio p. 78* de pinat *Nervibus*.

d) Secundum *Artemidorum in Phil. Lib. p. 32 n. 122.*

e) *Relio Th. Barthelemy all. med. Hefte, 11. 6p.* „*quomodo* non ex quor *Balena*, „*rum* *Genere* *Specimen* *Ceti* *cautatur*, *va* *nec* *Dentes* *in* *omnibus* *specimen*“.

f) *Conf. 5. 11. in not. c)*

§. XL

§. XI.

Distribuiunt autem *PHYSETERES* in *BALENAS*, *NARWHALEM*, vel *Monodontem* & *DELPHACES* sive *Porcellas*.

§. XII.

BALENÆ nobis audiunt: *Physeteres*, quorum caput tertiam propemodum partem torus corporis absolvit; quo caractere a reliquis nocenter se dilinguant; suntque pisces primæ magnitudinis.

NARWHAL s. *Monodon Arctæ*, est *Physeter*, cuius caput ad reliquum corpus adeo parvum, ut *Acephalus* videatur. Os non nisi unico, sed preclaro dente externo armatum; hinc recte *Monodon*. Inter *Physeteres* mediæ est magnitudinis, rarissime enim *XVIII* pedes excedit.

DELPHACES s. *Porcellæ*, sunt *Physeteres*, capite in rostrum porcinum exeunte; ore in utraque mandibula dentato; *Tripinnes*; ultimæ magnitudinis.

Horum Synoptica Tabula:

PHYSETERES a)	I. <i>BALENÆ</i>	I. Edentulæ	1 In Dorso levi apinnes.
			2 In Dorso gibbo apinnes.
			3 In Dorso pinatæ.
	II. <i>NARWHAL</i> s. <i>Monodon</i>	II. Dentatæ	1 Dorso levi, apinnes.
			2 Dorso levi pinatæ.
			3 Dorso gibbo pinatæ.
	III. <i>DELPHACES</i> b) c) <i>Porcellæ</i>		1 Capite in rostrum porcinum reclusum, finium, exeunte: <i>Orcæ</i> .
			2 Capite in rostrum porcinum reclusum & longuam protulso: <i>Delphinus</i> .
			3 Rostrum recto, brevi, & obtuso: <i>Tursio</i> . s. <i>Podobæna</i> .

Verificationes si quis desideret, componat nomina græco-latina; mihi & minus exercitatio in hoc artificio, & nimis occupato non sufficit tempus.

BALENÆ EDENTULÆ

In Dorso levi spinosæ.

„Walvilt; hebbende in 't booven deel NB twee gae-
ten, welcke van de Kop af tot NB in den mond door-
gaen; „ ex quibus verbis palam fit, *Vrieseham* per duo
foramina intelligere duplicem ductum hydropogon in cra-
nio c). Inhabilis est Balena vera ad venandum alios pis-
ces, quod laminæ cornæ ad Oesophagum usque pertin-
guat, gulamque valde angustam reddunt, non nisi vermi-
bus adipolis veicens. d)

a) *Idem* *Idem* p. 7.b) *Ex Pilo, H. N. Lib. XI. cap. XXXI. Sec. LXII. item Alian. Lib. II. cap. XLII.*

c) *Cor. Kelt. cap. B. Sept. p. 245.* ubi de Balena *Borealis*, Nord-Capet:
Heber und hinter den Augen nach dem Rücken zu, hatte ein jeder
ein ziemlich gestricheltes Foch — welches mir, wie ich erst bey Kelt-
ham gesehen, nicht anders verstahe, als hinter hinten in dem
Wasser ein sehr starker Spring-Brunnen aufstehe.

d) *Reliqua apud Bergstræmum, Martensium & in Transact. Phil. Vol.
XXXIII. No. 127. p. 116.*

2. *Balena albacens*; *Weissth Martensii* & *Zorgdr.* Et etia Bal-
enæ vulgaris & *Harengis*, *Alulis*, similibusque veicens;
quod cornæ laminæ ipsi non sunt impedimento ad devorand-
um innocuos pisces.

3. *Balena glacialis*; ita communiter: *Eisfisch*:

a) *Australis*; *Zud-Eisfisch*; dorso valde depresso, *Zorg-
drageri*.

b) *Occidentalis*; *West-Eisfisch*; dorso minus depresso,
Fistulæ.

c) *Borealis*; *Nordkaper*, *Ephodæ*.

Velennat & etia Balenæ veræ & *Harengis* &c. Adeps ca-
rum majora est consistentia; ideo non adeo sollicite qua-
runtur. *Figuram Borealis* vid. *Eph. N. C. G. Dec. II.
An. VII. Obs. XXI.* Optamus uenire.

In Dorso gibbo spinosæ.

1. *Gibbo unico prope caudam.* *Angli: The Burch or Im-
bark-Whale.* *Gibbus* magnitudinem Capitis humani superat.
Laminæ

BALENÆ EDENTULÆ

In Dorso gibbo spinosæ.

Laminæ cornæ hujus Balenæ parum valent, antecedunt ta-
men bonitæ laminas Balenæ pinnatæ; vulgo: *Finfish*.
vid. *Transact. Phil. Vol. XXXIII. No. 387. p. 258.*

2. *Gibbis vel Nodis sex.* *Balena macra.* *Angli: Scrag-
Whale.* *Figura* ad Balenam vulgarem accedit, & quan-
titate adipis illam adæquat. Laminæ cornæ sunt albræ.
Phil. Trans. ibid.

In Dorso pinnatæ.

1. *Ore Balenæ vulgaris*, laminis cornæ donato.

a) *Balena edentula*, corpore strichore, dorso pinnato *Raji*.
Finfish *Zorgdr.* *Phyliter* *Gefa.* *Angli: Finbok-Whale.* Uni-
ca penna in dorso prope caudam. Longitudine similis Ba-
lenæ vulgaris, crassitie corporis illa triplo inferior est. Adeps
nimis consistentior; ut neque hanc Balenam valde curent
Venatores. *Pisces* & etiam Balenæ veræ appetit. *Phil.
Trans. ibid.*

b) *Subarctæ*; *Balena novæ Angliæ* 1). Longitudine
Greenlandicos superat, non crassitie; nonnquam in mari
Greenlandico capitur; quod factum Anno 1723. 2) *Ve-
natores* ipsum *Jupiter* sive *piscem Jovis* nuncuparunt, unde
surre corruptum nomen: *Subarctæ*. *Pediculos* multos,
vel potius *Balanos*, sub gutture nati, de quibus confer.
Lph. 3) *Edentula* est & laminis cornæ instructa. *Cym-
bus* seu *Scaphis venaticis* non timet, upote quas capta
subinde adora est, & caudæ verberationibus quorundam ex
commilitonibus venatorum pessum ire cogit.

2. *Ore rostrata.* *Balena tripinnis*, *edentula*, minor, ro-
stro parvo; *Bottle-or-Flounders-Head*, *Dalei* 4).
Capta Moldaviæ 23 Sept. 1717. Ab extremo rostro ad
exitum caudæ longi sunt 14 ped. Angl. Circumferentia ven-
tris 7 cum dimidio. Caput similitudinem habebat cum ca-
pite *Dolphini* (quod non dixerim) licet rostrum dimidio
brevis fuerit rostro *Dolphini*. *O* *edentula*, (neque
ullam mentionem facit *Balenæ virgarum* cornearum.) Ab
extremitate rostri ad oculos amplius palpebris angustis, su-
tor numeravit 22 pollices. *Fistula* extrema, quæ duos
pedes a rostri extremo, figuræ fuit semilunaris, cuius
cornus,

BALENÆ EDENTULÆ

In Dorso pinnate.

cornu seu decrefcentis Lunæ, occiput respiciebant. Pinne laterales 17 poll. longæ, a rostri exitu tres pedes remotæ, ab ano autem tres ped. & 9 poll. Dorsalis pinna ab extrema cauda 5 ped. & 4 poll., longa unicum pedem. Cauda horizontalis lata 3 ped. 9 poll. Cuius in dorso fuit, in ventre albedinem contrahens. Femina fuit, cujus pendenda 14 poll. longa. Eodem tempore similis Balena Mas *Bradwillie* capta. Longitudinem habuit 21 pedum. Cum *Daleo* iudicamus hanc Balenam esse *Buskop Martensii* quæ perperam inter Synonyma Delphacis, quæ *Orea* dicitur, collocatur. Ipse *Martensius* Balanem *Buskop* distinguit ab *Orea*. Hanc vero Delphino similem esse tradit, cavetque, ne cum Delphino confundatur. Flura de *Orea* infra.

1) *Epil. Trav. Atl. Phil. II. § 23.*2) *Cell. Præf. Mus. Nat. Hist. Nat. XXVII.*3) *Hist. Nat. Zool. 183.* *Sibbaldus in Trans. Phil. No. 208 68*
*Epil. 181. cont. Cell. Præf. Atl. I.*4) In *Append. Hist. Nat. p. 411.* ibi figura.

§. XV.

BALENÆ DENTATÆ

Dorso levi apinnæ.

1. *Cete Chisti* *Exot. Lib. VI. Raji*, *Willughbee*, & aliorum, Balena minor, in inferiori maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso. *Sibbaldi*. *Balaenæ*; *Pet. Walsh*. Dentibus simplicibus in inferiori mandibula, in superiore alveolos sive vaginas habens, quæ dentes, dum rictum claudit, excipiunt. *Raji* & *Willughbejus* mentionem faciunt similis Balenæ in inferiori mandibula dentibus duplici ordine dispositis, totidemque in superiori maxilla alveolis instructæ. Suspecta nobis est talis Balena. Adde *Raji* *J. P. p. 12.* „Nullus (*Chisti*) in dorso apinnæ meminit, non tamen adfuisse negat.” Verum cum neque

2. *Cæbelot* f. *Potfith Zörgdrageri*, vel potius *Abrahami Maubachii* in appendice (ubi & figura) pinnam in dorso explicat,

BALENÆ DENTATÆ

Dorso levi apinnæ.

explicat, ambas apinnas dicimus. Hanc *Zörgdragerus* 42 dentibus simplicibus præditam esse refert. Dissert quidem capite a *Cete Chisti*, forte nihilominus tamen una eademque est cum præcedenti, quod aliquando, cum relinquitur fur la format. *des file & des corymbes p. 10.* ubi describit Balenam dentatam dorso apinnæ, in sinu Venetiarum an. 1715 necaram, cujus dentes cum belemnitis comparare summi opere studet; sed videbis *Epil. Cappellerii*, in *Sciograph. Latbol. curiosa* pag. 11.

Dorso levi pinnate.

1. *Balena major*, in inferiore tantum mandibula dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens. *Sibbaldi*. De ejusmodi dente vid. infra §. XXXVI. *Arted* audit *Physeter Imus* maxilla superiore longiore, pinna longa in dorso.

2. *Mula Nierembergii* a). Balena macrocephala Tripinnis, quæ in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos & in planum deflexos, *Sibbaldi*; fistulam infra frontem ferens, erectam pinnam in medio dorsi, *Raji* p. 14. *Artedi* *Physeter* *lilus*.

3. *Linckii*; in utraque mandibula dentata. Dentibus & fistulis valde suspectis; his quidem ad Nares prominentibus b). Dente *Linckii* Balenæ fistulas mirabiles ac dentes superiores mandibulæ, & colloca penem de loco præternaturali in locum naturalem, sic habebis *Manbachii* *Cæbelot* f. *Potfith*.

a) *Atta Nat. C. G. Vol. III. p. 6.*b) *Cell. Præf. Zool. XXVII. p. 77.*

Dorso gibbo apinnæ.

Dualcii Balena, dorso gibbo; similis Balenæ, quæ *Humboldt* - Whale, *Sperma Ceti* Whale, *Ambram* griseum ferens. *Trans. Phil. Vol. XXXIII. No. 289. p. 258.* *Casparus Neumannus* in *Disquis. de Ambra grisea*, hanc non recrementum animale, sed Balaenæ esse, prope ad Succinum accedens, pregnantibus argumentis evincere voluit.

Dorso

BALENÆ DENTATÆ

Dorsū gibbus pinnatus.

Balena, *Tigridis inflar*, variegata; in Dorsū pinnata, postpositis tribus nodis, quibus post anum duo nodi & diametro oppositi; dentibus in inferiori mandibula; natis amplis. Figuram possidet *Dominus J. Ph. Breynius*, cuius aures non tamen constat. An, Balena tripinnis, Nares habens, cum rostris & plicis in ventre, *Sibbaldi & Rapi?*

§. XVI.

Plures Balenæ cum aliqua fiducia colligere nobis non licuit. a) Multi ex recentioribus vel minus circumspicte relationes antiquorum propagarunt, vel nimis fiderent, quæ ex auditu acceperunt, posteris commendarunt; Alii auctoritatibus illorum, licet aliquando Aurores, occurrat errores erroribus cumularunt, adeo, ut multi laboris sit patientes atque cunctator in observationibus, & naturam quæ (perhibente *Sylvio 3 lib. 4.*) Archetypus est, non libros atque picturas incipiat, qui vera a falsis discernere fideat. Non remanendum itaque *Rondeletii* consilium b), quod historiarum naturalis studiosis imperitur: „Ut nunquam tenere a magnorum & vetustorum sententis discendum, sic eorum dicta omnia, tanquam ex oraculo Apollinis Pythi edita, non semper accipienda.“ Huc faciunt ejus verba c), de piscium differentis a moribus finis: „Piscatores, & qui diu in mari quævisse aliis versati sunt, pauca, quæ certa sunt, de moribus referunt. Eandem, ob causam *Aristoteles*, *Plutarchus*, *Athenæus*, *Oppianus*, *Alianus*, *Plinius*, non adeo multa, nec omnia vera, sed pleraque incerta de piscibus piscium æserorumque animalium literis transderunt.“ Et quis in omnia ipsius *Rondeletii*, *Bellouii*, *Gessneri*, *Albrechtii* aliorumque verba jurare vellet? Interim tamen multa quocunque veteribus imputantur; v. gr. quod *Plinius* Corvos obliuolios dixerit, & plerumque minime ad nidos suos reverentes; Leonem cum Fœda, & Turdum cum Læna concumbere &c. cum apud *Plinium* facile quidquam nullibi legatur.

a) Si *Plinius* Lib. XII. t. varietis: „Quæ nesci palam n.“ se totius illi de non absolute fortasse tradidisse Aristoteli: quæ & tamen ipsa non vacant, qui nesci verum an ipse Aristoteli: *Inter M. A. Strabonem*, *Strabo*, p. 276. — Interim, cui volupe est, nolle Cetum, qui vocatur, & inter illa plura Balenarum genera, consolat, inter alios, Catalogum *Thoma Barboei*, *Icon. Hæd. XCVI. Cent. IV.* ex manuscripta historiarum piscium Islandia.

b) *Lib. XII. cap. XI. p. 69.*

c) *Lib. IV. cap. XI.*

§. XVII.

§. XVII.

Auxilium & commodum haud leve piscium historiarum naturalium prestant, qui auctoritate pollent in SOCIETATIBUS, ad Balenarum in usum commerciorum venandas, multorum locorum INITIS, licubi vel *Chirurgie Calceatoribus*, qui cum classibus venaticis excurrere solent, injungant, quidam etiam consilium prænisi eosdem allicerent, ut attenti sint in pulces libi obvios, imprimis illos ex familia *Balenarum* sedulo observent ut rationem habeant eorumdem magnitudinis; siffuse & structure oris; siffus formæque fistule extremitate; dorsi: an pinnatum sit vel apicem, leve vel gibbissimum; an sine dentatū, nec ne; quales sine dentatū; secum sumtis, ex singulis plicibus, duobus vel tribus partibus diversæ magnitudinis & crassitie, ut & inter se, & cum aliis dentibus conferti possint; qualibus virgis vel laminis corneis instructum sint. diversæ Balenæ edentule; an numerandæ, & quæ? an quædam virgæ habeant dentes, & quales? quæ differentia, ab externa forma desumenda, obliquant inter marem & feminam? &, quod ad mensuram attinet, qualis:

- 1) ab oris extremo ad ortum pinnarum lateraliū?
- 2) a pinnis ad anum?
- 3) ab ano ad medium extremitate caudæ?
- 4) ab extremo oris ad fistulam in summo capite?
- 5) a fistula ad radicem pinne dorsalis anteriorum?
- 6) a radice pinne dorsalis retrorsum ad medium caudam?
- 7) quæ sit altitudo pinne dorsalis?
- 8) utrum pinna æqualiter triangularis, an figuram incurvatam habeat?
- 9) quæ forma sit caudæ, an falcata, an lunata?
- 10) quanta sit latitudo caudæ ab una extremitate ad alteram?

An piscis pinna caret dorsali? an gibbus vel nodis sive in dorso, sive plicis in ventre sit notata? Denique, quo nomine specificis constanter veteranis in arte venaticæ communitionibus familiari, singule Balenæ gaudeant? &c. Ex ejusmodi schedulis memorialibus multum incrementi caperet historia. Foris & humanarum necessitatum interfectis tales observationes; nondum enim res expedire est, omnes utilitates Balenarum absolute tribus commodis valde proficuis, videlicet: *Laminis corneis*, *Ficibus*, *Angulis*. *Whale-Bone*, *Gallus*, *Os de Balenæ* — *Oleo crasso*, *Trahn* — & *Spermate ceti* ex cerebro piscium, quod & ex aliis partibus adipolis preparari solet a). Experimentis *Edm. dentum*, quod partes solidas; sollicitius judices de visceribus, cum neque viscera vel vulgum usu omnino carent. Tandem & eruditæ curiosi pari observantia & fiducia commendamus, dignetur data occasione, ubi naufragi

nastragi pisces contemplationibus & observationibus hominum sese quasi obtrudunt, omnem movere lapidem, quo magis accuratas eorundem figuras, nunguisq; obscuras delectiones lucratur orbis literarum b). Cedet hoc in publicam utilitatem & historiam naturalem promovendum gloriam. c) Modo reliquos consideramus, quos PHYSETERES saluavimus Pisces. Horum in ordine sequitur:

- a) *Callit. Præid. Batum. XXXIIA*
 b) Attentionem meretur Dn. *Agnerie*, Medici *Rupellæ*, Morsia Cete aut Baleme ad litora *Rupellæ* propinqua. *Zellæ. Med. Coll. An. 12 p. 63.*
 c) Memorandum G. C. *Schottmannus* sub fine Jun. ad insulam maris baluci, in *Epil. R. G. G. Dec. 11, A. IX, & X. p. 178* de histozia naturalis defectibus ita gravatur: „Hic non possum non cogitari de negligentia nostrorum hominum, qui stat ævum marinarum generis cotidie spectantes, æque ne piscium nonnullorum partem alibi cogitantur, quorum tamen, non dicam historiam, sed vel nomenclaturam nobis dare sapient negligunt. — Sed in præcepto causi alij. Ea vero negligere: Una, Genus hujus populi, quo *pluripie pisces corradentes Et sui videntur pice*, quam cultura animæ audere solent, aut bonis literis, quas multo otio & invidio potius prosequuntur, & exactitas mallem atque exacta ex sua multibus, quæ excolitis altiusque crevit. Altera, communis Germanie propinqua universi: quod & Aristoteles defuit *Alexandrie*, qui saltu ingenuis aulam adduxit, & h qui heretantur (qui proci sunt) tanta ingenuitate, quantum est animalium historici, parva, defuit *Alexander*, qui extraxit ingenuitatem addit, & sumis catervis suppellectis, præziumque constituit laborum — & panteis esse indubium, ubi veritas non alget modis, sed ne laudatur quidem etiam: tantum adeli, ut præmia sua gaudeat.

§. XVIII.

NARWHAL. Monodon *Arctici* & Monoceros, aliis; Unicornia nominantur. Nomen a cadaveribus, quibus vesci dicitur, trahens; Nar enim Pictis cadaver dicitur, *Worm*. etiam plures pisces cadavera fecerunt. Hujus piceis definitionem vide §. XI.

§. XIX.

Dentem habes unicum prælongum in sinistis superioris mandibule parte Cavitate seu alveolo suo per gonaphothia insertum, non secus (vel *Wormius* p. 286 loquatur) ac dentes aliorum animalium suis tharnis inserantur. Cornu *torquato* simile. Hinc cum *Wormius* & aliis auctoribus Dentem appellatur, quod cornus, quæ audiant, vel jussu impetu vel ex fronte vel in alia erant superficie radicata oriuntur, non ex ore vel mandibulis animalium procedunt; unde piceis *Narwhal* recte *Arctico* Monodon audit. Sic *Babiroussa*, ex porcorum genere exteros, præ-

prælongos & recurvatos, vel etiam Aprorum Dentes, quos venatores *Arima* nuncupare solent, non ausim dicere cornus; ut prætermittamus inutilem controversiam de dentibus *Elephantis* recurvis, cornus an sint, nec ne? cum *Plinio* a) scientes: Qui dentes externos esse *Apro*, *Hippopotamo*, *Elephantis* pronuntiavit. b)

a) *Lh. X. Cap. XXXVII. scil. LXX.*

b) *Ibid. Lh. VII. cap. 112.* Arma nuncupant, quæ *Tela* Cornus appellat. Herodotus tanto antiquior, & confusio melior, dicitur. *vid. Herodotum in notis Ibid.*

§. XX.

De *Fistula*, *Finnis* imo de forma hujus piceis auctores non conveniunt. *Wormius* (qui piceum non vidit) ex duobus fistulis aquam rejicientem piceum vel pinxit, vel a *Sculenio* Episcopo *Holenis* pictum obtinuit; hanc figuram, quæ fistulas, adoptavit *Tulpus* a) addidit nihilominus tamen: „in cadavere piceis 1643 invento, duo illa foramina in cervice, præ flacciditate in se confusione, delussisse. *Wormio* vero contrarius videtur ipse *Episcopus Holensis* ab illo p. 286 citatus, quod in occipicio respiciam, non respiciam, piceum habere scribit; de *Vriesio* vide supra §. XIV. concul. etiam §. XVI. *Rochefortius* non contentus duabus fistulis, tres huic piceis affinxit, ex cuius descriptione figuram suam fecit *Valentinus in museo muscor. Parte I. Ille*: Elles „ont trois trous, en forme de soupiraux, à la naissance de leur Dos, „sur où elles vomissent en haut toute l'eau superflue, qu'elles ont avalée &c. Quod ad pinnas attinet, *Wormius* recte dicit ipsi assignavit laterales b), in dorso autem loco pinnae perperam tubera tria & levitandum *Schlenium* duo) unumque in ventre. Hæc tubera *Tulpi* figuram exhibent *Rochefortii* autem descriptio sequens: „Elles n'ont, „que deux nageoires aux côtes, & une large & grande Empanure sur le dos, laquelle, étant plus étroite au milieu, fait comme une double „oreille, qui s'élève en une forme tres propre, pour fendre commodement les Eaux; „interim figura, quam dedit *Rochefortius* vel alius, valde abulit ab hæc descriptione.

a) *Observat. med. Lib. IV. cap. LXX.*

b) Laterales dicam pinnas, non ventrales; & quidem non solum *Physicorum*, qui *pulmonibus* vero gaudent. sed quoque reliquorum piscium, qui *branchiis* habent; 1. quod *læpiss* pinnae *branchiales* & ventrales præmittit pro vitiis indeque sumantur 2. quod in *monodon* piceis laterales pinnae cum dorsali alia vel in thorace (ut *hæc monodon* utat) vel sub gastero concurrunt; 3. quod *insipie* minus accurate appellantur *branchiales*; quippe in piceis *branchiis* apertis pinnarum perperam, unumque laterale pinnæ caput *Gruo*, nihil plane commune habet cum *branchiis* in capite.

te, in piscibus vero branchia oculo (Mareca & Lampetra, quæ illis omnino carent, exceptis), vel pinnis vel longius a spinulis bianchiæ distant; 4. quod proprie loquendo, pinnæ laterales non branchia inserviunt, sed ut pinnæ eorum agilitatem vellem fore usque agere transire, quæ aves adrem virgile ælarum, prout loquuntur classici, Reges in Alpibus, Willughb. Lib. I. Cap. II. p. 4.

§. XXI.

Quodvæ vel cæco impetu Rochefortium sequi teneremur, duæ piscis Narwhal species haberemus; minimum, præter illum, adhuc Monocerosum vel Unicornum marinum, præterito terrestri æmulum: Corpore scilicet squamato, dorso longa pinna ferrato, capite equino & (quod magis est) coronato, in fronte cornu turbinatum ferens. Verum Rochefortii narratio, quam ex relatione Domini de Montel a) nobis reliquit, per multum manca, fidem facere nequit, etiam si Dominus de Montel suspensum ad stationem nullum excubantium caput mirabilis huius unicorni viderit. Sane animal hoc, sine præiudicio consideratione, cum pisce Urelis feram, ad instar pristis piscis, in fronte habuisse b) ad unam eandemque classem, nimirum labulorum piscium referendum esse, iudicamus. Verisimile enim est, milites in excubis otiosos dentem veri piscis narwhal, vel in litore inventum, vel ex tali pisce naufragio desumptum, cranio equino applicasse, hocque speciosa quadam corona exornatum, ad instar Trophæi, juxta stationem suam suspendisse; Historiam vero inde enaram adeo non miramur; cum homines sæpius plus tribuunt auribus, quam oculis suis.

a) Quem non testem ocularem, ut vocat Rochefortius, sed secundum ipsius relationem circa finem, scilicet ex audita fuisse autum. Porro etiam vel Rochefortius vel D. de Montel Oceanum Atlanticum consulerunt, qui pariter Narwhali cornu in Bontæ tribuit.

b) Apud Albrechtum de Crui p. 69.

§. XXII.

Ad ejusmodi hallucinationes dirimendas, fortunato haud procul Hamburgæ in Albe flumine mente Februarii anni 1736 naufragum precis Narwhal caprus, qui mox in manus meas venit, æt incitus, cum de Tab. (scriptio). Figuram recudi curavi. Tab. II. C., quod melior nonnumquam profluit a); Exuvias vero huius piscis naufragi, Serenissimum Poloniarum Regis AUGUSTI III sumptibus, factas in Regali musæo Dreidensi anno 1737 vidi & observavi.

a) Nulli fere II in HIS, jam expedito, & Tabula II sum. anno 1737 f. sculptæ, effundit demum anno 1740 figuram recutam in Transatlanticis Philippi. Angl. N. 447.

§. XXIII.

§. XXIII.

Figura corporis ad ovam accedebat; capite erat parvo, vix a reliquo corpore distingendo, ita ut Acephalus videretur; Arctode villum caput Cyprini; si comparatio fieri debet, nobis apparer Buloncum. a) Longitudo piscis a capite ad caudam æquabat 18 pedes b). Dens unicuique cornu turbinato similis, sex pedes longus & recta protensus ex mandibula sinistra, ore admodum parvo. Lingua palmam lata; Cutis pollicem crassa, lævis, maculis albis fuscisque, ad instar Tigridis varia; unica præterus fistula transversum cutem perforante; oculis parvi moduli; binis pinnis lateralibus, pedem circiter longis, duas palmas latis; quod vero Vermis in dorso: Tubera, & Rochefortius: Epennure appellat, non nisi linea est cutanea, spisso adipe facta, principium habens in medio dorso, ultra tres pollices alta, versus caudam læge decrefcent. Cauda horizontalis pedem cum dimidio lata.

a) Rochefort p. 17. scribit, habuisse caput oblongum, apertio haud dissimile; quod insinuat.

b) Confr. Thysii Narwhal anno 1669 caprum, 18 pedes longum; & Rochefort monac. p. 54.

§. XXIV.

Balenæ Narwhal æque ac Orca & Pristis piscis persequitur, & non nisi necesse Balenæ linguam appetere perhibetur. Quandoque, piscis velocissimus & impetuosis, navem pro Balenæ habens, & cum impetu in eam ruens, fracturam dentis patitur, apice, qui maximam partem, paxilli ad instar, parvi navis insinuat. a) Hanc piscem inter PHYSETERES demum excipiunt:

a) Reliquæ vid. apud Warmian, Willughb., Tulpium, Seicham, Martensium & Zorgerum.

§. XXV.

DELPHACES s. PORCELLÆ: Piscem Pulmonibus respirantes ultimæ magnitudinis. Omnes pinguedine lardoque porcos terrestres superant, non tamen comparandi cum Balenæ & Narwhale; hinc Porcelli, s. DELPHACES, quod imprimis caput habent in rostrum porcinum exiens (§. XII.)

§. XXVI.

Horum tres species (§. XII.). Prima: Rostrum porcinum sicut i. e. lato, nonnulli repando, simile naio similis; & dicitur:

*C 3

§. XXVII.

§ XXVII.

ORCA: Delphacum maximum; ab antiquis inter Balenas perperam numeratus.

Variet ejus descriptioes sub nominibus confusis, ut videre est apud *Rondeletium*, *Bellonum*, *Paulum Jovium* &c.; quoniam *Theodorus Haseus* quem Celeb. *Scheuchzerus* in *Phys. sacra* secutus est, ex Orca fecit Leviathanem, i. e. Balenam omnium maximam. Vulgat & *Rondeletius*, de Historia piscium summe meritis, in eo, quod orca dentes latus & leviatotes esse recognovit, cui *Aristides* fidem tulit, recte licet hunc piscem Delphacibus associaverit. Nos Delphacibus omnino accensendum esse, sequentibus perivasi sumus rationibus:

1. Nemini ex familia Balenarum vel magnitudine vel forma capitis par, cum secundum Bellonium raro 1000 libras pondere superat, capitis autem figura cum Delphini capite quatenus eadem sit.
2. Imo Delphini eo *Tursi* adeo similis esse dicitur, ut non solum Martius (Meerschwein, Porci marini) nomen sibi vulgo vendiderit, sed & pro Martiano publice exponatur. Cavet quoque *Martenius*, qui Orcas à 16 ad 20 pedes (nisi error sit in numeris) vidit, ne cum Delphino confundatur, notamque addit: quod orca rostrum sit aequalis crassitie à radice ad apicem, insuper finem & sursum repandens, cujus labii inferioris tanta crassitudo, ut a superiore sejungatur, dum piscis pronus est, confertur *Ughtr. Dn. Hans Sloane* *It. Jam. I. § 5* "This sort of Whale, which is the least, and of the same Kind, with the Dolphin or Porpoise, is about forty Foot long, and proportionably broad, is smooth, and of a dark brown colour in the back, and has two Channels in the Head, (intellige, in Cranio.)"
3. Rajus evidentem orcam in Balenarum classe cum aliis auctoribus collocavit, verum ipse dubius fuit, an sit Balena *Martenius*: *Bustkop* i. e. Flounders-five Bottle-Head *Dales* capite ita dicto a figura, quam fert, agens. Nos *Daleum* secuti sumus, qui Balenam *Bustkop* non solum latius accurate descripsit, sed & egregram ejus figuram communicavit, hinc Balena *Martenius*: *Bustkop* utique ab Orca separanda.
4. Communiter truculentissimum; inter pisces pulmonibus respici-

respirantes, & Balenae infensissimum animal audit, XL. inferioris dentibus (imo pluribus, *infra*) instructum, ut Balena ab orca insecta horribilem edat mugitum, non aliter, quam cum Taurus mordetur a cane a). Hinc Orcam Balenis associare merito abstinemus, quarecum Balenarum verecitas.

5. Orca prout Delphinus & Tursio f. Phocaena, ad naves absque metu accedit, easque diu comitatur, praedae inhians. *Schaeffer.*
6. Cranium denique Orcae est Cranium Delphacis live Porci.

a) Orca cum Balena comitatur bella gerens, & toto orcaeno cruentissimo praesidio utitur in dimicant. *P. Jov. de Rem. p. 57. Cap. 2.*

§ XXVIII.

ORCA itaque est, quae *Sibbald* dicitur Balena minor in utraque mandibula dentata. *Grampus*, *Smith. Virgin. p. 23*; *Billers Ph. Trans. No. 38. Capidoglio Pauli Jov. Cap. 2. a)* *Groffier Braunfich*, *Tandthey* vel *Spranger*, *Loper*, *Hackel*, *Oersichwein Schaeffer*, *Porcus MARINUS MAJOR Gesneri*. *Meerschwein Kuhnii Cap. II. §. p. 204.* Raro in mari Baltico capitur, in quod tamen ad Sinum usque Botanicum aliquando irruunt. Balenae b). In sinu Poccni prope *Gefanum* Orca est capta, cujus Cranium in Bibliothecam *Amplissimi SENATUS* a D. *Christoph. Gottwald* illatum, haecenus pro Cranio Delphini haustum. Ed totum ponderose osseum, quod in dimidiata magnitudine inter reliquorum Delphacum Crania exhibemus Tab. I. no. I.

Tab. I.
N. I.

a) "Capidoglio a relicto orcaeno vocatum est cardidolum, quoniam frequentia populo."

b) *Coel. Coll. Praed. Dentem XXXII. p. 217. & p. 220.*

§ XXIX.

Ab exitu inferioris mandibulae ad usque foramen magnum Cranium longitudine abscissis 23 poll. Rhin. cum dimidio; ab exitu superioris mandibulae ad radicem rostri 12½ poll. ab extremo mandibulae superioris ad occipitis apicem 18½ poll. aurescentes. Duae habet foramina, pro ut a *Rondeletio* omnibus *Physeteribus* communia descriptum (§. 14.) Radix rostri lata 5½ poll. occupat latitudo 11½ poll. altitudo 9 poll. — Deutca, naturalis magnitudine separatim delineatas vid. *ibid. fig. I* — 4. Tab. I. *qv. c. 4.*

quæ cum dentibus Delphini & Phocæ nullam habent similitudinem. Ex detritis dentibus colligere licet, animal hoc, prope porcos terrestres, mathematicè capitum constanter. Singuli alio in maxillis, prout dentes quadrupedum, hærent firmis rectis simplicibusque radicibus, secus ac in Delphino & Tursione; Sunt autem dentes inferioris mandibule XLVI, superioris vero L, in summa XCVI. Sufficiant pro hac vice, quæ de ORCA, sunt dicta, DELPHACUM Familiz Antesignano. Alter eorum est:

§. XXX.

DELPHINUS (g. XII.), nomine proprio notissimus, licet sepius cum Phocæna confundatur. Minor est Orca, major Phocæna seu Tursione. Oris fissura longissima, quæ ad ungem clauditur, velut corvorum os. Dentes ejus sunt subuliformes, ad instar Lucii piscis, acutissimi & pectinatinè coequentes, quibus læsio levissima venefica est; a) Fisulam in cute habet simplicem, in cranio fons est duplicatus. Cranium ex Muleo olim nostro Tab. I. n. II. ad medietatem redactum, pl. N. II. scem vero integrum, ab egregia illa pictura, quæ ad naturalem magnitudinem in Curia Gedaniensi præter alios pisces rariores exposita est; de Tursione b) pro ratione Tabule III. lit. A abbreviatum tradimus, ita ut de ejus forma nullum amplius supersere possit dubium. Quod autem ad ipsius staturam b) attinet:

a) *Spil. Danicæ. Phil. III. p. 42.*

b) *Reinhold. Curie Danicæ. Hist. Descriptio. p. 297.* Anno 1619 den 7 Julii sind bey Kræden in der Stedens prætor grossi seltsame Fische, welche oben aus dem Kopf viel Wasser geschossen, gesangen, und zu Danha abgemacht worden; mit dem auch ein grosser Schmerblich anno 1630 den 12 Octob. bey Sieda ist gesungen, und geschmückt abgenommen worden, hies Gmähde in der grossen Altesse be aufst. Daus noch heutiges Tages in Sieda seht.

c) *Labat Voy. de l'Amérique. Tom. V. p. 412.* Flaton meminit, qui parum distat a Delphinis nunc medietatem. A la Martique une tres grande quantité de Souffleurs s'élevaient sur les côtes — Je croi, que ce poisson est le même que celui qu'on appelle Dauphin dans la mediterrannée, ou que s'il y a quelques différences, elle est fort petite. Vide descriptionem. *Idem.*

§. XXXI.

Longitudo piscis ab extremo rostri ad exitum caudæ, mensure Rhinland. pedd. 9 cum a poll. Fissura rostri a b. 13 poll. cum 1. Fisula a b extremitate rostri distat 16 poll. Oculi magni, ab uno cantho ad alterum 3 poll.

Pinnæ

PER PULMONES SPIRANTIBUS.

Pinnæ laterales longæ 16 poll. latæ 10 poll.

Pinna dorsalis incurvata in basi 13 poll.

Ejus longitudo ab angulo, qui antroscum ad exitum 18 poll. cum 1.

Cauda dimidia 12 poll.

Crassities mediæ corporis 25 poll. cum 1; quatenus nimirum a pictura desummi possit in linea recta transversali.

§. XXXII.

Dentium radices in ipsis gingivis hærent transparentes, non in alveolis five Pharnis, prout videre est Tab. I. n. II. In superiori mandibula cranii delineantur numeravimus 96, in inferiore 90; in summa CLXXXVI. Falluntur plurimum, qui tales esse putant Delphinos, rependo dorso incurvos atque inflexos, quales in utroque marioribus & Nummatis depictos vident, prout movet Bellonius de Aquat. Lib. I. p. 9, qui cum p. 8 describit, quod sit „quinque vel sex a) pedes longus; crassius autem, quantum hominis amplexus b) concludere possit; ceterum glaber (prout canes Phyleeres) ac sine squamis, siliante tergo, ventre albicante, rostro tereti, tenui & oblongo, in „panctis modum; quamobrem vulgus marinum autem appellat, Oye de mer, conf. Bellon. singul. obser. p. 161: Dentes Bellonii numeravit 160. Idem recte. „Fisulam (non Fisulas) inter oculos gerere, „per quam & aerem attrahat, & aquam rejiciat, p. 83: non deceptus duplicato fonte in calvaria, cujus integram tradidit figuram p. 143. Ceterum palpebras c) habere narravit, & meatus ad audiendum, in quos si fissuram adgeret, proxius eos ad ossa petrea desinere compertes. Karo Delphinus in mari Baltico apparet, rarissime Gedaniensium littora sitians. Fabula de Arione sitis nota est:

— Sed quid non Græcia mendax
Audet in historia.

Ultimus DELPHACUM:

a) Vid. §. XXXI.

b) *Ibid.*

c) Quæ *Randolphi Lib. III. cap. 2. p. 47* omnibus piscibus denegat: addens: quod „palpebrarum defectum coarctæ pensaverit natura, quæ undique oculum ambit, non ex adverso papille tantum, ut in hominibus.

°D

§. XXXIII.

§. XXXIII.

TURSI five **PHOCÆNA**; (§. XII.) parvus Delphinus; Delphinus septentrionalium; Klein Meerchwein; Braunsfisch simpliciter; Tumbler vel Springer; a) Mariouin; *Anglis*: Porpoise. *Maren* XV. 7. m. Maji 1730 cultro Anatomico subiectum (*Miss. L.*) representat Tab. III. 16. b. *Hist. B.* ad quartam partem magnitudinis naturalis; plicis enim æquabat quatuor pedes Rhinlandicos. Mearum auditorium externum albidum circulo indigitatum *Hist. B.* quod aliter dignosci non potuit, quippe Phycæres auriculis caret. Communicamus pariter *Fatum Cæsareum* 20. 7. n. poll. cum dimidio longum Tab. II. A. B. sic, ut simul lunatam fistulam a. b. in cute b) & lingvam c) distincte contemplari liceat. Lingva variis fibris intertexta, quasi fimbriata, oris pavimento mandibule inferioris firmiter adhaeret, & contra Delphinus lingua est mobilis; quæ modo exeri modo coadi potest, & longior lingua Phocæne. Narces 7. m. Tab. III. a. a1 (vide etiam *Tabulam II.*) sunt pusilli, de quibus in *Missu lmo.* Cranium denique integrum Phocæne ex utero caeli & notat; ultra manū elaboratum, una cum dentibus separatis d) exhibet Tab. I. 18. m. 24. III. Plura ad Phocæne huiusmodi naturalem quæ attinent, vide in *Missu primo.* Quod reliquum est, *Albrocaulus* e) equeidem monet. Quæcumque de Delphini utroque sexu scripta sunt, Phocæne similiter conveniunt, & nisi Phocæna rostrum brevius haberet, Delphinus fore undiqvæque similis foret; artamen ex antea dictis, coloris simul figuris, manifesta apparebit Delphacæna dissimilitudo. Incidendo adhuc monemus: Pileem in *Collo. Vratilav. Tentamine XXV. p. 542*: in Albe flumine prope *Doruhufch* naufragum æronece Phocænam dictum esse, quod clarissimus autor *Phocænam & Carchedon* pro Synonymis habuit; prout etiam *Jonston de pisc. Lib. V. p. 221* Phocænam, quam 2000 libras pendente perhibet, *Oream* fuisse suspicatur.

a) De Delphinis in genere *Ovid. metam. Lib. 12.*

Undiqvæ dant filius, multaqvæ alpergine rictus,
Emerguntque iterum redeuntque sub æquora rursus,
Inque clausi sunt speciem, Intraque Jactant
Corpora. & acceptum palas mare nobis effant.

b) The pipe or spout — is very curious, arising from the Palate with a single foramen, but when it perforates the Cranium, 'tis divided by an oblique septum into two, but above it is united again into one, arising in the Skin a Kind of Semina- nti rib or Foramen. *Hyd. Phocæna* p. 26. Spiraculis illa duo in capite obvallant quædam quædam flexa vel labijrimæ, ut spiritum vel ærem temperantius. *Zk. Barthelemy, Hist. Anatom. Cent. II. Hist. XXV.*

c) 50

e) So freely situated all along to the bottom of the Mouth, not to the Palate — that it can't enter or dislodge its self out beyond the verge or Limits of the mouth. *Hyd. p. 34.*

f) The Teeth are not situated in distinct sockets or Cells as is usual in other Animals, but only by a strong membrane or cuticle, there being one common furrow in each Jaw, into which the Edentulous of all of them are received. These teeth are so loosely and short, that they seem unfit either for mastication or fight, but only to detain their Prey till such time as they can conveniently swallow it whole. *Hyd. p. 35.*

g) De Cælis p. 123.

§. XXXIV.

Abioluta jam naturali, indocta quidem, dispositione **PHYSETERUM** vel **ELATORUM**, i. e. *Physum*, qui pulmonibus gaudent, veniam me imperitum iterum iterumque confido, quod plures ab autoribus recensitas balanus, vel tanquam suspectas aut nondum satis notas, vel tanquam plane alienigenas, præterierim; multa latent quæ in luce exposita credimus. Interim non despero, quia & plura ejusmodi animalia, si vel genere vel specie inter se diversis sunt, imo & reliqua, quæ oculos hominum usque adhuc subterfugerunt, si aliquando in conspectum venirent, hanc dispositionem haud difficulter subirent.

§. XXXV.

Brevem esse, inquit *Plinius Lib. 5. Ep. 6*, qui facit, quod infuit; sic patientia lectoris non abest, si enumerabor reliquæ materiæ, quam Frontipicio hujus *Missus* inscripsi singularia, scilicet: *De dentibus Balænarum & Elephantinis*; *De lapide Manari & Tiburonis*. Quanto ocyus autem hunc excursum abolvere anuar.

- c) *Hist. Mexicana* cap. 215, apud Claf. p. 326.
 d) *de pilis*, *Lih*, XVI, cap. XVI, ex Ovidio.
 e) *Hist. anim. Lih*, VI, c. 31.
 f) *Apud Clajum Lih*, VI, cap. XVII.
 g) *Apud Eudemon*.

h) Et *Mercurius*, de Manato *Lih*, IX, cap. XIII: quoniam deservit: vitulo patem, ex primo capite lamenit, cum anteoribus brachiis, forma falcum, & pulu testum variis — & maza, & litoris (ita tamen ut nonnullam delectat agros) visum agentem, & habitis litoribus — vescecent. Credo est alio obstando, ac transversum lica. Caput & os visiolunt, magna nates innumere, auriculae parvae nec non & vultus, parvi dentes, albescentes, & cernum tunculo crassius, ut firmius, litoribus hanc anteorum parte lica, quoniam diffusio unguibus, humanis similibus, ac plantarum formam referentibus: umbilicus patulus est, anasque; vulva muliebri, penis equinus lica. *Mercurius* enim p. 23 Boetium incolpat, quod, dum Tiburonem describere tentat ex *Thucydide*, Manatum delinquit, ut cum Clajis dubitare videatur, an Tubero a Manato differat: quia diversissimos pilos esse, eorumque volute. Plura de Manato apud *Quintum in Aeneid*, Phaeac; cuncti *De Perseide* *Boetius*, *ancora*, *non vixit moritur*, *nonnullum* *lapis* *multos* *venas* *praeloditum*. Piles esse omnia animalia quae in aquis vitam agere possunt, licet nec in aquis generentur, nec oculis in ipsis permanant, sed necessarii aquam egrediantur, imo lites, contra naturam piscum, per viresque munda vel annuam raris aquam vivunt, quoniam tamen, clausi, possunt avariari, quod regem ipse expertum sum non solum in Phaeac sed & in Cellotis. Sed *Plinius* *Perseide* *murari* videtur, carcharias Phaeac majora volumina esse carcharias piscum: *«les regis & les cavités du cerveau écouent comme du venin: mais il y aroit plus de cervelle à proportion, qu'il en y en a dans le tête d'un veau: de qui est contra l'ordinaire des poissons, qui n'ont que de tres peu de cervelle»*. *Et perre*: *«les naturalistes ont observé, que cet animal ne laisse rien de la bignité des poissons, mais qu'il égale la bignité la plus subtile des animaux terrestres &c.»*

§. XLIV.

E contra TIBURO vel TIBURONIS; Tiberaon vel Tuberon *Lufit*, quoniam *Rondeletius* n) pariter ex genere vitulorum marinorum esse putat, *Gesnerus* b) vero *Gladium* nati ipsi cognatum suspicatur, utique piscis est, & quidem *Galeorhin* omnium maximus, qui *Canis Carcharias* *Lamiae Rondeletii*, *Gesneri*, *Albrechtii* & *Thomii*; a 1000 ad 4000 libras *Margenot* c) optimis cognitus, & de quo aliquid excrevit. *Willagb. all.* I. minime dubitat q). Tum in *Mari Mediterraneo*, tum in Oceano abunde reperitur. *Bellonius* c) differentias *Lamiae* & *Carchariae* in eo ponit, quod *Lamiae* os in anteriore capitis parte tribuit,

Carcha-

Carcharia vero rostrum in mucronem exportectum. Ille Graecis *Adonis* audit:

Et quis vastus Aper superabit robore *Lannam*. *Oppidii*. Communiter eniam *Lamiae* cartilagineo pilici planus & latus, longe maxime mollis, dicitur; sed hoc nomen a multis *Canis Carchariae* imponitur; hunc *molli*, dicitur; *Lannam* appellat. Sufficit, hoc loco nosse, quod *Tiburo* & *Manati* diversa plane animalia sint; & recte *Joan. de Laet* g) quod male confunditur *Tuberon* pilici, qui non alius est, quam *Canis Carcharias* aut *Lamiae*, cum *Manati*. Sic quoque *De Swabb* h) *Tiburon* aut *Shark* be all one, & dicitur *frou* a *Manati*, or *Sea-Cow*. Supra nominatus *Gomara* in *Hist. Mex.* miranda & vix credibilis de *Tiburone* narrat.

a) *Lih*, XVI, cap. XVI, de *Pis.*

b) *Sab* *Tab* de *Can. Carch.* *fou* *Lamiae*, *Lih*, IV, p. 197. Hoc autem ex *Cillio* habet; *Rondeletius* & *Quintus* *exaltis* *Willagb.* *Lih*, III, cap. I p. 49.

c) *Tab*, *Pis.* *Cap.* *XVI*, p. 10. Ille obest monendum, quod autor non nisi ipsum *Thucydem* parte caput in utroque latere inferiorem faciat, cum revera omnes *galei* & *scorpaenae* sunt rostrati. De quibus in *Missa* III.

d) *Occidentis* *Nierand.* *Lih*, XII, c. 20.

e) *De Aquaril* p. 28.

f) *Mercurius* p. 233. *Concl. Scopari*; *Dissert.* *Cap. Can. Carch.* — *Aug. Scilla* *una Speculor* — *Boet.* *Boet.* *litter* 29.

g) *De Gm.* *Cap. Lih*, II, cap. XVI.

h) *Obiter*, *made* in a voyage to the *Cinthee* Islands; *Epil. Martini*, *Edil.* III, 579.

§. XLV.

Modo, licet superflue, consideratis diversis animalibus, *Manato* & *Tiburone*, eorum, qui vocantur, LAPIDES paulo propius inveniamur, ac in *Missa* I, §. XXII, p. 22. & §. XVII, p. 11. fieri non potuit. Quod ad LAPIDEM MANATI pertinet, cum (§. XLII) diu obtinuit, *Manatum* piscem esse (vid. *Missa* I, §. 1.), aliter fieri non potuit, quin & convetudo introduxerit, certa corpora dura ex *Manati* capite lapides dici, pari ratione, prout alia corporcula dura, quae silicea, vel etiam tartarea substantia, in omnium piscium capitibus lapides audiunt. Infirmitatem meam sculo, quod diu duntaxat intelligere non potuerim, quid hae sibi velint: Invenitur in capite *Manati* pilos, ex genere Phocidarum, pedes elephanticos vel umbilicus humanis similes habentis, manfiscitatis, hominum genio se accommodantis, piloli, gramine & al-

*E a

g a

ga vescentis, herbasque in litorebus depaſcentis (virtutibus reliquis) *Lapides*, parve piſce ſubſcrie magnitudine, interdum & grandiores, pro piſcium magnitudine, non tamen orbiculares illos, ſed ejus eſſe forma, quod in baſilla reſilium nervum retinet, & quidem: prout lapides in *Caracini* & *Umbra* capite a).

- a) Conſule *deſcriptis* ſuperius *Wormium* p. 18 cum quo & ego pacem tantarum vitium mali gram exhiberent capto; in conſpectu licet *Wormis* ſubſtituere negavimus.

§. XLVI.

Volutis itaque & revolutis libris, *Lapidumque* figuris *Manati*, quæ apud *Chyſium* a) & *Joannem de Laër* b) exhibentur, plus ſimplici vice ſedulo inſpectis, tandemque in memoriam revocans manuſcriptionem *Illyſtr. Du. Hans Sloane* c) in verbis: „The Manati Stones are „brought from Samana, and taken from behind the Ears of that Ani- „mal, each Ear having one, venie mihi in ſuſpicionem, nihil aliud eſſe *Lapides Manati*, quam quæ in animalibus terreſtribus æque ac in phyſteribus appellantur *Oſſa petrea* vel petrolea d). Sed ecce, nova ſollicitudo; Decretæ mihi exemplum, ab omni parte inſpicendum; hoc tandem mihi benevole ſuppedinabat amice colendum *Nobil. Du. Conrad* Be- rolinienſis, cui jam cranium piſcis, quod *Gyrodontia* ſer (Miſſ. I. p. 22.) debeo; modo nullus dubito, quin illius utriusque delinque figura T. IV. Tab. IV. fig. 5 & 6. pariter referat dimidiari *Oſſis petrosi Manati*, vice & 5. 6. ſi conſeretur cum figuris, quæ tam apud *Chyſium*, quam imprimis apud *Laëtum* proſtane e). Cochleas cavitates, vel natus auditorios, qualescunque appellaveris, ſe mutuo excipientes, exploravi ſeris porcinis 22. bb. aa. & bb. Tertio ſæc. c. os perſtrinxit reſilavit; Reliqua peritoria committens, vel illis, quibus ejusmodi *Oſſa petrosa Manati* integra & inviolata ad manus ſunt.

- a) *Ench. Cap. XXXII.* p. 226. *Figura* Lapidis Clauſi inſcripta titulum, *Lapide Tiburonum* habuit, ſed verum *Manati*.

- b) *De Gen. & Lap. Lib. II. cap. VI. conſ. Lohes* p. 29. *de Amerigo* Tom. II. p. 200. ubi ſignis: quæ *Lamentis* vocat: „Les h'ſpagnols appellent Manati ou Manati, c' eſt à dire, poifſon qui à des nains, de qui nous appellons Lamentis, on „pourroit, ce me ſemble, l'appeler le vache marine; ſa queue, ſes mandibles, „ſa manote de maître deſont ſes pennis, & les ſillates ayant beaucoup de rapport à cet „animal terreſtre. ſer non obſtante, ante pag. 221. hujus manati pedes poſſunt minus diverſi, quam pedes vel manus; adeo, tamen p. 200.2. „je ne ſerai que- „telte à perſonne pour ne pas embreſſer „on le conſer.”

- c) *Phyſicæ* ſi *Yamala* & in interſect. p. 2. XXX.

d) „Perperam

- e) „Perperam conſideratur cum lapide Tiburonum — neque proprie lapis dici poſſet, ſed „ſpiciatur cuſiſſimum miſſe lapide. Figura autem ut plurimum talis eſt, qualem exprimi „convenimus. *Leet. all. i* Wormis rem quadratoſius æta teſig p. 54. „Uti ſic „anthropus dicam quod ſua eſt: illud, quod pro lapide Tiburonum vendunt: la- „pide non eſt, ſed ut ad audient ſpectare, quod in omnibus *Oſſis audient* habem- „us repetitur: ſicutque ab Anatomis cochlea, cavitæ cochleata buccinata, „antur buccinatum: nam gyrus habet ſe mutuo excipientes, æque tenuiſſima „nec molliſſima membrana ſuſtingitur. Quod & *Oſſis* diſſectæ non videtur „eſſe *Manati* agens ſer. u

- c) Quibus addit *Nauphi* vel *Helma* figuram ſi. G. Tab. LP. II. *Maſ. Amſtel.* p. 312. ſe „nat, ſen Seem uyt het hoofd van een Zeehoſ: cui vocum eſt lapis: uyt het hoofd „van een Zeevuiſſel ſi. ſi. ſiſſus ad lapide conſum vel omnem aliter ſerendi referenda. — „Du. Perſonæ all. I. de Phœno oſſe (entre le gros & le petit cerveau) verba ſerent, ad- „dit: „cet os eſt plus & pointu, & non rond & maſſif, tel qu'eſt celui qui ſe „trouve dans la tete du Lamantin, qui eſt une eſpèce de veau marin des Indes oc- „cidentales, & que l'on trouve ſer un os, qui a une vœte parſaſſière pour diſſoudre „la pierre des reins & de la veſſie.

§. XLVII.

Ex dictis tamen non inferendum eſſe iudicamus, Animal MANATI piſcem *Ceraceum* fore, vaſtiſſimi Piſcium *Cocconibi* Clauſura ſubiens, vel ideo, quod paria cum *Phyſteribus* habeat *Organi auditus*, quæ oſſa petro- ſa audiunt. Si quis enim ſic perverſe argumentetur, ſequeretur, quod omnes *Phoce*, *Caſſor*, quodpote licet, plagiarius tamen, & quidem cauda quaſi ſignata, pedibus poſterioribus, prout *Phocæ*, anſerinit, nec non *Gracoli* & *Salmandra* argenteæ, qui plagiarii ſunt; cauda ver- ſticulari plana, piſces ſerent *Ceracæ*.

§. XLVIII.

DE TUBERONIS LAPIDUM numero auctores non conveniunt. viſſ. *Miſſ. I. f. XVII. p. 11.* Alii duos, alii, prout *Moſcardus* & *Col- eolarius*, non niſi unicum in Capite Tiburonis vel *Lamæ* ſive *Canis* *Cerachæ* numerant. *Chyſius*, cum auctoribus citatis, ternos alios quater- nos, interdum plures, ex parte concavos, valde albos, magnos poſterioriſque, ut quandoque duas libras pendent, & qui facile abradi poſſunt. Veritate conſonum audit, plures dari lapides in capite *Lamæ* vel *Tiburonis*, quæ duos; ſi enim piſcibus diſtinctiſſimis ex. gr. *Raje* (*Miſſ. I. p. 3. 4.* cartilagineo, & piſcibus ſpinolis commune ſit. quod tribus paribus vel ſex lapillis minimum gaudent, quidni & aliis ejusdem generis piſcibus, ut *Raje* & *Tiburonis*. Subſtantia *Lævis* molliſſima, friabilis ſatius pollinis, & candidiſſimum lapidem eſſe dicis; cumquo conſe-

conferatur *D. Strab. supra all. l.* „The lapis Tiberonum is a kind of friable calx, when it is brought hither, yet when it is first taken out, it is not so. But a white substance, near approaching to the nature of any brim, ad encompais'd in a transparent Gelly (proul lapilli in crassius pitium ipino/orum) „The Gelly dries all away, at it is expos'd to the sun, and the white Sublance dries into the Body, he speaks of., Quid satis convenie cum observationibus nostris circa lapillos in capitibus Rajæ; Nulla quidem nobis est occasio, linteras Tiburonum scrutari, quod aliquando eruditè Curiosi juxta mare mediterraneum in se luscipiunt, incertum tamen LAPIDIS TIBURONIS, cujus mentionem fecimus in Missu lmo accuratam figuram fieri curavimus, eandemque in Tab. IV. f. 7. modo exhibemus; Reliqua de TIBURONE Missui III, ubi de PISCIBUS, qui BRANCHIUS & quidem OCCULTIS gaudent, reservantes; Satis mihi est, propolitam rem acu quidem pupugisse, quam aliis, quorum iudicio atque ingenui felicitati plurimum tribuo deferre, ac quorum delinodandam & demonstrandam trado; Jam colophonem huius Missui imponens verbis *Wormii*:

MANATI ram in fluminibus quam in mari capitur, teste *Oviedo: TUBERON* vero ceraceus piscis est tantum Oceani incola, teste *Francisco Hernandez*. Manati pedes habet: Tubero nullos. Manati branchias nullas habet: Tubero urringæ quinque. Manati piscis est, aut Amphibium docile, mure, hominum conversitudine gaudens; Tubero cæcis ferax, malestus, hominum devorator: a) multisque aliis inter se differunt proprietatibus —. Diverſi igitur cum sint pisces, alius erit lapis MANATI, alius TUBERONIS.

a) Λιθουονόψαρος, *Asiæti*.

Seneca Lib. VII. quæst. natur.

Cop. XXXV.

Natura munera sua non simul tradit: nec omnibus patent; reducta sunt, & in interiori sacrario clausa; ex quibus aliud hæc ætas, aliud postera accipit & deproinat.

In Missu I.

Corrigenda:

- § VIII. lin. 5 lege: Segerum
§ XI. — 4 post Rejus verba, pone:
16 in exim dele —
§ XIX. — 4 a fine, lege: assumptis
§ XXI. — 9 post verbum habebat, pone:
§ XXV. — 1 & a dele a
§ XXXIII. — 1 lege: compendiarie
— 2 — quas lubenter

- p. 7 lin. 1 lege: cunque
p. 15 — 15 — litori
p. 25 — 6 — interionem
p. 28 — penult. lege: dubrandi
p. 31 — 11 lege: ea sellis vesicula
p. 34 — 23 — cavati, mox in cuspidis acutissimas,
— 24 — hamatas, reflexi.
p. 34 lin. antepenult. lege: poruit
p. 35 lin. penult. lege: orbiculari.


Addenda:

- § XIII. post privarentur, adde: prout Turfiones creduntur
affare ludi, nec strepitum lequi, hyeme satis
burni. *Tb. Barthol. An. Hist. XXV. Cent. II.*
§ XXV. post varia existere, adde: vid. *Rampb. Amboin. p. 312.*
§ XXXI. ad finem in margine: — = *Tab. V. pag. E.*
§ XXXII. lin. 6 in margine: — = *Tab. VI. pag. II.*
p. 8 lin. 2 in fine, adde: Incurvos & carui hic scopulos & saxa frequenter Qui muros inter pisces clamore tremendo Innotat —
Oppianus; si genuina lectio est; nam inter sonabiles pisces
Ælianus H. A. Lib. X. c. 11. itarum non commemorat.
p. 22 lin. 2 post verba SANCTI PETRI adde: notam (c) & infra:
(c) Qui in pisce monstrato laterum *Matth. XVII. 14* deprehendit;
quem piscem tamen ait *Cartholus* ire «*Calchias* interpret
«*ignoscere*, radum despicere nulli fuit. *Crocl. Comita. lere.*
Noramb. 1716 p. 119 & 122 — An. 1730 p. 109 seq. non
nulla de hac lapsilla.
lin. 13 in margine: — = *Tab. IV.*
p. 29 lin. 10 in fine adde: vid. *Thyson. Phocæna p. 39.*
lin. 27 post figuram dedit, adde: vid. *Thyson. p. 41.*
lin. antepenult. post p. 6 adde: & 41.

In Missu II.

- p. 16 lin. 19 lege: verustorum auctorum
p. 18 lin. 8 lege: Ceti.

☆) * * (☆











A



B







JACOBI THEODORI KLEIN
HISTORIÆ
PISCUM
NATURALIS

PROMOVENDÆ
MISSUS TERTIUS

DE
PISCIBUS PER BRANCHIAS
OCCULTAS SPIRANTIBUS
AD
JUSTUM NUMERUM ET ORDINEM
REDIGENDIS.

CUM OBSERVATIONIBUS
CIRCA
PARTES GENITALES RAIÆ MARIS,
ET OVARIUM GALEI.

Jovianus: Audet —
Tritonum penetrare domos Glaucique recessus.
CUM FIGURIS.



GEDANI, LITTERIS SCHREIBERIANIS. 1742.

Seneca de otio Sapientis XXX.

Utinam quidem jam tenerentur omnia, &
inoperta ac confessa veritas esset: nihil ex de-
cretis mutaremus: nunc veritatem cum eis
ipsis qui docent, quærimus.

VIRO.
PERILLUSTRI. EXCELLENTISSIMO.
CONSULTISSIMO.

CHRISTIANO.
WOLFIO.

POTENTISSIMO. BORUSSORUM. REGI.

A CONSILIIS. INTIMIS.

ACADEMIÆ. FRIDERICIANÆ.

PROCANCELLARIO. ET. P. T. PRORECTORI.

JURIS. NATURÆ. ET. GENTIUM. AC. MATHESEOS.

PROFESSORI. ORDINARIO.

PETROPOLITANO. HONORARIO.

ACADEMIÆ. REGIÆ. SCIENTIARUM. PARISIÆ.

ET. SOCIETATUM. REGIARUM. BRITANNIÆ.

AC. BORUSSIÆ. MEMBRO.

HAS.

HAS. FLAGULAS.
ANIMI SINCERO. CANDORE.

VERBOSE POMPE. LOCO.

DICATAS. VELIT.

NUMEN. PRO. SALUTE.

VIRI

OMNIBUS. BONIS.

CARL


VENERATUS.

MATERIAM. IPSAM.

ALIIS. EXAGGERANDAM. ET. EXPOLIENDAM.

COMMITTENS.

AUTOR.



DE
PISCIBUS
PER
BRANCHIAS OCCULTAS
SPIRANTIBUS.



Expeditis nuperime *Piscibus*, qui *piscionibus*, more quadrupedum, gaudent, (Mist. It.) impraesentiarum nobis sermo erit de *piscibus*, qui per *BRANCHIAS* & quidem *OCCULTAS* respirant, in ordinem naturalem redigendis.

§. I.

§. II.

Sunt autem pisces *branchiis occultis* a) qui pone caput *spiracula* habent vel *lateralia* vel *thoracica*. b)

a) *Stenonius* in *dissecto pisco* ex canum genere *descripserit* vocat: „*Branchiarum* quinque paria sub cute *descriptoria* suos, sed exiguos habebant hiatus cum insculptos, hancque ore aequam emittentes.

b) *Brandeleius* Lib. VII. p. 119. minus distincte *branchias Thoracicas* in *media free corporis* disposuit: „*alii in medio ventris*. Thoracem piscium appellamus, ubi in raji similibusque fons est *spiraculorum*: „*Stenonius*, *Wiedemann*, *Willughbius* & plures auctores secuti. *Stenonius* de raji: „distinctum ab integre totam thoracem circum-

(A)

tem

tem membra pericardium desiderabat. Alii piscibus thoracem designare videtur, cum *ventris* appellatione prout integri corporis partem designare solent. Itaque est, quod pinna laterales & ventrales sepiissime conti. videtur, ut *relucere se dicunt*, an sint *laterales*, vel *brachiales*, an *gutturales* (prout in *Lep. doc.*) an *vera* *ventrales*. Insuper notandum, quod in ventre sepius pinnae plura, in lateribus vero non nisi una pinna addit.

§. III.

Spiracula variant numero: *Lateralium* sunt: vel quinque, vel unum, vel septem; *Thoracicum* vero consistunt quinque. *Branchiae* pulmonum vires libeant a. Per branchias itaque, eorumque spiracula abluuntur, quae in animalibus terrestribus audiunt: *inspiratio* & *expiratio* (b).

a) *Conf. Sp. Thom. Phil. Lond. 17, § 47. Ruj.* in *Willughb. Lib. 1. cap. 1.* de branchiis & respiciantur piscium. *Rondelet.* *Methodum lib. 4.*

b) Idemque praestant spiracula, quod operculum operculi vel ossa vel intermembrana in piscibus; quorum branchiae in capite utrinque sunt: i. e. per rostrum. one branchiarum & introducendo aëre & sumendo iterum demittendo, *Atrida* branchiae sunt operculum, quibus aërem aëre impugnavit hinc inde, & reddat, unde pulmonibus respondet; *Branchia*, & *lib. p. 22.* v. vid. ib. branchiarum descriptionem; utrinque p. 24. addo infra §. XXVIII.

§. IV.

Occultas dicimus *branchias*, quae *Rondeletio*, *Severino detestae* a) addunt. (Mil. II. §. IX.) Ut differentia magis elucescat, occultas branchias exemplis illustramus desumptis a piscibus vulgarissimis, spiraculis lateraliibus: ab *Anguilla* b) nimirum & *Lampetra* c), thoracicis vero a specie *Rispe* Branchias Anguillae & *Lampetrae* exhibebimus Tab. I. Rajae Tab. V. & VI. *Anguilla* gaudet unico spiraculo, pone caput ad pinnam lateralem Tab. I. utrinque, *branchias occultas*. Tab. I. f. 1. a., quae non nisi cultro mediante §. 1. a. apparuerunt fig. 2. suoque numero quatuor, visui exposuit. *Lampetra* b) b) det septem spiracula utrinque ad latera apinnia, fig. 3. a., ductumque hyal. a. dragorum d) in summo capite, quo mediante aquam attrahit piscis, ut fig. 3. b. cum ore petris adheret. Huius branchiae cultro detectae fig. 4. a. cum suis foribus & una cum corde b & hepate c.

h. G.

a) Testes quidem sunt *Synonymis*, quales sunt *Aurata*, *hopsid.* *detestae* vero sunt *Carillaginis auratae*, excepto *Acipenser*, *Atrida*, quibus operculo testis sunt branchiae, ita carillaginis sunt. *Sever. Antier. p. 112.*

b) *Anguillam* visitandam dicit *Petrus detestae* *Idem. Com. p. 73.* quod sit dimaculatum ab

ab *Anguilla*. *Græci* anguam dicit *δελφίνος*, anguilla *εγγελίνος*, *εγγελος δελφίνος* *λαός*, quod ex eo loco certo capitur & aqua deficiente sile in limbo occultes; vid. *Cole.* *Geringius Differt. med. phys. de piscibus. Uppsala 1727.* Inspirit, cui volupe est, an concentus vel harmonia vocalis amicitia unde pisci autem ex græco *εγγελος* venit, in latium *languida*. Attedo addit: *Murena* unicolor, maxilla infundit inopiam, *carillaginis* est *carillaginis* ipsi est: *Murena* pinna pedioribus (melus lateralis) catæ, quibus latens gaudet anguilla; insuper anguilla unicum habet spiraculum ad latera pinnae; maxilla unicum quidem ad latera sed spinula; nos anguilla *hopsid.* ut *carillaginis* nomen ut.

c) Nomen hoc latium *Atrida* bariorum & nomen nota nulli, quod *Lampetra* significat: quia *lampetra* *petrae*; in capite locum substituit nomen græco: latium: *Petræum*, a *πέτρος* *petra* & *πέτρος* & *πέτρος*, *petra*, quia figendo lapidibus adheret in fluvio. An *figet*, an *lampetra* ut lapidibus adheret, nobis perinde est. & in latium *Lampetra* & *petraeum* unum utrinque significat. In latium tamen a *detestae* nomen adoptavimus nomen: *Petræum* infra §. VI & XX. *Atrida*, de *pisc. L. I. p. G. XII.* ab *Albata Phil. lib. 1. p. 11.* vel ab *Atrida*, quod manu, propter labilem, caput non possit, *Lampetra* deducta vult.

d) In capite eminet tubulus brevis seu *Siph.*, quae aquam excipit, quam per *lampetra* dicitur emittit, singulari natura mech. *lampetra*, dum os adhaeret petris (signique & petris carillaginis) utraque claudunt, *Græci* *lib. 1. p. 11.* *Branchias* *Lampetra* ab *Olig.* *Græci* exhibitas vid. in *Alb. Ned. Hesp. p. 1.* *Olig.* *Græci* *lib. 1. p. 11.* sed valde suspecta est *pistia*.

§. V.

Anrequam autem ulterius progredimur, in memoriam nobis revocamus *VIRI*, cui semper honos nomenque suum laudareque audebunt, praevidens dictum, quod „nulla in re plus sibi dare consueverint homines, quam ubi ingenti sui verbus iactabundi applaudunt, a). Hoc procul a nobis esse volumus, prout a nostris procul est omnis vesca libellis; nec tam splendide de opula nostrae dispositionis, nullis artificibus inaedificat, optinamur, ac si nulla melior dispositio vel existeret vel excogitaretur, eam cum *Arzede* *Ichthyologia* jam opus est multo ingeni, licet quod oportet pro nostro, quo „exire servio sectarum fuisse, ut, posthabita figmentorum atque commentorum auctoritate, naturam solam suas dotes revelantem audiamus, b). Ceterum, nisi vana nos eludet expectatio, omnes pisces *carillaginis* c) in ordinem *Nanum* *branchias occultas* sine difficultate intrabunt.

a) *H. Boerhave*, *orat.* de comparato certo in physica: ab *initio*.

b) *Idem* ibidem *circa finem*.

(A) 2


8)

DE PISCIBUS PER BRANCHIAS

- a) Communiter sic dicti. Huiusmodi exceptis, utpote qui apertis gaudet branchiis (v. Milt. II. §. VII); reliqua Miltid. IV. restituantur.

§. VI.

Horum Tabula generalis:



- a) *Art. de la p. 22.* „Characteres a numero partium desumpti, omnibus reliquis antecedunt. ob evidentiam scilicet, & quod *partes in scalis stantibus cadunt.*” *C. p. 24.* „Characteres cartilagineorum generis a figura corporis & numero foraminum a branchiis deprimi debent.” Natura ipsi distinguuntur pices ab unguem perforamina de per spiracula branchiarum: quidam sequentes naturam, quae spiraculifera habet auctorem. Petromyzon, pices vulgo *cartilaginei*, caetera spina cartilaginea, habet foramina: anguilla, cuius spina spinosa, pariter habet foramina, non nisi numero impari; & sic in reliquis.

Hae dispositione duce, experiri pices branchiis occultis mihi reddere familiares, quatenus descriptiones apud auctores sufficere. Summ cuique religio tribuam, omnique, quae me decet, modestia aliorum labores interpretari anitar, ubi veritas postulaverit: parem a cordatis viris benevolentiam sperans, ubi animadvertent, nunc allicubi lapsum esse, qui omni tempore paratus sum, candidè monentibus gratias agere. Sedulam praeterea, quae fieri poterit, operam debo, ne ex speciebus genera multiplicentur, neve genera in species transformentur, quo nihil facilius fieri posse depre-

OCCULTAS SPIRANTIBUS.

prehendi, idque ubi in errore perseverare malimus, haud levi cum detrimento historiae naturalis. Modo ad rem.

§. VII.

AD LATERA PINNATA
SPIRACULIS QUINQUE.

Sunt pices longi: corpore spisso: capite vel rostrato, vel extransverso fito: ore vel longitudinaliter fisso, vel in prona capitis parte transverso, ad segmentum circuli quaecunque hiant, vel ranae reliquae similes; aut deorsum, aut limae instar alperio.

1. CYNOCEPHALUS. Capite rostrato. Ore longitudinaliter fisso — Rostrum os superans habet, hoc, fissura ampla, horrende dentatum. Rapinam, prout canis verragus, vel dorum, vel ad latus parum inclinat usque. Pices graeci & latini CANIS; siquidem nonnullis a capitis facie & voracitate eximiae acque sagacitate odorandi canem referre dicitur a) aliis *Lamia*, *Tiburo*. Arredo: Squalus audit b).

- a) Latius enim patet *Galei* quam *Canis* vocabulum, & apparet, Canes doli Mionetti pices, quod tentillum capiam more mordenti, & dentibus nocent, quod & *Verra* innuit huiusmodi. vocabula picesque piceque in multis sunt a terribilibus ex a quo parte similibus rebus &c. *Albero. de Pict. p. 171.* Sic pice delinquit *Arctus* ab *Arctos* *Arctos* *Arctos* *Arctos*, quia in ipsum artem se infundit & ablatum — *Arctos* quod pice modo & pice exiguus fit — *Arctos*, quod semper maculosus pice — *Arctos* quia picea interiore parte in segmentum artem piceum — *Arctos* quod caput respicit caput magnam est — *Arctos*, quod fit picea admodum succundus — *Arctos*, quia omnes species admodum voraces sunt — *Arctos*, quod piceum fit picea hoc piceum; & qui reliqui.

- b) De *Squalo* vid. §. 12.

§. VIII.

1. Cynocephalus *Albus*, a constanti colore albicante, Angl. the white Shark; *Canis*, *Arctos*, *Opiani* & *Eliani*; *Kaexagus* *Arctos* & *Theophrasti*, a καραξος, acutum alperum, unde

(A) 3

DE PISCIBUS PER BRANCHIAS

I. CYNOCEPHALUS.

unde *Aristot. καρυγδοίαι*: animalia, quibus acuti pectina-
tinueque coeunt dentes. Tiburo, Lamia, Lamna, *Asturionus*
confer: *Willughb. p. 47.* & *Dr. Hans Sloane H. Fovae. l. 24.*
Bos bellua & canicula *P. Jovis de rom. pisc. cap. III. 8.* Squalus
dorsio pleno b) dentibus pluribus ad latera serratis,
Artesii c). *Scaligeria, Bochario, alius*, pilcis, qui Jonam
Prophetam voraverit, audiri. Inregri pilcis accuratam figu-
ram nullibi offendimus. *Gerueri*, quam dedit, figura arbi-
traria est; neque *Aldrovandi* figuris fidem habemus, si vel
capita putium conferamus cum Lamiae capite, facie recteque
canino, cuius effigies profertur in *Mercati Metallibeca* & apud
Nicod. Stenentium, qui caput dissectuit. Desideratur itaque sanati
hujus pilcis icon ab omni parte absoluta. De lapidibus in
ejus capite vid. *Miff. II.*

- a) Ibi libellula *Melipolis* & hoc pilcis devorata. In nostro exemplo libelli ad marginem scripta
„legimus verba: „con una terribile apertura d. bocca. Negli anni di Genova de
„Giustiniano legge un fimelato d'uno fincallo more, echavo de Luigi Oberto,
„che nuotando con altri fincalli fa inghottito da un pesce di specie comuna
„Coveler Remore“ & *Dr. Hans Sloane H. Fovae. l. 23.* „Thos of Nice told Gillis
„on of Sarcouthind p'oud veygh had been taken, vherem vvas a fish man; and
„a thos of criffellus took had a lezardum hominem in blue.“ Mullius de Nicet ali-
quando capta sunt Lemnae, in quatum ventriculo homo forficatus inventus.
- b) Porcus *Isiari* reliquorum dorsio. Dorsum terreo, ad multulos comparatum, latissimum
est, *Willughb. p. 47.* *alderu. de pisc. p. 181.*
- c) Si quis dentes nullas, vulgo glossopetras, & serratas & simpliciter vel levi acie acumina-
tos, maximeque moduli, cum dentibus Lamiarum Canumque hactenus cognitos con-
ferat, altera crediderit, dari horum plures species, quam descriptas habemus, neque
econtra hujus generis pilces *formalis* indurctos esse deasimus. Exempla desolamantur ex
Aldrov. Neg. muscul. p. 61. *Belleri* rarioribus; *dehonorari* quereis p'fissum &c. ubi
inter alios, dote maximus ade vel ora non serrata, confer. *Stenentii diff. cap. Cartha-
gia Tab. p. 124.*

2. *Cynoccephalus Glaucus*: a constanti colore, qui in dorso pulchre
creruleus, saturacior, in ventre argentescens. *Angl. the blew-
shark.* *Galeus Glaucus, Rondel. Gen. Aldrov Willughb.*
Squalus fossula triangulari in extremo dorso a), foraminio-
bus nullis ad oculos b), *Artesii. γλαυκος Eliani, Charle-*
vois

OCCULTAS SPIRANTIBUS.

7

I. CYNOCEPHALUS.

teni c); *Requies Rochfortii & Lahoti voyag. de lameri-
que Tom. I. p. 45,* qui & p. 51. monstrum marinum exhibet,
canem referens, cuius figura monstrifica est. *Belleri* canis
marinus, cui *Recherchand* rostrum fumo; dentibus latis ser-
ratis; non tamen omnibus.

- a) Vel ad eorumque caute; *Willughb. p. 181.*
- b) *Willughb. p. 47.* „nullis pone oculos foraminibus, quo a *Gonyx* alligae cartilagineis
„d. dicit. quod in submerso retingimus; ejusmodi foramina pone oculos a nonnullis
pro Aethias habita, quodlibet in vena cavitate patenti, simul tamen in cavitate an-
teoculis exarum insculptum vnam ducant meatu auditore analogam; quam inquiri-
tant me dehorere.
- c) *Carn. Drogueus voyag. Tom. II. edit. Angl. in fol. p. 236.* Cuius mentionem facit:
„qui avoit 45 dents dans le ventre, lesquels en sortirent toutes, qu'on leur couvrit,
„&c. si murent à nager dans une cuve d'eau, qu'on avoit préparé pour cela, & que les
moindre de ces dents étoit plus gros qu'un melon.“ Ad huc etiam cauli ejus, qui
ventrem vel potius ventriculum intra intrare & exire perhibetur (provis *non-
deur* tanquam tellis oculatus in vulpe marina observavit, de quo vram *Willughb.*
p. 181. an vero ista pilcis, certo non constat. non videtur verisimile, galeum 45
caulos simul fovisse & uno vna exculptis nisi facile prelis ex humilis adoptatis. vid.
*J. Meffius Imag. pisc. in speculo vest. oculatis p. 179. & 177. Reliqui in off. 6 p.
4. 4.*

3. *Cynoccephalus rostru brevi.* *Malthea Rondelletii*; cuius satis an-
gustum dedit descriptionem; *hassianus*, an ad *Cancer* an
vero ad *Galeus* referendus sit, hec promissum, quia & incertis
partibus a cane non differre perhibetur, nisi quod alba ocu-
lorum nebula caret.

§. IX.

- II. *Galeus f. Mustelus* capite rostrato; ore transversali, pronon.
Nomen antiquissimum & usitatissimum; *γλαυκος Aristot. γλα-
υκος Suidae*; hinc *γλαυκος Τριζωνας*, pilcium genus musteli-
num. *Galeus γλαυκος & γλαυκωνος, γαλας, γαλας* etiam Ielen si-
gnificat. Nec praeter hunc generi nomen gratis impoierunt
αγο σης γαλας a muscula terrestri; si enim pilcium pronon-
centium caput, tanquam principem corporis partem, paulo
attentius consideres, latis responder capiti Mustelium, in
donibus, horreis ylivisque oberrantium, productio, levi-
terque rostrato. Reliquum corpus pariter mustelinum
more

II. GALEUS.

more gratificet; in prona capitis parte *trans-*
versat, et in aliquod legumentum circuli figurant,
ad infar *filium rictus*. Hinc *Romuleorum Lib. XI*,
cap. ii, *nomem a corporis habitu, mullis simili, datum*
est, et *Lib. III, cap. XXVI, p. 373*: non solum hanc be-
stiam, mullis mullis terrestrem corporis rotunditatem et lon-
gitudinem (Galei) led et ob illa qvæ cum ea commu-
nia habere creduntur, *Arctæ* qvæ ac Carcharias iova-
tus a, gudi. Galei omnes in flupium converti, eodem
modo, *pro Reia similes*, quæ sunt prosum
transversæ et, capiam funem, quæ sunt ois lon-
gitudinaliter, fere mandibulis longis, parum ad latera indi-
catis confito.

- [illegible]

1. *Galeus Acanthias*, five spinax. *Mustelus spinax*. *Angl.* a pickled dog. *Squalus pinna* ani nulla, corpore sub rotundo, *Arædæ*; cum tamen pinnam ani habeat b); vide piscem pronum

II. GALEUS.

promum & supinum Tab. I. f. 5. 6. ad diuidentem magnitudinem Tab. I. f. 6. pium. *Willughbij* de hoc pice: "pinnas in dorsis 1, 6. duas obtinet. in iurissue anteriori parte (pina-pinnarum) in ventre duo paria, ad brachias unum (laterale nobile) alterum ad ostium excrementorum. Cui, non circa sed infra medium rostri & retro oculos in prona parte, ubi & nares funt, non in lupina rostri parte, prout in figura. Salisani. Dentes pilicem habet, *Willughbij* ait, acutos & reflexos: quod non dixerat; sunt enim pifici loco denticuli labia lineis inflexis aspera, prout nonnullis tajiis c).

- b) De Galeo atarthiuseu *Spenci* fisco, *Gravrus*: Sagree, & galeo *seanthi* *Clafsi* exto-
co vid. *Wolffg.* p. 72. Hunc Clafsiu relictuu & exantertatu dinstatu confpuit,
 & adit *Wolffg.* *abbay.* „qui tamen ad huc genus proprie non pertinet... Forte fustu-
 tius fuit, prout saepe difformis solent in fpeciebus pifcibus.

2. *Galeus levis*, *Osteopore acanthias* simili. Squalus dentibus obtusis seu granulosis, *Arriaga*. *Galeus levis* *Romdel*. Mufelius levis primus *Salviani*, *Willgibb*. Pelce colombo, *Romanis*; the smooth or unprickly hound, *Angli*. Pinnarum numero 6. Sit ubi *Acanthia* non differe dicitur, cum tamen, præter laterales pinnae, tres habet ventrales, duas ad anum, & unicam inter anum & extremam caudam, *Acanthias* vero non nisi unicum par ad officium excrementorum; vid. *Willgibb*. p. 60. & figuram nostram *Galei Acanthias*.

Galeum afflicum *Rondelet. Germ. Alarocandi*, Mustelum
stellatum *Vis varium Salvatoris*, & *Willughbeyi* & celeberrima
Cardinis Lineae pro variis Galci levis agnoscent, quorum
nonominibus fustibulo. Forte Allieris, & *Salis. carulus*
fuit Galci levis affertanza; qui non nisi in tenuis
luculis frequenter gaudet, qvæ senim evanescunt; prout
videre licet in cauto cum funiculo & sacculo, qvæ *Rondelet.*
ovum appellat, umbilicali *Tab. I. f. 7.* Sic asperica *Tab. I.*
rura excludunt belle variegatos, qui pedetentim eleganti pi-
ctura privatur, æqueinamque colorem induunt. *E. 7.*

3. *Galeus, rostri extrema parte pellucida, dentibus acutis, in tres ordines dispositis. Squalus naribus ori vicinis; foraminibus exiguis ad oculos, Artedi. Canis galeus, Rondelet. Canola Salviani.*
(B)

II. GALEUS.

^a *Topo, Angli. Entii descriptionem vid apud Charletonum in Mant. Anat. & Willughbb. p. 51. seq.*

4. *Galeus capite postroque brevissimis, ex rufo & cinereo maculis nigris variis. Squalus ex rufo variis; pinna ani medio, inter anum & caudam pinnam. Arted. Canicula Artedii. Rondest. Albrov. Carulus Salotani. Pelce gato Venet. a Bounce Cornub. Willughbb. p. 42. Roulette Galiz. Maxilla pluribus dentibus aculeorum hamatorum seu inrorum recurvorum ordinibus instructa in mari mediterraneo frequentissimus.*

5. *Galeus cinereus, maculis nigris variis sed majoribus, quam in precedenti. Squalus cinereus, pinna ventralibus duobus, Arted. Canicula saxatilis Rondest. Catulus maximus Willughbb. p. 43. Catulus major, Salotani.*

6. *Galeus dorso pulexerato, tantillum rubente, maculis inordinatis, exiguulis, fuscis albidisque variis. Squalus dorso vario, pinna ventralibus concavis, Arted. Musculus stellaris certus Bellonii. The rough Hound or Morgue Cornub. Willughbb. p. 44.*

7. *Galeus brevis, crassus, pinna doralibus spinosis, ano cauda proximo. Galeus Centrina, Germ. Squalus pinna ani carens, narius in extremo rostro, Arted. cum tunc & hic Galeus pinna ani habet concavum vid. Salotani figuris Centrinae pronae & lupine, & apud Willughbb. p. 45. Tab. B. 2. 3. Vulpecula Bellonii. Pelce porco Italus. Spina d), quæ pinnam dorsæ anteriorem perforat, versus caput inclinat, hæc pinna ad exortum adeo crassa est, ut dorsum ponis productum quam pinna videatur; posteriore pinna penetrans ipina ex adverso ani caudam respicit.*

^a *Centrina in illicito pite exotum genere suspicatur. Centrina malsua fissa datus aculeus, finima denegato esse, eand. Olig. Fauchal observ. anatum, pitea centrina in ad. mact. eleg. nat. p. 48. X L V A.*

8. *Galeus cauda longa, falciformi post exortum spinati. Squalus cauda longiore, quam ipsum corpus, Arted. Vulpes marina Plinii Willughbb. p. 54. Tab. B. 6. f. 2. Vulpes Galeus Germ. Rondest. Vulpecula marina Sato. Simia marina, Bellonii. The sea fox or ape, Angl. Corpus breve, cauda longitudini Cor-*

poris

II. GALEUS.

poris fere æqualis, quodammodo eniformis e); more aliorum galeorum f) pullos suos, cum eis timet, intra se recipit.

- c) *Rondel. roudon vocat pinam longam i. ut enim vulpes inter quadrupedes longam, Arted. quæ eundem habet, ita pilus hic later galeos cauda pinnam longissimam. Willughbb. dilinguit eandem spinam. In aqua quidem curte exort, lupina parte pinna confusatur, non in sapina, sed prona corporis parte, dum pisci consideratur supra. Multa figura a piscibus sique depre desumpta credimus, quæ tandem non ipsos pilos, descreperant notores. Figuræ lupus pilos prona & lupini, quæ Diminuat Perrault fieri curvæ antefecunda sunt figura Salotani. Longitudo pilos, quæ Diminuat Perrault differt, etia ad p. ped. cum dimidio, articulo summi ventris i. a pol. — Corpus præteritum angulosis falcibus descriptum produci eand. quæ longitudo reliquum corpus fere æquabat. Non longior quam ipsum corpus, ut vult Dr. Artedus. Liliatolus, versus ventrem magis incurvatus: ad exortum caudæ unica pinna in grana parte; Salotani hæc pinna in sapina corporis parte collocat. cum Diminuat Perrault non nisi eminentiam quandam ibidem ostendit, quæ articulo est ad fluctuantem verberarum usum in caustum vegetantium. Dura habet pinna erecta in dorso (quæ erecta, erilis, appella) aliam magnam in medio, alteram minorem, versus caudam (non in eand). Proter illas tria adhuc pinnae paria (Salotani duo saltem paria exhibet) Primum par ad latera, pone caput, magnitudine anteceditur reliqua, avium alarum speciem exprimit, & longitudine movetur i. pollicem, latusque vtro ad basin & pol. Iuxta medium por in ventre circa umbilicum ambri (nullus enim) duo apophyses, (ventrali prae in rapio), in signum, quod pil. fere eandem. Terciam pinnam per interitum & caudam (quæ in Salotani figura descripta minime est) magnitudinis. Pinna dura, in eandem fere macta, & eandem quæ doralis testis, coloris, prout integrum pilos corpus, ex gelico fult, & articulo falcem eandem conatuerat (non alii in ventre, secundum Salotani). R. 13. apectura erat & pollicum; oculi majores oculis lauri. Norem itaque pinna lux pila gæta, quæ uno pure privare Salotani, ne dicam de ferrea habito & diu pinarum, & contra Dr. Perrault non observare ferream pone oculot, quæ indiguitat Salotani; forte caret vulpes galeus omnino illis, prout Cynocephalus glaucus.*

f) Omnipium illicot, quibus spæ non sunt impedimento ad intrandum & exendum.

9. *Galeus rostro brevi & obtuso, ore elliptico. Canis Carcharias species, Hayen Willughbb. app. f. 5. Tab. 5. n. 1. addit auctor: verum cauda procul dubio non recte pinguat. Communis pilcem melius pictum, pronam & lupinam, Tab. 7. n. 1. f. 1. 2.*

(B) 2

10

II. GALEUS.

20. *Galeus, capite in hyperbolam deficiente.* Cucari *Brafil.* Cassion *Lusit.* ex genere Tiburonum, *Maregravi*; sed quod innocuus dicitur, ore longe inferius flante, ad Galeos spectat. Unum tantum ordinem minimorum denticulorum habet, quare nocere non potest, *Willughb. p. 53.* Dixerim, quod pisces 23 pedes longus, denticulis licet minimis instructus, utique nocere possit vel aliis piscibus edentulis vel non bellicosis licet dentatis, vel aliis animalibus, & quidam etiam hominibus. Figuram vide apud *Willughb. Tab. B. p. n. 4;* sed corrige numerum, qui erit 3, numerus vero 3 mouetur in 4.

21. *Galeus rostro longo plano, firmo, ossis ipinis validis, compressis, rectis, ex aduerso sitis, ferræ iustar munito.* Prona pars capitis & ore & naribus trajarum faciei & fauces similibus; labia alpera, nondentata. Pristis, & *Ariftolelis* & omnium auctorum. Serra; Serra marina Belkonii. The Sawfish *Angl. Willughb. p. 61. Tab. B. p. f. f.* Acipagvily *Fernandez p. 34.* Squaleus rostro longo, plano, utrinque dentato, *Ariftolelis* p. 2. Osses ipinis, quæ rostrum serratum reddunt, in fœtu cute sunt tectæ & quæ in gingivis, prout dentes fœtum aliorum animalium, abscondit latitant, ne pulli vel in cornibus aut in utero hærentes vel excludendi marem lædant; rostrum insuper flexile est, prout hæc omnia videt licet in fœtu dehinc, prono & supino, *Tab. III. f. 1. 2.*

Tab. III.
f. 1, 2.

2) Dubita sit, utrum Pristem galeis annocerat, quod media est inter Galeos & Rajas figura, squaleus progre branchiarum in hoc fœtu via fœt theocia; ne autem nimis strupulosus videret, generare multiplicare, ideo quod pisces pronos confederatus ad galei formam multum appropriat, & quod branchiarum spiracula in adulti pectorum laterales sunt, quod in mules interdum pisces comprehensos nullibi que casis adulti pisces figura prolat, insuper *Willughb.* p. 100. ad latera, paulo infra branchiarum foramina quina collocat, similes Galeorum, cui Anteliganom *Galeum spinatum* fœt. Scamellum pupillo, cum *Cato* rostro serrato vel cum Serra absolueret voluit. Notanda, quod reliquum est, fabula apud *Clasem Lib. 11. c. 20.* Serra — incum — non capiti vertice firmum ex fœtu milar dentatum grilis pro *uener fabris difficit*, *ne sit in pradam hominis veretur.*

§. X.

III. CESTRACION. Capite transverso, ore prono, transversali. A *serp.* malleus; malleatorum malleo utitur, capite scilicet, denticulis

III. CESTRACION.

piscis mallei rostri ad iustar, transverso, quod absoluitur oculis in utraque extremitate sitis.

1. *Cestracion fronte arcus figura*; ejus anterior pars capitis transversi in lineam curvam arcuata ita in aciem acuitur, ut, dum celeriter piscis naet, obuios pisces secare possit credatur. Priscis & recentioribus sub nominibus: *Mallei, Ballise & Labele* vel *Zygene* notiffimus; ore, galeorum more, prono & transverso in segmentum circuli formato, dentibus validissimis, planis, acutis, serratis, ad latera vergentibus, & triplicis aut quadruplici ordine dispositis, armato. The Balance Fish; *Angli.* Squaleus capite latissimo, transverso, malle iustar, *Ariftolelis.* *Pancouffier Labat Voyag. de l'amer. Tom. IV. p. 371.* „un des plus voraces poisons, des plus fers & des plus dangereux,“ *Moly. Reg. Din. Jacob. Tab. VII. f. 3.*

2. *Cestracion, capite cordis figura, vel triangulari.* *Zygene* affinis, capite triangulo; eon *Cruyshaye, Belgii.* Panama *Maregravi.* *Willughb. p. 57.* triplici ordine denticul minorum. Figura *Maregravi* parum valet; Meliorem suppeditamus piscis proni & supini, in *Tab. II. f. 3. 4.*

Tab. II.
f. 3, 4.

§. XL

IV. RHINA; capite depresso; ore in extremitate. *Ynn Ariftolelis & Plinii.* *Hic H. N. XXXII. cap. 17.* „Rhina, quam squatum a) vocamus,“ Os in capitis extremitate; ideo hic piscis non est confundendus cum Galeis, neque cum Rajis. Sic *Rondeletius*; „in lateribus branchis detectas (nabis occultas habet, non in supina (nabis prona) parte, ut rejas illarum enim ita & ore scissura & reliquis planis, piscibus differt.“ Pinnae laterales nonnullis alas imitari vixt fuer, unde nomen: *Angeli* & *Pesce Angelo, Germanis*: The monk *Angl.* or *Angelish.* Appendices ad pinnas an in maribus quovis pollices longæ, cylindricæ.

a) *Silurus* *Lib. 12. arif. c. 16.* Squatus dicitur, quod sit figuræ aculei: unde & ejus cute lignum potetur, & *Raja* in *Zygen*, quod male legitur *Squalus* pro *Squatus*.

(B) 3

I. Rhina

IV. RHINA.

1. *Rhina*: five Squatina omnium auctorum. Squales pinna ani carens, ore in apice capitis. *Arctedi*. Kingstone *Anonymi*. Descrip. of some curious and uncommon creatures omitted in the Description of three hundred Animals &c. London 1730 p. 47; ibi figura maris. Fossanz lupine & pronzæ, ex musæo olim nostro, figuras vid. in Tab. II. f. 5. 8. cauda in superiori parte bipennis; caret semina appendicibus, quæ in meribus mentulae sunt, prout in rejis. *Arctedus* negat pinnam ani, quam *Willughbejus* & reliqui auctores pisci tribuunt: ille: „inferius pinnarum par circa exitum excrementorum situm obtinens; per medium dorsi habet lineam asperam, prout integrum corium adeo asperum est, ut illo aspera ligna & eburna polantur; *Ravisi*. Lib. 7. c. 47. The Skin of the Back is very rough, so as to polish wood or Ivory, *Anonym. all. loco*. Ex illo corio Turæ & aliz gentes enim vaginas conficiunt, quas sagittas, von *Chagrin*, vocant *Willughb.* p. 80. Ad hominis aliquando magnitudinem piscis excrevit: Some times Weighing a Houndred and sixty pound. *Anonym. ib.* conferatur *Willughb.* fig. Tab. D. 3. cum nostra, illi anteferenda.

2. *Rhina* pedata quasi: cauda in superiori parte tripeni. Mermaid of the Siren *Anonymi citati* p. 45. Rhina appendicibus ad ortum caudæ pedes mentientibus; with small Feet. The Fin on each Shoulder in Shape same thing like the wings of a Cherubim; the skin of the Back was rough, and of a dark colour; the Mouth large and placid as the very extremity of the Head &c. vid. ulteriorem descriptionem & figuram piscis prout & supini *ibid.* Auctor hunc piscem pro *Syræ* Antiquorum agnovit; qui anno 1737, mensis septembris captus & Londini expositus fuit; sed veror, ne lucra caulæ mentulae distorret & in pedum simulacra, ore fieri ferri vel ænei, efformatæ fuerint; adeo hujus piscis descriptio convenit cum precedenti; nisi quod tres pinnae in cauda, & quasi pedes habeat.

AD LATERA PINNATA
SPIRACULO UNICO.

§. XII.

In quibusdam sunt pinnae laterales vel binæ aliz sub gutture (secundum *Willughbejus*) talique pedibus similes, unde apparet (quicquid cavillatur

„tur *Rondelietius* *Bellonius* non admodum absurde scripsisse: Ranam picatricem geminos sub ventre pedes habere ad rana palustris similitudinem, membrana intertextos, quibus verisimile est, eam rana in modum pet maris fundum incedere. Quid ergo obliat, quo minus ejusmodi picatran genus singulare constitueremus, sub atque, quo *Plinius* (Lib. XXXII. cap. X.) utitur nomine.

- I. BATRACHUS, corpore quasi pedato. Ex greco βατραχός, Rana; sic ranunculum plantam greci batrachion vocant. *Plin.* XXV. cap. CIX. batrachites, gemma colorem ranae referens. *Id.* XXXVII. cap. LVI. βατραχός λίθος, bufoonia; bufontites; bufontis lapus.

1. *Batrachus*, capite rillugue rana, corpore & figura gyrino similis sub ipso gutture sibi mutuo vicinæ binæ pinnae, talique pedibus similitudine, singulis quibus radis seu digitis constitutis; *Willughb.* p. 86. quas pinnae tamen Tab. E. 1. non exhibet. A little below the Diaphragm, on its upper Part, are two large Fins in the Shape of a Hand, and divided into five Fingers; *Anonymi cit.* p. 50. & p. 51. He has two little Feet coming out of his Belly, like the Feet of a Gooie. Ultimus finis quatuor pedes longus, with a Mouth large enough to take in a middle sized Dog, it opening twelve inches wide. *Batrachos grecis*. Piscis rospus, *Isidori*; rospus enim ipse buto. Bora, *Taurinus*; Zotto, *Lovhardus*; G. *Entomaphid* *Charleau*; Rana picatrix *Salmanni*, & aliorum. The Todfish, or Frogfish, or Sea-Divel, *Anglus*. Sub alero pinnarum pare, in ipso piscis margine sito, ingentis foramina, in quorum fundo tres branchiae, nullis artibus donatæ. Lophius a) ore cirroso b) figura corporis monitrola; *Arctedi* *Fishb.* P. III. p. 62.

- a) *Lochia pinna*, *emmenia*, quæ undique emittens, pinniformibus instructa, *Arctedi*, cum pinna alia πτερίς vel πτεροσπυρα grecæ audit, *Lochia* vel *Lochia* autem pinna pro emittente deservit. *Arctedi* *clavellus* *Arctedi* p. II. p. 3. autum, membrana quæ inter pinnae pinnas habet, non est tamen officiosa vel emittens, sua radia foliatur, nulum usum in natando præstat, hinc pinnae appendici una esse, quicquid tamen in pluribus piscibus intertextis in consuetudinem *Lophiorum*, quod plantam emittens habet; Horum *Arctedi* non nisi duas species recenset.

I. BATRACHUS.

b) *Scaphiopus* *antipus* p. 86. Rana piscatrix tacta subacuta exposita in longiorum, quae rostro tenuis habet, appendicula, allicios ad has quasi ad vermiculos, & aggregata pisces in oia ingulsiem caput.

T. III.
63.

2. *Batrachus*, altero pinnarum parte ad exortum cauda carens; procellus hinc inde capillaceos habet; cuius icon Tab. III. f. 3.

3. *Batrachus*; five rana piscatrix americana cornuta, spinosa, Sebe Thef. I. p. 118 Tab. LXXIV. fig. 4. cum pullo f. 5. color cutis, tenuiter squamata, albus saturate rubris maculis pictus; cauda ventilabii inlita expansa, prout pedes.

4. *Batrachus* in fronte corniculum ferens sursum erectum, & paulo retrorsum versum; ante illud tenue filum, quod retro recondere potest; in quolibet latere pinna quasi pedata, sub qua foraminulum; cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aspero & scabro. Guapehua c. Marcegr. The American Toadfish, Willughbb. p. 89. Tab. E. 2. f. 1.

e) De Guapehua, conamque & Anaxanatum delictatus subis genera,

5. *Batrachus*, osseum cornu supra nasum gerens, inter binas pinnulas prominentis; cute albicante & resplendente; prope oculos macula hyacinthina stellatum referens; rufis maculis flammicis per totum corpus, nigris per pinnas. Rana piscatrix americana alia, Sebe Th. I. p. 118. Tab. LXXIV. fig. 3.

6. *Batrachus* capite producto; postici pedes acutos habent ungues, membranis nexos; ceterum ex candido relucens nigris maculis undulatis, Sebe Th. I. p. 119. Tab. LXXIV. f. 6.

T. III.
L. 4.

7. *Batrachus*, molli, bello ex albo fuscis maculis marmoratus, ore parvo, anili, processibus villosis, aculeis corimbis; multo olum nostris. Tab. III. f. 4.

8. *Batrachus*, capite vomeris instar cornuta. Gucucuja Brasil. Marcegr. Monoceros piscis, qui vespertilio aqvacicus dici potest Willughbb. p. 89. Tab. E. 2. f. 3. Lophius fronte unicorni, Artedi. Medietas corporis posterior luberes est, vertus caudae pinnam falligatur in conum. Cutis multis tuberculis duris aspera. In utroque latere parvum foramen in corpus.

9.

I. BATRACHUS.

9. *Batrachus*, capite fento osse antrorum in acutum convergente. Cutis undiqueque acutis horeet spinis. Rana piscatrix americana marina ex Curafios, Sebe Th. I. p. 118. Tab. LXXIV. f. 2.

§. XIII.

Constitut Clarif. *Petrus Arctedus* Pifcium genus XXXIX. sub titulo: *Ostracion*, eorum scilicet, qui figura corporis insolente sunt; cute dura, sepe ipialis seu sculeis magnis vel in toto corpore, vel in aliqua eius parte armata; interdum vero glabra, sub quo genere comprehendit pilices quadrangulos, triangulos, sphaericos, & qui plures ad orbis communiter referuntur. Origine hujus nominis a testaceis animalibus derivatur. Sic *Plinius* H. N. XXXII. 10: „invenio apud quosdam *Ostracionem* vocari, quod „alii *Oryctem* vocant,“ ite onyx, Inquit *Dioscorides* *hij wāna vā nōyōlōis*, & e *opereculum concylit*, pro quo etiam *Ostracionem* sumi a *Plinio* declarant & e ipsiusmet verba; vid. *Rondelet. de Testac. Lib. II. p. 84. Generis & Aldrovandus* ostracionis nomen usurparunt, & tribus imposuerunt pifcibus, unde: *Ostracion* Nili audit *Bellonii* *Holofteum* (i. e. osseum) - *Ostracion* *Aldrovandi* prior, an idem cum *Holofteo*? - & *Ostracion* alter gibbifus, eiusdem. *Holofteum* *Generis* ostracionem nominandum conjicit, quod & testam ostracioni inlita duram habet, & sequens pilicis inter *Nileos* a *Strabone* numeratur, cum tamen apud *Strabonem* legatur *epialis*. *Aldrovandus* pariter dicit, *Holofteum* *Bellonii* testaceum & ostracionem *Corium* habere; & *Willughbbes* de ostracione priori *Aldrovandi*: quod integrum crusta quadam minus dura, quam in crustaceis, dictis exangvibus addit tamen: quoniam „diximus crustam, proprie loquendo nec cutis est, nec crusta, sed medulla quiddam inter utraque, seu crusta cuti innata.“ Quis ex modo dictis non comprehendit, nomen *Ostracion* minus distinctas ideas de dura cute, de testaceo & ostraceo corio, de quodam internedio, & crusta cuti innata post se relinquere? Nihil commune istiusmodi pilices vel cum ostracionem aut cochlearum operculis, vel cum animalium crustaceorum integumentis habent; neque enim entias, ex gr. galcorum, quasi variolates, vel sagrinam corii squalitatem, quorum cutis variis manubris vasque superinducti solent, dixeris crustam cuti innatam. Medulla quod quare *Willughbbes* invenit eam & crustam non est, nisi cutis sua natura ad pergamenum, five corium preparatum, accedens, in aquis & quondam pifcium quadragulorum, triangulorum, orbium similiumve integumenta five exuviae; quadam succellu temporis vix digitis tractari possunt, quin concidant, vel frangantur. Sunt autem ejusmodi pifces figura corporis insolente, secundum

(C)

Arti-

Aretium) vel glorioſa ſue ſphaerica, vel ſubrotunda, vel ovata ſive oblongo-
ro-unda, vel oblongo-quadrangula, vel conice fere; cuius arida;
faepe ſpinioſe ſue aculeis craſſis & longis, quodvogue tenuibus & brevibus
vel in toto corpore, vel in aliqua eius parte armati, interdum glabri; non
tamen omnes eo exiguum, neque unumquodamque magnos habent; ut per-
luſius videtur *Aretide* P. III. p. 85. Brevis: corpore quoqueſive
modo *Frango*, *turpe* vel *ſuffragat*, cuius coracina, ſepius *pallia* & *ardula*,
vel *glorioſa*, vel *ſplendida*. *Succum* ſive *laticem* emittit, pro ta-
lis generis, verificatione rei naturae magis ſecundummodum adhibenda
genus: *Crayquina*, αρακίνη, *Sturna labaro*; κεννα λαβάρης, *arides*.
Sic itaque ad lacera puncta *piracula* libero.

§. XIV.

II. CRAYRACION. Corpore strumoso.

1. *Caryacion levissimus*.

a. *Exterreore rufescens; in medio corpore a capite ad caudam punctis fuscis distinctus; cauda gracilescente; dentibus, in ore parvo, minutis, acutissimis; cuius cutis nullatenus dura, coriacea tamen est a); huius figuram videtis Tab. III. f. 5.*

β. Orbis laevis *Catesbeii* H. p. 283 ingenti struma laborans.

a) Omnino piscium, qui communiter dicuntur *Orfer*, cutis vel corium ita comparata sunt, ut, quando in aquis vivunt, vel in liquido conservantur, ad lubrum inflari possint, sursumque contrahi.

2. *Crayracion toto ventre sphaericus*, & parvulis aculeis donatus; quatuor dentibus lotis instructus, cauda producta. Orbis primus Willughb. p. 143. Tab. 1. 1. Orchis vel orbis Plinii; gallus marinus nonnullis. Ostracion sphaericus tetraodon, aculeis undique exiguis. Arredi.

3. *Crayracion dorso levi*, ventre ad usque pinnas laterales aculeato, *Grevii* Willughbi. p. 144. Tab. I. 2. Lagocephalus dictus. Habemus aliam iconem ore aequilino, & prater caudam quintam pinna, vel crista pinnata in capite, pone oculos. Ostracion cathoroplateo-oblongus, ventre rinctum aculeato & subrotundo. *Artedi*.

II. CRAYRACION.

4. *Crayracion maculosus*, aculeis undique densis, exiguis, duabus
pinnis in dorso. Orbis atper maculosus *List. ap. Willughb.*
p. 155. *Ostracion maculosus*, aculeis undique densis exiguis
Artedi.

5. *Crayracion ovatus & muricatus*, rictu latissimo, polyodon. An, altera *Attinga minor orbicularis Calceolaris, Willughbeji* Tab. I. g. f. 1? orbis muricatus primus, *Clusii exot.* Musci olim nostri.

6. *Crayracion ovatus* & *muricatus*, ore parvo cujus inferior mandibula superiorem excedit; in capite tres murices cristam efformant transversalem. Orbis muricatus alter *Clusii*. Eine staßsichte Meertaube *Besleri*. Musei olim nostri.

7. *Crayracion scutatus*; osseiformis scuti, sterni vice, præditus; capite magis exserto reliquorum capitibus, oris incisura longiore; polyodon. Orbis scutatus *Rondel.* piscis rarus, non edulis, *Willugbb.* p. 144.

8. *Crayracion levis*, oblongus, corpore tessellato. Orbis oblongus tessudinis capite, *Clusii Excor. Willughb. p. 147. an*, orbis levis, oblongus, cinereis & fuscis maculis notatus, *Sloani H. Jamaic. II. 279. Tab. 247?* Ostracion Oblongus glaber, capite longo, corpore figuris variis ornatus. *Arceid.*

9. *Cratichneumon oblongus*, *spinifus*; spinis in capite longissimis; dorso arcuato; oculis & ore magnis; labiis crassis; pinnis latis; ruficoloris; vid. Tab. III. f. 6. T. III.

10. *Crayration, ore difformi*, labro inferiori triangulo, veluti resecto;
spinis curtis, acutis, in capite, in dorso & ventre raris; -L. 7.
Tab. III. f. 7.

II. *Crayracion*, ore rane rictu; pinna inaequali a cervice ad caudam decurrente; ad latera tuberculosis. Orbis rane rictu *Clusii*. Ostracion rotundo-oblongus, tuberculis utrinque, pinna dorsi longissima, *Artedi*.

12. *Crayracion oblongus*, supra & infra utramque pinnam postbranchialem & ad caudam macula nigerrima; toto corpore spinosius, demto infimo ventre, molli, ranæ instar. Orbis (C) a muri-

II. CRAYRACION.

- muricatus rane risu. Guamaia Atinga, *Margrav. Willughb.* p. 145. sed figura, quam dedit *Tab. F. 8. f. 2.* non respondet figuræ *Margravii*, neque descriptioni.
13. *Crayracion oblongo-ratundus*; ore productio, diametri trium uncialium, bidentulo, supercilii elatis, spinis undique horridus. Hylrix pulvis *Clusii*. Ostracion conico oblongus, aculeis undique longis teretiformibus, imprimis in lateribus, *Artedi*.
14. *Crayracion oblongo-ratundus*; ore bidentulo; supercilii depressis & levibus, *Willughbeji*; Histrix *Clusii* affinis, quod supercilia elata non sunt, nec caput compressum & extertum, p. 155. *Tab. F. 5.*
15. *Crayracion, capite contractis* spinis longissimis. Histrix alter, capite angusto, subrotundo, & admodum spinoso; *Willughb.* p. 155. *Tab. F. 6.* Ostracion oblongus holocanthus, aculeis longissimis teretiformibus, in capite imprimis & collo; *Artedi*.
16. *Crayracion oblongo rotundus*, aculeorum acie obtusi, punctis reticularis in dorso; cauda pinnisq; variis. Orbis mucosus & reticulatus, *Willughb.* p. 155. Ostracion (subrotundus, aculeis undique brevibus, triquetris, variis; *Artedi*.
17. *Crayracion trimargularis, gibbosus*. Ostracion alter gibbosus, *Aldrov. Willughb.* p. 158. *Tab. F. 6. f. 1.* Ostracion oblongus, quadrangulus, gibbosus, *Artedi*; est trimargularis; habuit piscem.
18. *Crayracion triangularis*, in limbo caudæ dupliciter sinuosis, subfusus, figuris hexangularibus, radiantibus, insignitus. Guamaiaque alter, cornubus carent, *Margr.* Pileis triangularis, *Clusii*. Ostracion triangularis, limbus figurarum hexagonarum eminentibus, aculeis duobus in imo ventre, *Artedi*. *Esleri* in app. *Willughb.* p. 20. pileis triangularis, non nisi imo ventre cornutus. b)
- b) Sinus duo similitati indidem dupliciter acutum reddunt, & nec cornus nec aculei possunt, quæ *Artedi* pro apophyibus ostium agnovit, si sint in capitebus piscium (de part. p. 2. a.) &c, quod sunt apophyses, si in limbo ventris

II. CRAYRACION.

19. *Crayracion triangularis*, duobus cornubus curtis in fronte, ventris limbo ex totidem sinubus angulato. Pileis triangularis cornutus, *Clusii Willughb. Tab. F. 12.* Ostracion triangulatus, duobus aculeis in fronte, & totidem in ventre, *Artedi*. Old Husband Fish; est ins *Crayracionis* num. 23.
20. *Crayracion triangularis*; capite cornuto; limbo ventris sinuoso, erecto aculeo in medio caudæ. Pileis triangularis II. *Esleri* in app. ad *Willughb.* p. 19. *Tab. F. 15.* Ostracion triangulatus, aculeis duobus in capite & unico longiore superne ad caudam, *Artedi*.
21. *Crayracion triangularis*, totus maculosus, sinubus in ventre. Pileis mediocri, triangularis, ad imum ventrem prope caudam tantum cornutus, ex toto maculis æqualibus subruis dense insignitus. *Esleri* in app. *Willughb.* p. 20. *Tab. F. 17.* Ostracion triangulatus, totus maculosus, ac tuberculosis, aculeis duobus in imo ventre, *Artedi*.
22. *Crayracion triangularis, externis*; levibus processibus in ventre, caudæ in frontibus; cuius integritatis corpus figuris hexagonalis cum similibus inscriptionibus radiantibus pictum *Willughb.* *Tab. F. 16.*
23. *Crayracion triangularis*, capite & ore productis, cornubus carent, limbo ventris integro. Pileis triangularis, ex toto cornubus carent, *Esleri* in app. *Willughb.* p. 20. *Tab. F. 18.* Ostracion triangulatus, tuberculis exiguis innumeris, aculeis carent. *Artedi*. Oldwife Fish; *Anonym. Supplem. to a description of Three hundred Animals. Lond. 1736. p. 43.* Est Femina *Crayracionis* num. 19. vid. *Anonym. ib. p. 44.*
24. *Crayracion parvus*, corpore & capite triangularis, ore parvo, innumeris exiguis stellis pictus, caudæ quadrilatera, quinque-farie plumosa; oculis magnis. *Tab. III. f. 8.* 7. III. f. 8.
25. *Crayracion quadrangularis*, innumeris stellis ex albo cæruleiscentibus super terreo insignitus; caudæ variæ; musei olim nobis. *Tab. I. f. 8.* 7. I. f. 8.

II. CRAYRACION.

26. *Crayracion quadrangularis*, pone & ante processibus duobus longis cornu similibus & pellucidis armatus. Piciculus cornutus seu Irang Serang *J. Bonis*; *Lisf. app. Willgbb. p. 156. Tab. J. 13. f. 1.* Muli olim nostri; habet pinnam in dorso prope caudam, quæ erecta caput respicit, & recondi potest, quam Bonitius in ventre posuit.

27. *Crayracion quadrangularis*, & productus. Ostracion Nili *Gumeri*; Hololeuca *Belloni*; Ostracion prior *Aldrovandi*. Ostracion oblongo-quadrangulus, tuberculis quatuor maioribus in dorso, *Artedi. c).*

c) Nihil certi de eo constat; Belloni figura malle est; cui vultu piscis ad pentagonum accedens; nulla bellacius tubercula in dorso observant, ut *Aldrovandus* plura quam quatuor in pectus, quæ multis sponis locum inter naves referunt. Impugnatur *Aldrov.* nomen *Ostracionis*, habetque piscem pro sua notione. Sic Ostracion prior *Aldrov.* ab Ostracione *Gumeri* & Hololeuca *Belloni* valde differunt, vel figuram var. esse.

28. *Crayracion quadrangularis*, ad cervicem quatuor tuberculis, quæ in ostracione priori *Aldrovandi* non invenio, neque pinnam alteram ad caudam, dorsali oppositam. Piscis quadrangularis, quatuor tuberculis medio dorso insignitus; Ostracion prior *Aldrovandi* *Willgbb. Tab. J. 16.* cui tamen *p. 143.* saltem species ostracionis videtur, vel potius varietas.

29. *Crayracion* refro os in prona parte superante, stellatus & testellatus. Ostracion tertius *Lisf. app. Willgbb. p. 156.* Rostrum five natus admodum produciuntur in quendam mucronem *ibid.* Idem videtur *Artedi* cum pice majusculo quadrangulari, rostro, *Lisf. app. Willgbb. p. 20. Rati p. 45.* ambo: Ostracion oblongo quadrangulus, rostro acuto, maculis in dorso & capite. *Artedi. Willgbb. Tab. J. 11.*

30. *Crayracion*, in singulis mediis squamis singule macule majusculæ, piscis medioeris quadrangularis, maculolus, *Lisf. app. Willgbb. p. 20.* Melius: Ostracion quadrangulus maculis variis plurimis, *Artedi*. Squamis enim carent Crayraciones vel Ostraciones, corporaque habent plerumque testellata d).

d) Testellæ nobis dicuntur, ob figuræ superficiei descriptas, quæ, quod denticulis mutuo coherent, in easdem saltem, quod flosculorum piscium exiit, facillius resolvuntur, vel sanguantur, quam gasterium quorundam tegmina.

II. CRAYRACION.

31. *Crayracion, anomalus piscis*; quod cauda omnino caret; apparet enim caput cum dimidio quasi corpore sic muciatum, ut posterior medietas abscessa videatur; curæ crassa, alperæ ore parvo, subrotundo, dum hiat. Moli *Salorani*; *Willgbb. p. 151. Tab. J. 26.* & aliorum. Orthagoriscus live huius piscis *Kauder. Gumeri, Aldrovandi, Plinii*. Ostracion catheoplateus, subrotundus, inermis, alper; pinnis pectoralibus horizontalibus; foraminibus quatuor in capite; *Artedi. c)*

c) Quid de istis autor per quatuor foramina in capite intelligat, me omnino latet.

32. *Crayracion, corpore circumflexo*, si fecatus, & quasi incisio; angulosus, cute coriacea, tenaci, capite equino quadrantens simili, rostro tubuloso, in extru operculo instructo. Hippocampus autorum. *Willgbb. & Rondeletius* ipsi branchias five teclas five detectas denegant, licet supra pinnulas duo foramina concedant. Sequimur *Bellonium* & *autopsiam*; ille: „Branchias ad latera habet, (sed occultas, quæ aquam al-
„sumptam per foraminula supra pinnulas dimittunt) pinnam
„in tergore elatiusculam, alteram in latere utriusque ad bran-
„chias exierit, aliam quoque modicam supra cervicem; ju-
„vam habet obtusis ipiculis, quæ canem in viventibus &
„natantibus apparet, quemadmodum & tenues pili in reliquo
„corpore; sub ventre rimulis duabus instructus; ex una al-
„vi excrementa, ex altera ova foras emittuntur. Syngnathus
„corpore quadrangulo, pinnæ caudæ carens, *Artedi*; qui
„opercula branchiarum ipse tribuit, quæ non habet, neque cor-
„pus admodum gracile, licet, si piscis licatus
„est, ad latera compressum, ita tamen ut nihilominus sit
„quadrangulatum.

a. Hippocampus simplicibus costis, *Willgbb. Tab. J. 26. f. p. 4. f.*

b. Hippocampus costarum muricibus inermibus multi olim no-
„stri. *Tab. h. f. g.* c. g.

γ. Hippocampus costis in capite & dorso spinosis. *Tab. I. f. 10. = 10.*

§. XV.

Pisces corpore styumolo cum spiraculo laterali unico haud incongrue sequuntur pisces, iuxta latus pinnam unico spiraculo ipsi corpore sunt compresso & lato; Muresque in hactenus audiant. De quibus *Ælianus*: „Ma-
„rini

riui mures, cū non magno sint corpore, inexpugnabili tamen sepi fuit
 robor, acqve muniti, quippe qvi ad oppugnandum duplici confidunt ar-
 matura, præduræ nimirum pelli, & denium robori; cum valentibus
 enim pilicibus & rei picarioræ peritissimis hominibus pugnant, & Oppianus:

Est quoque præ reliquis sævum muris genus, audeat
 Bella inferre viris gens tantala, tergo dato
 Fidens, & dentis armato dentibus ore.

Branchias habent utrinque quatuordecim modicula scissura pervias; in dorso
 plerumque tres aculeos membrana junctos; cute nuda, adeo tamen alpe-
 ra, ut ad eam lignum & ebora poliri possint. Vocantur & Capri & apri; a
 roremus cum Arreolo in append. ad Part. IV. Ichtyol. p. 114. piscium ge-
 neris nomen Caprisæus.

- a) Diverſitatem inter nāmpes & nāmpes vid. apud Roudet. & adruvandum de Riff.
 Lib. III. cap. XII. p. 257. quod fœtus Oppianus Caprisæo denter acutissimos & val-
 diſſimos tribuit, quibus (inquit) nāmpes curget: sed addit aliter. „quo autore de-
 „tat catere dentibus tū nāmpes, plane ignoro; apparet autem ita iudicasse Ro-
 „delianum ex hoc ſao, qvi plingit pilice, qvi ornato edentulus est — Jam vero Op-
 „pianus Caprisæo denter non tribuit. sed mari, qvem tamen cum Caprisæo eundem
 „eſſe, Diſphus apud Athenæum oſtendit huius verba: Caprisæus vocatur etiam mur, vi-
 „tus telipet & durus est dēc.

§. XVI.

AD LATERA PINNATA
SPIRACULO UNICO.

III. CAPRISCUS. Corpore compresso.

1. *Caprisæus*, tribus aculeis robustis in medio fere dorso, conjunctis,
 recurvis, qvi deprimi possunt; in ventre validus quartus,
 aduncus. Caprisæus, *Sakran*. *Willughb.* p. 152. *Tab. J. 19.*
Rondeletii & aliorum.
2. *Caprisæus*, cauda forcipata, pinna maculosa; in medio ventre
 pinna parva, ante eam aculeus sesqui digitum longus. Gu-
 perua, peixe porco, *Marcegr.* *Willughb.* p. 154. *Tab. J.*
22.

III. CAPRISCUS.

3. *Caprisæus*, ad caudam forcipatam striatus; dentibus æqualiter
 præcisis, veluti humanis incisoriis. *Guperua* V. app. *Wil-*
ughb. *Tab. J. 24.*
4. *Caprisæus*, extrema cauda & pinna dorsali in tenuissimo & longissima
 fila productis; duobus latereculis falcatis rubris, ad maxillas
 transversis; *Lysteri* *Guperua* IV. app. *Willughb.* *Guperua* ma-
 xima caudata; *Tab. J. 23.*
5. *Caprisæus*, cornutus supra oculum; tres pollices a cauda quinque
 aculeis coloris varii, instructus; insigni hirsutie ad caudam.
Guperua hirsutrix VI. app. *Willughb.* *Tab. J. 21.*
6. *Caprisæus*, murium dentibus minutis, duobus aculeis in cervico, albero
 brevi, tercio ex opposito, in ventre; latericii coloris; pinna ad Tab. III
 caudam & in ipsa pinna caudæ radiis distinctis. *Tab. III. f. 9. 6. 9.*
7. *Caprisæus* fuitus, ad oculos & a medio corpore ad pinnam inferio-
 rem prope caudam lineis latis albicantibus variegatus; in
 medio dorso aculeus recurvus membranae alligatus; pone
 hunc quatuor spinæ minores; in ventre pinna parva radiis acu-
 tis. *Tab. III. f. 10.* - 6. 10.
8. *Caprisæus* capite triangulo, gutturoso, ore admodum parvo, bar-
 bato, tunico parvo aculeo recurvo, in apice diviso supra ocu-
 los; exiguis fœtis pinnarum loco ad caudam; cauda ipsa
 oblique reiecta. *Tab. III. f. 11.* - 6. 11.
9. *Caprisæus* longus, binis aculeis dorsalibus, priori ferræ in modum
 exasperato; *Guperua* II. longa, cauda fere quadrata & in-
 mune forcipata, capitis vertice latiusculo; app. *Willughb.*
Tab. J. 20.
10. *Caprisæus* longus; mandibula inferior superiore longior; hexa-
 gon; cutis ad inferum ventrem sulcata; nigris punctis & il-
 neis serpentinis, coloris cyanei, variis; cauda extrema pec-
 tinata, pone oculum longum aculeum ferens, qvem ad us-
 que pinnam dorsalem recondere potest. Unicornis pilicis
 Bahamensis; the Bahama Unicornfish, *Catesbeji* II. p. 59.
11. *Caprisæus*, rubro iride, oculo flexuosis lineis cæruleis radiato; in
 reliquo capite tribus falcatis; in dorso tres aculei membra-
 na conjuncti, Opposito unico in ventre ante pinnulam septem
 aristis fuscis; superiori pinna caudaque lunata utrinque,
 in linea longa productis; pinna & cauda cyaneis. Turdis
oculo

oculo radiato; Gasterus maxima caudata *Willughbii* Tab. 7. 43. *Caterby* H. p. 22. Non est idem cum *Willughbii*. Gasterus V. supra n. 3, sed ab illo diversus & colore & oculis & aculeis.

§ XVII.

Conger, *Anguilla serpensque marinus* parum ab invicem differunt. Sunt omnes ad latera pinnati & unico branchiarum spiraculo donati a), inu & forma externa affinitatem colunt; placent itaque *Generis*: Congri b), plicatum murinum, qui sunt corpore tereti, & unico gaudent spiraculo branchiarum ad pinna laterales. *Murana* uero peculiare constituit genus, quod essentiali nota, pinnis minimis lateralibus, caret c).

a) Sic *Arctius* in *Ichth.* p. 10. 46: Opercula branchiarum neque superne neque infime aperta, sed tantum ad pinna preterdatis ab antevore scilicet, latere *antra exigis forami* ne 3 vel 4 lineas unius unice longe & perpendiculariter (scilicet transversa) ut, uno prædicta Anguilla. De cavitate circa latissimum spinæ dorsi in ipso cute, unde utrinque ad latera descendit meatus, qui, ubi ad locum ventrem inter & spinam fere medium pervenit, recta inde ad caudam usque per media spinæ latera discurrit, & quo loco linea confusius extensa in capite ad caudam usque extendit, vid. *Ormanius* in *diff. cap. Carch.* p. 143. Quam mentem *Em. Arctius* in Anguilla non habuerunt.

b) Conger latissimus, γόγγυτος graecum nomen apud plerumque gentes du obinet, sed interpolatum nonnullis, scilicet apud *Græcos* & *Willughbii*, a γόγυ, voce, unde nomen γόγυς & per transpositionem γόγγυτος, αγγύτος, αγγύς *Diphilus* apud *Athenienses* similitudinem congeri tum anguilla tribuit, imitatur enim cum tum corporis forma, tum & colore: unde est, quod nonnulli anguillam marinam navescenti facile tamen ab hac intermiscuit: oculos enim habet longe quam anguilla majores; amplius item de candidis in lateribus & dorso macula variat, quibus anguilla caret, illi enim linea nigra in exteriori parte umbrinaeque pinnae, quam per dorsum extendit confusius sic, vid. *Aldrov.* Lib. II. c. XXX p. 148. & *Willughbii* p. 111. Differentia sine ulla inter Congerum & Anguillam: ipse *Arctius* p. 11. p. 16. Congerem & Anguillas pro Synonymis habet.

c) *Sep. Lib.* IX. cap. 2. 3. pinarum quoque sunt *distictima* - binæ ordinis, longæ & latissimæ, ut *Anguilla* & *Conger* 1 nullus: ut *murana*.

§ XVIII.

IV. CONGER. Corpore tereti.

1. *Conger*, pinna membranacea, in summiste nigra, rotum dorsum ad caudam usque decurrens; tubulis brevibus in extremo rostro; omnium Auctorum; *Willughbii* p. 111. Tab. G. 6. & *Salm.*

IV. CONGER.

Salmiani. Murana supremo margine pinnae dorsalis nigro, *Arctidi*. A Conger or Conger - Eel, *Angli*.

2. *Conger*, pinna dorsi paulo infra branchiarum pinnae inchoata, initio & fine, uno minus digito ad caudam humiliori, in medio altiore, prona ab ano ad extremam caudam teretem excurrente. Serpens marinus *Rondelet. Bellon. Salmiani*; a Sea Serpent, *Angli*. *Willughbii* p. 107. Tab. G. 4. Murana exacte teres, cauda acuta apertoria, *Arctidi*.
3. *Conger*, pinna dorsi in ima parte nigricante, ventrali prope apicem penitus alba, cauda compressa. Serpens marinus alter, cauda compressa, *Willughbii* p. 108. Murana rostro acuto, lituris albidis vario, margine pinnae dorsalis nigro, *Arctidi*.
4. *Conger*, ventre maculoso, pinnis albidis, caudam extremam non attingentibus. Serpens marinus maculosus, *Lef. app. Willughbii* p. 19. Tab. G. p. Murana teres, gracilis, maculosa, cauda tereti cuspidata, apertoria, *Arctidi*; tres pedes & dimidium longus, crassitie quatuor digitos non ultra parte nisi capite implet.
5. *Conger*, oculis nigris, iride alba, pinnis ad extremam caudam decurrentibus, dorsali & ventrali; dorso ex fusco luteo, ventre albicante. Anguilla jamaicensis, The fresh Water Eel of Jamaica, *Stearns Hist. Jamaica* II. p. 278. Mucus *Marsgr. Willughbii* p. 106. Tab. G. 7. f. 2.
6. *Conger*, dorso fusco, ventre diversicolore, tubulis brevissimis in extremitate mandibulae superioris. Anguilla omnium Auctorum. Murana, maxilla inferiore longiore, *Arctidi*. In ejus *Ichthyologia Part. V. p. 66. n. 4. exat*: „auctoris iuventum esse, quod posteriora foramina longe a rostro remota, mox ante oculos, unum scilicet utrinque foramen, foraminibus tubulosis interioribus majora sint. Anguilla nonnumquam in prodigiosam magnitudinem excrevit vid. *Ephr. Franc. Angl. Vol. II. 837*. De sexu & generatione *ibid.* & p. 837. *Leuwenhoek* omnes semellas judicat. *Trans. Angl. Vol. XXXII. p. 343*. Squamam carere dicitur anguilla communi consuetudine, habet tamen exilissimas squamas in cute observatas a *Leuwenhoekio Ephr. 2. p. 58. anat. invisib.*

(D) 2

§ XIX.

§. XIX.

Superiunt piscium duo genere, qui *pinnis ad spiracula lateralia & ventralibus carent*, *Murena* nimirum & *Lampera* s. Petromyzon. Illa unico gaudet spiraculo, hæc septem (§. IV.) Ambe congrue Congros sequuntur.

§. XX.

AD LATERA APENNIA
I. SPIRACULO UNICO.

MURENA: Piscis anguilliformis, pinnis branchialibus carens. *Willughbejus* decessit via, existimans, quod murena duo habere foramina rotunda ad branchias, aquæ emittebat; recte *Rondeletius* & *Aldrovandus Lib. III. p. 374.* quod unicum muræna in utroque latere foramen sit branchiarum s. orificium parvum, etiam si non rotundum, sed lunatum. Branchias haud recte *Plinius Lib. IX. cap. XX.* euniquæ locutus *Gillius* murænis negavit, cum quaternas & simplices habere *Aristoteles* scripserit, idque experientia cognoscatur. Tubuli dependentes a superioris mandibule extremo pro naribus habentur. Quod *murena* caret, prout & *Lampera*, pinnis ventralibus & lateralibus, multum (præter reliqua) differens a *Congro* a).

a) Vid. §. XVII. not. b.

1. *Murena* omnium auctorum; *mûpana* b) *ῥαῖπανα*, *Italis* mourene; *Willughb. p. 103. Tab. G. 1.* *Murana*, pinnis pectoralibus (adde & lateralibus) carens, *Arctid.*

- b) *ῥαῖπῶν* vel *ῥαῖπῶνα* *Eusebius*, id est flaccus, quod, ut *Macrilius* scribit, præ pinguedine in summa aqua fluitent, & (ut *Macrilius* addit) mergere anapollin, sole nuntium torrensile, ut ait poetæ.

Quæ nata in fudo grandis murena profundo,
Non valet exulans mergere sole cutem.

2. *Murena* rostro acuto, longo; corpore nigricante; a cervice punctis aliquot aureis notata; nonnullis: *Murena* mas. *Myrus Rondeletii, Gen. Aldrov. Willughb. p. 109.*

3. *Murena* pinnis & maculis subulcis, hominis longitudinem implens. *Conger indicus maculolus, Kommer Eel, Belgis. Lij. app. Willughb. p. 24. Tab. G. 10.* an eadem cum sequenti?

4.

4. *Murena* maculata, nigra & viridis; tubulis in superiori mandibula extrema longis. The mutay *Catebeji* II. p. 203; cauda extrema compressa.

5. *Murena* maculata nigra super cinereo. The blak Muray; Anguille de mer, noire tachetée, *Catebeji* II. p. 21.

§. XXI.

Lamperæ nomen apud neminem prætorum reperiri, verum equidem est; *Lamproche* tamen nomen plerisque Europæ lingvis usitatum. Ambo nomina *Arctidus* male nou esse, pronuntiavit; ideo novum composuit, *Petromyzon*, quod, vi vocis, lapidos fugens significat, cum *lampera* a lambendo petras derivatur (§. IV. lib. (b)). Sunt autem *lamperæ* pisces (subteretes, branchiis occultis, quibus spiracula septem ad latera, pinnis earentia, simul ventrali pinna deficiente; ore in parte prona elliptico; in medio capite foraminulum tubulolum, ad aquam, dum ore petris aliisque corporibus, imo piscibus ex familia sua exacte adheret, excipientiam, quam per spiraculū branchiarum iterum emittat. Piscis omnibus notus, vulgatissimus. Nomen ab *Arctido* ipsi impostum libenter adoptamus, quod eundem significatum habet cum *lampera*. Nunc *Petromyzonem* habere negat doctissimus *Arctidus* P. II. p. 16. at duo utriusque narium foramina subtilissima habet *Tab. I. f. 3. y.* quæ in separata cute, lumini opposita, distincte apparent. Nervos olfactorios delineari curavimus *Tab. I. f. 4. 5. 6.* (*) Exeunt supra oculos ex cerebro & terminantur verius apicem rostri in rete quoddam ramolium, ad similitudinem nervorum olfactoriorum in *Phocæna* (*Miffi* II. p. 28.)

(*) & 7. 22. Nervi olfactorii duo, utrinque tantillum crassiores pili, ut dignosci queant.

b) Tubulus vel ductus hydrogæus.

c) Cranium cartilagineum, quasi elypeo cartilagineo, ad partem mobili, rectum.

§. XXII.

AD LATERA APENNIA
II. SPIRACULIS SEPTEM.

PETROMYZON; piscis anguilliformis.

1. *Petromyzon*, unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores majores, *Arctid.*; duabus pinnis cutaneis, & striatis, dorsilibus; altera post medium dorsū brevi, altera

(D) 3

tera

PETROMYZON.

Tab. I.
63.

cera longa; triangularibus; tertia extremam caudam ambiente alteri contigua. Corpore vivide argenteo, ad latera transversalibus & magis splendens lineis vel maculis curvis; cujus exactam figuram vid. in Tab. I. f. 3. Lampetra parva & fluviatilis Gen. Rondel. Willughb. p. 104. Tab. G. f. 1. Multula fluviatilis minor, Bellou. A Lampetra and Pride of the Iles, Flou. Neunagen; nostrates quindecim pollices Rhinlandicos sepius adegunt; conseruat Clarissimus Prifibus, Miscell. Berol. Tom. VI. Num. XLX. p. 118. de Lampetra loquem spiraculis, vulgo oculata; ubi de ore & dentibus huius piscis.

2. *Petromyzon*; lampetre medium genus; germanis & belgis: Prick, fere Brick, Willughb. p. 106. Tab. G. 3. f. 7. transversalibus & nigricantibus lineis.
3. *Petromyzon* maculosus, ordinalibus dentium circiter viginet, *Arredi*. Lampetra maculosa & bicincta *Saviani*. Lampetra major, *Aldrovandi*; a Lamprey or Lamprey Eel, Willughb. p. 105. Tab. G. 2. f. 2. Cutis nigricans, pallidis & angulosis maculis; albicante macula in vertice, cui contigua est foramen parvum.
4. *Petromyzon* corpore annuloso, appendicibus utrinque duobus in margine oris, *Arredi*. Etenim est; lampetra caeca, seu oculis carens, in blimber *Neunagen*, Encephthalus coeque, Willughb. p. 107. Tab. G. 3. f. 1. an omnino oculis careat? fere ex solo praedictio, quod diu Lampetra oculis privavit; dixerunt tunc, non esse piscem.

§. XXIII.

Huc usque pisces quorum, dum prona jacent, *Spiraculalateralis* sive *quinque*, sive *unicam*, live *septem* mox oculibus sub aspectum veniunt. Modo de piscibus *branchiis oculis*, quarum foramina non aliter, quam pisces supino, quod *branchia* sunt, & quidem *constanter* *putaque* *paria* observari & numerari possum. Communiter audiuntur *branchiae* *plani* a). *Florum corpora*, demta cauda, sunt circum circa in pinnae continuam attenuata. *Cauda* est vel *lavis*, sive *pinnata* sive *apinnata*, vel *lavis* & *peculiari processu* vel *radio* offe, sive duobus, praedita; aut est *muricata*, i. e. multis brevibus spinis horrida, quandoque pariter peculiari radio vel aculeo munita.

nica. Omnibus *os* & *nares* in prona capitis parte. Placuit Do^o *Hissimo Arredi* sub unico genere, *Raja* scilicet, comprehendere omnes, quod quidem adeo non improbamus; cum tamen *Torpedines* & *Rhinohari* inter se, & ambo ab *Aquilis* & *Possinacis*, hi vero turis a *Rajis* multum differunt, *Rajam* autem *pricilatin* omnes dixerunt piscem, quem graeci per antiphrasin *rubi sentis* *inora agrosia* *ferentes* *Bates* appellaverunt, i. e. *cauda* inprimis *spenis* *horrida*, & *fides* a *possinacis* ac reliquis distinxerunt, consilium esse nobis vitium, *rajae* omnino *spandere* a ceteris, omniumque piscium, *branchiis* *liberatis*, & ordo naturalis nullam vim patitur, quod a natura ipsa sufficientibus characteribus pisces, prout omnia animalia, sunt distincti, ut mixtum videatur, nimis anxie sollicitum esse, de rebus, quae non nulli attentionem & sedulam naturae operam praestandam requirunt.

a). *Rajae* voce cartilagineae utitur *Arred* acceptione, quoque tantum pisces pro cartilagineos habet, qui intra se orum grande concipiunt, quod in utero fovent, adeoque vivum animal pariunt: *Gen. Pfl.* p. 11. *Infesta* nobis *semper suis* & *manibus* *distinctione* *piscium*: in *Cetaceis*, *cartilagineis* & *spinigeris*.

§. XXIV.

BRANCHIIS ET SPIRACULIS
IN THORACE.

A. Cauda laevi.

1. *NARCACTION*; a *Narces*: Torpedinem concilians; propter piscis huius historiam, qui stuporem inducere dicitur manus & brachio tangentis

a). *Describitur antequam* p. 106. n. Torpedo suam praestantiam torpedinandi torquem, p. 106. n. item nullum commutat, sed haec quoque suum per aquam veneno flos suum habet, & aggreditur n. Sic fides penes autem; reliqua virtute virulentia videtur apud Willughb. *Randellium* de piscis succos.

1. *Narcecion*; demta cauda sinuosa circularis. Torpedo omnium auctorum, primus *Rondeletii* b); in supina parte quinque maculis albis nigrisque circulis c), in pterogonum dispositis. Batte potto *Gennens*; *Ochiarella*, *Romanis*; the *Craufish*, *Angli*. Raja tota laevi *Arredi*.

b). *Randellius* testatur, quatuor quos recenset, *Torpedinem* *expositis* *specie* non differre, sed maculis fuisse: sic *Saviani*, quem dedit, figura pro genitima & exacta haberi nequit; apud *Randellium* enim margo corporis non est circularis, sed lineae in pinnae continuam dedit.

a)

A. Cauda levi.

- a) *Secundum Celsium*: in archa primo amovus niger, deinde albicans, in medio rursus niger. Super calum excrementorum caetilo spacio, dum excretae pluma, media cauda dux alia ibi vicina, cauda levi in cauda planata.

2. *Narcacion*; maculis simplicibus, nigris. Torpedo secundum *Rondeletii*.
3. *Narcacion*, totus inordinate maculosus vel guttatus. Torpedo tertius *Rondel*.
4. *Narcacion*, totus colore rubrice sabillis ceteris differt. Torpedo quartus *Rondelet. Gessneri*.

§. XXV.

III. RHINOBATUS; a *ῥίς* sive *sqvatio* (§. XI.) & *βάτος* s. *raja* (§. XXII.) *Sqvatio* - *raja*. Media est inter *sqvatinam* & *rajam* figura, & creditur ex *Sqvatina* & *raja* oriri, quos coire ex *Aristot.* & *Plinio Fabius Columus* pisc. alii hinc in phycobato mortuus descendit; mihi eque parum veritate aiti videtur talis conjunctio, ac *Leonis* cum *Parda*. Hoc negari nequit, caput & anteriora *rajae*, posteriora *Sqvatinæ* similia esse; os habet in prona parte, ut *raja*, non in extremitate capitis, ut *Rhina* sive *sqvatio*. Cuius velut arenulis minutis aspersa est. Ceterum quatuor pinnis instructus prout *Narcacion*.

1. *Rhinobatus* s. *sqvatio* - *raja* *Fabii Columæ* & omnium auctorum *Cetola Neapolit.* Willughb. p. 79. Tab. D. 5. f. 1. *Raja* oblonga, unico tantum aculeorum ordine in medio dorsi, *Arsedi*.
2. *Rhinobatus* transparens, cum luci obvertitur; capite conl figurat reliquo corpore & pinnis *Rhinobato* Imo similis. Purpurea, *Acara* pinnia, pira pixanga, *Marcgravi*. Torpedo amori-cana, peixe viola, *Lusitan.* Willughb. p. 80. Tab. D. 5. f. 2.

§. XXVI.

III. LEOBATUS, a *λεῖος* vel *λεῖδης* *levis* & *βάτος*, rubus; quasi cauda rubo levi similis. *Rondeletio* *Leibobatus* *raja* *levis* est. Hoc nomen insiguntur omnes pisces, quorum corpus rajarum modum attenuatum est, cauda levi, non alpera *piris*; licet quandoque unico vel duobus processibus vel radiis offeis prædita. vid. §. 109.

1. *Leio-*

A. Cauda levi.

III. LEOBATUS.

1. *Leibobatus* circinnatus, duobus processibus offeis hamatis in media fere cauda levi, quatuor pedes longa. In lopera corporis parte ferri coloris, in medio tuberculis nigris parvis; inferius corpus totum album. *Aiercha brasili. raja* species *Marcgravi. Aiercha*, *pastinacæ* species circinnata, Willughb. p. 68. Tab. C. 1. f. 2.
2. *Leibobatus* obtusi vomeris figura ad latus extuberantis; cauda longa; colore corporis luperius fulco, inferius albo. *Jabebitere brasili. Marcgravi*. qui duo corpora cylindracea ad exortum Caudæ, digiti crassitie, mentulas esse autumant; & recte.

3. *Leibobatus*, corpore magno; lato; in pinnam triangularem continum attenuato; ore ab extremitate promulcidis quinque digitos distante; labia habet offibus albis duris rectis; caudam longam, teretem, levem, duobus hamulis; utriusque. *Narinari* pinnia, *Marcgravi. Narinari*, *aqvile* species, Willughb. p. 66. Tab. C. 1. f. 3. *Pastinaca* marina *lavis* ex atro exerulea, albis maculis notata, *Sloane H. Jam. II. 276. Jacob. Mjstenus Spec. inag. ver. occ. p. 904. Pastinaca* pifcis est nunc natans, nunc volans; quasi *Rajæ* volitante, quarum corpora eque in speciem alarum attenuata sunt, ac *Pastinacæ*.

4. *Leibobatus*, capite exserto, cauda tenui & longa, levi; in cuius superiore parte pinnula parva, paulo post processum offeus cuspideus. *Aquila Belloni & Saluanti, Aldrov. Gessneri*; *Pastinaca* secunda *Rondeletii*. *Aquilone, Roman. Willughb.* p. 64. Tab. C. 2. *Araqæ grecis*. *Raja* corpore glabro, aculeo longo serrato in cauda pinnata, *Arsedi*.
- a) *Aldro. Saluanti*: quod utriusque sit ferreus aculeus, cum tamen ejus figura, quæ protul. ferreum non habet utriusque, sed simpliciter,

5. *Leobatus*, in medio crassus, ad margines tenuis, levis; ore exiguu, maxillis granularis; cauda tereti, mox tenuata, tandemque in exiguum veluti satum delinente, processu offeo, digiti longitudine, serrato, prædita. *Pastinaca* prima *Rondeletii*; marina *levis, Belloni; Willughb.* p. 67. *Raja* cor-pore

B. Cauda aspera.

DASYBATUS.

lei a capite per medium dorsum serie simplici ad primam usque caudæ pinnam decurrentes numero sunt 34; reliqua in figuris.

5. *Dasybatus stellatus*, totus spinis horrens. Raja aspera *Rondeletii* & aliorum; the Thornback, *Angl.* Raja bouclée, *Gall.* *Willugbb.* p. 73. Tab. D. 3. f. 4. ad extremam caudam tripinnatis.
6. *Dasybatus clavatus*, spinis clavis ferreis similibus. Raja clavata *Rondeletii* & aliorum; the Thornback, *Angl.* Raja bouclée, *Gall.* *Willugbb.* p. 74. Tab. D. 2. f. 3. maxillis cancellatis, tuberculis rhomboidalibus, asperis. In acumine caudæ, ubi desinunt tres spinarum ordines, pinnæ tres. Raja aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine transversa in ventre, *Artedi.*
7. *Dasybatus clavatus*, rostro acuto. Raja clavata altera species, *Rondelet.* *Willugbb.* p. 73. Tab. D. 2. f. 4.
8. *Dasybatus*, rostro acutissimo, cauda bipenni, tribus ordinibus spinarum longissimarum ad extremam usque munita. Raja aspera, *Rondelet.* *Willugbb.* p. 73. Tab. D. 2. f. 1.
9. *Dasybatus*, supina parte totus densè spinosus. Raja fusconica, *Rondelet.* instar instrumenti, quo lillos pannos poliant; rostro latis longo & acuto. Raja aspera nostras, the white horse distle, an lullonica *Rondeletii*? *Willugbb.* p. 73. Raja toto dorso aculeata, duplici ordine aculeorum in cauda, simplicique ad oculos, *Artedi.*
10. *Dasybatus*, & supina & prona parte spinis frequentissimis horrens, ut manu tolli non possit. Raja asperissima *Rondeletii.* *Willugbb.* p. 73. Tab. D. 2. f. 2.
11. *Dasybatus*, spinis ad oculos nonnullis, in dorso raris, in cauda bipenni tribus ordinibus aculeatus, cinereus; Raja undulata live cinerea *Rondelet.* Raja varia, dorso medio glabro, unico aculeorum ordine in cauda; *Artedi.*

B. Cauda aspera.

DASYBATUS.

12. *Dasybatus*, maculis, undarum modo, flexuosis, cinereus, corpore laevi, cauda triplici spinarum ordine horrida, bipenni.
13. *Dasybatus*, maculis lentiformibus, cauda inaequaliter tribus ordinibus spinosa; dentibus in os recurvis. Raja oxyrynchos prior, *Rondelet.* Raja oxyrynchos major, *Willugbb.* p. 71. Raja varia, tuberculis decem aculeatis in medio dorsi, *Artedi.* An, raja innumeris dentibus instructa, cauda densè spinis muricata? ex relatione *Naucleri*, a quo caput mutilum; *Missa* I.
14. *Dasybatus*, in supina corporis parte versus alas quadatenus spinulis donatus, cauda unico ordine spinarum muricata, ad sinistram latus duobus paribus. Bos antiquorum. Alia raja oxyrynchos *Rondeletii*; in prona corporis parte innumeris conimatis parvis, nigris, variis b).
- b) Hæc præsertim accedere videtur *Raja*, quæ mensis Decembris 1740, a nauclero nobis oblata.

XXVIII.

DESCRIPTIO RAJÆ

No. 14.

Cujus prona & supina, ad octavam partem suæ magnitudinis redactæ, icones tradimus: Tab. V. f. 1. 2. Tab. V

Integer piscis a rostro extremo ad exitum caudæ longus 69. poll. *Rhin.* 1. 2.
Ab extremo rostro ad exitum caudæ in prona corporis parte 45. poll.

Cauda longa 24. poll.

Or (f. 1.) ab extremitate rostri lit. a distabat. 8. poll. f. 1.

- ab uno angulo ad alterum: 5. poll.

- quod reliquum, 1. milibus *Rajæ Missæ* I. Tab. VI. dentibus instructum, quantumvis minoribus †).

Nares: lit. b ab invicem 4½. poll.

Cylindracea corpora, quæ dependent a continuata pinna ad anum utriusque, lit. d, erant longa 8. poll. ††)

Ale, quæ vocantur, extremitatibus abolvebant latitudinem piscis: 44. poll.

(E) 3

Prona

Frons pars corporis integra: levis, creberrimis punctis neglectis, quasi commatibus rudis, nigris, eutem perforantibus, luper albo-carulicente, variegata *†††*.

Supina corporis pars, dilata sacca; fig. 2.

Oculi, nebula obducti, *lit. b*, ab extremo rostro, *lit. a* disabant: *p. poli* ab invicem *3 poli*.

Mox pone oculos *foramina*; quæ in os patent, & communicationem habent cum *branchiis oculis in thorace*, sub inciliis vel *Spiraculis* *quinque*.

Extremities *rostri* tantillum aspera.

Regione oculorum, ubi ex corpore attenuato *ala intium* formentur, *lit. b*, *spina* parvula, rura, delcendentes.

Versus extremitates vel *angulos alarum*, *lit. e*, *spina valida*, quæ extolli & remitti possunt, incurvæ; in sinistro latere numeranda 40, in dextro 20.

Cauda bipennis, *lit. d*, triangulara; *loperne* simplici ordine spinarum circiter 20.

ad angulum sinistram, *lit. e*, duo paria spinarum.

ad extremitatem pinnae duæ eunt; ipsa cauda extrema ad angulum sinistram sinistrata.

Hæc quæ *externum habitum* piscis.

† *Aquilæ dixerantibus de piscibus 111, p. 23, exhibetur testis piscis ex suo musco, qui ut ovum ovo similia est restis rube, ex* *Alissa 1*, de perperam dicitur, esse *Carcharias* piscis, nisi forte ita dictus a *velocitate*, acutus, asperum (§. VIII.)

†† *Itæ corpore, sine appendice, de quibus infra, cetera extremitates latum possunt, prout videre licet* *lit. d*, *sinistra lateris*; ambobus oblectantur in extremis

††† *Secundum descriptionem*: tota undique superficies innumera nigris conferta macula (ex vitro nigro globulis dilatis, ni plane sufficit) totidem ille continuus — nigrescentes ostendens stras, quæ non modo vasorum ad illas cavas, sed per thorace quoque per tota macula inest illis arguatur, sed & vere visæ illæ. humores simpliciter, in conglomerantur thorace amplexum glandulae ferreæ, non colore minus quam consistens in villem, per superficiem corporis excrescentia, tum in ipsa contentus humor non obfcurè indicat, cum humore, vitærum oculi referent, per macularum ovis expectatio descendit manifeste. *Itæ de cano carcharias p. 33*: „tum in parte capitis superiorem, tum a lateribus plus pluma in cute fossam conspiciebatur, per qua vi-
„scitas & salicatus humor, gelatinam refertens exibat, quotiescunque illa cute pat-
„re premebatur“

§. XXIX.

§. XXIX.

Quod ad interna strinet, non omnia observari poterant; pisces enim, paucos quidem lule conditus, intestinus cum dimidia cordis parte privatus erat, pectore saltem illato.

Denudati thoracis facies in Tab. VI.

Tab.
VI.

A. *Sternum* cartilagineum.

B. *Cox* dimidiatum, planum, simplex, non in ventriculos distinctum, in infima pectoris parte *†*. vid. *Art. de part. pisc.* p. 24. ubi de corde.

C. *Truncus cordis*.

D. *Aorta* magna, sive *Aorta*.

F. *Quatuor* *aut* *rami*.

F. *horum singuli ramusculi*, qui

G. *Branchiis* lingulis inferuntur. *Branchiæ* sunt pictæ, prout sub aspectum venerunt detectæ.

Ventriculus amplissimus sub sternone, ori continuatus; prout in pluribus aut piscibus, exceptis istis, qui oblongo & tenui sunt corpore, ut lucii, anguille, & multi alii, quibus gula est, & quorum ventriculus in inferiori & apertiori loco.

Branchiæ sunt veluti pili, *Rondel. III. 12.* (aristæ, pedices radiosi vel radii pectiniformes, pinnae calumnes aut arterie capillares, *aliæ* ordine dispositi, semicirculo ossis infixi, utrinque cor pediculis. Dixerunt corpora oblonga, cava, ex membrana, multius cartilagineis, figuram costarum referentibus, nervis & arteriis constare? *††*). In hoc enim branchiæ a pulmonibus differre dicuntur, quod non solum via sanguinem ad branchias deferentia, verum etiam reductricia, arteriæ sunt cum in pulmone respirantibus animalibus hæc vena tunc, illa tantum arterie; vid. in *Arctus de part. pisc.* p. 24, ubi de ulis branchiarum.

Branchiæ in dextro latere, si pisces jaceat supinus, penitus inspectas, postquam inflatæ fuerint, exhibet Tab. V. f. 3.

Tab. V.
f. 3.

a. *Muculi* intercartilaginei.

b. *Kamificationes* arteriarum.

c. *Ramus* leucidus superior.

d. *Rami* superioris subdivisores duæ (inferior tres habet).

e. *Semicirculus* cartilagineus.

f.

f. Interfectioni musculari.
g. Membrana, reliquum circuli tegens.

Myofasciuntot, voce costæ; corpus totum fore tendinosum -- horum punctum (ut cum Winslowio loquar) fixum superioris costæ cor designet radice in eam, abhinc oblique sequentes interioris costæ medium petiit & adhæret musculari ipse, in multis antea fibras divisas.

Cartilagineæ septem vel decem, *Costarum* figuram habentes, in line quantum recurvatz duas fere tertias branchiarum efficiunt, reliquum membrana clauditur.

Spina branchiarum *cartilaginea* interfectioni costarum inservit.

Branchiæ dilatantur & constringuntur, prout dilatatur & constringitur thorax. Secundum *Rajum* & *Rondeletium* ramusculi per scrobiculos ad branchias delati, singulis capillamentis ibidem appendis, valculæ exporrigunt, ut ablata arteria totidem foraminula, alveolarum sibi instar, pateant. Sanguis cor non reperit, sed recta linea a capite ad caudam pergit, unde non requiritur magna vis impellendi. *Cons.* *Severinus* p. 66. de utroque facie sanguinem in basi cordis qui p. 112. motum inspirationis, a branchiis esse scribit per nulas siphunculos in illis dispositos, per quos, veluti per pyuleos, aeris fit attractio, qui aer deinde concitendit ad furculos, hinc atque hinc venientes, post divaricationem arteriæ aeræ innexæ cordi, & ab hoc deinde alterius ad arteriam aortam & sic deinceps in alias; *Cons.* *Arcturius* de part. p. 22, ubi de Branchiis.

†) *Vid. Ref. apud Willughb. Lib. 1. c. 1. p. 3. & Lib. 111. p. 77. Invenit, anasp. p. 69. piscibus sunt arteriæ, at quæ corde eam sunt, quædam ex hepate venæ. Corda per se cum unico gaudent ventriculo, vid. *autres & Phil. Trans. 1711. 1. 84.**

††) *Membrana* ex lamina constructa duabus, collis inveniunt cartilagineæ. *Scaligeri in comen. Lib. 1. hyst. anim. ansp. cap. 17. branchiæ sunt circumvalæ tubæ, fibrillis, lunatis, sicut in aliquibus ipsoque pinnis, ambigua fovea serrata. Idem in comen. a. cap. 14 §. branchiæ sunt, alie, alie quasi quædam pinnæ ovalis, rubre, semicirculares, totæ in conveco laeves, extrema ora serrata, quærum motu aqua in aere rectam rediunt, vid. *supra* §. 114.*

§. XXX.

Capitulum cure, in superiori parte, remotæ, supra foraminis magni, quo tranfit medulla spinalis, aream superiorem, sinus conspiciebatur semilunaris, duos pollices latus, iuxta cujus extremitates foramen utrinque, intervallo pollicis. Unumquodve reidebat ad os, quod rati sumus, petrosulum, vel ejus vices subsistens, unus membrana fibrillis, tympano simili, ciliatulus huc incubans, mediane fovee perforata, quam alteri ex dictis foraminibus exeret immittimus, fere perrepti canales, in quibus fluctuabat nervus continuatus, de quo & de lapillis in *Missu* I.

Of, quod diximus, *petrosulum*, sinistram & dimidiatum Tab. V. f. 4. Tab. V. f. 4.

a. Seta externa foramini in averfa parte immissa integram canalem, quasi semicircularem percurrentem; reveria in b.

Intra cancellos hujus canalis est thalamus lapillorum, c.

§. XXXI.

Duas, quas *Peirus Arcturius* in Raja clavata p. 105. n. 10. appellat apophyses breves, molles & cartilagineas expertes in infima parte ad motum cada, *mentulae* esse cum clarissimo *Rajæ* iudicamus. Hæc corpora, ad caudam utrinque p. inaque antea annexa supremæ parte, a medio ad exitum usque fissuram longitudinalem hæcent. *Idem* diducta observanda traditur in Tab. V. f. §. lit. a. *Varia* diversæ figuræ (secundum *Rajum*) *officula* intus ap. Tab. V. parent, unum peni ostium canis, alterum cultro, tertium unco simile. f. §. a. An officula dici queant, latitudo eorum similitudine faciles finitus, modo magis curata haberentur, cetera officiorum, quos si funguntur officula, sic dicta triserata. Circa principium mentulae, cæteræ p. 113, conspicitur corpus album f. §. lit. b. utrinque oblongum, intusque cavum, formam testiculi exhibens adhuc. f. §. b. nec mentulae corpori cartilagineo. Pars superior variis fibris affixa est mentula muscularis; media subtilioribus annexa fibrillis, corpori cartilagineo & pinnæ antea extremitatibus, cui incumbit; infima vero testiculi pars apertura in semicircularem cartilagineam magnam hauriri habet. In superiori testiculi parte nulla vestigia communicationis cum renibus vel vesiculis feminalibus. *Arcturius* p. 105. n. 22. nec iniectione nec statu inveniri poterant, adesse tamen possunt. Testiculo aperto f. 6. Tab. V., qua parte mentulae adheret, in f. 6. duas sponte dividebatur laminae, quæ cavitatem latas amplam formabant. Lamina inferior pinnam regens aliud adhuc fovebat corpus sub. album lit. a., glandulae instar oblongæ, vasculis minimis quam plurimis fecum; forte officina lemnis. Superior lamina lit. b. lavis.

(F)

6. XXXII.

OVARIIUM GALEI.

Consideratis partibus genitalibus in *Rajia naris*, ad mare, venit *Galea varium*, late conicum, una cum tribus leparis, corporibus, in uero & vagina vixit repertis, quæ ab *Arctostele* H. L. VI. c. X. tollere quædam, ab aliis ova tellorea, tellorea involucri ab *Aburadum*, & nigræ cruciæ maris a *Belloni* dicta; operantibus, ut non leparia ab utero fuissent; interim tamen omnia cum benevolæ Lectore hoc loco communi- canda esse duximus, quod dicitur: parci *Rajurum* & *Galeorum* vel plicum nullius generis esse generationis rationem, cum tamen nulli habe de re claræ & distinctæ offensum propositiones, quas id caprum anno adde- quæ, nobis integrum fore; vid. infra c. XXXVI.

§. XXXIII.

[illegible]

⁂ introitus quasi reflexum apparere: in quo ablugetur humor concrefcit, quem ante conceptum ostendit; eque re ipsa vultus matriculam mar-
⁂ nam, Crapulat de mer, vocitet, culus iconem tradit p. 68. Conferatur
plura hanc de re apud Aldrovandum p. 445, ubi de Rapis agit; sed
plurima ex iam dictis obscuritatem adeo fuit involuta, ut vix intelligi que-
⁂ ant. Quid Spermatis de ovario & oviductu plicis ex canali generis Cen-
trinez similis connotativae plicae poterit in singulari ejus tractatu Myologiae spe-
cialiter addico; item de ovario & utero Raje in epistola de Raje anatome
tracti, de glandulis & mufculis adjuncta.

- †) Quid per mammae illius intelligat Aristoteles, et latet.
††) Qualis est Galeus acanthius.
†††) Monet tamen *depravandus* Lib. III. p. 378. *Rebus Rondetibus & significantibus*
refragantur *crura* *quod vocat*, *refragantur* *etiam* *insolentius* *vocallet*, quo nomine va-
gandum esse loca ipsius icon demonstrat. vid. §. seq.

6. XXXIV.

Præter reliqua, *testaceum*, quodab Autoribus dicitur ovum me-
nibrium tenuius, et gustum huius rei habere non poterim. *Teste* in histo-
ria animalium proprie loquendo, pro dermatonechum et cochlidium vel
pro testaminibus ovorum Avium, Testudinum similiumve fumiur; hinc
testacea, nos foliæ *Schælen* dat, sive den folde *Schælen* gemacht ist, ovum
testaceum est. Quæ mitiger, obden *Schæle*, pro crutaceum est, cuius pu-
tamen ad crustus seu dermati alacorum similitudine accedit; sed frustra
mecum quævissem ejusmodi ovum testaceum vel in ovario vel extra ova-
rium rari pisciumque musceli generis, vel in utero vel in vagina vulvæ,
sive integram, sive ruptam, fœtu periclitæ et egresso.

§. XXXV.

In Tab. VII. f. 1. exhibitur numerus *Quarri* pars, involuero reposito, minus ^{p. 5.}
 minusque numerus *orum* *ovularumque* allico oculis obvio- ^{7.}
 rum. Ipsa *ova* tenuissimas habent tunicas, prope immu- ^{6.}
 ra. *ovula* gallinge, materiamque continent pallide fave-
 scemem & quasi felle tinctam, pari fuculentis simile ¶;
 a. b. coherens fuscis ligamentis, & forte (f. b.) jam murem
 magis fuscis proxima sunt; c. *ovula* murem in evidenter
 c. vel fusciora in tubum alba fallaciola difflam, c. ingressa,
 figuram rotundam mutant in teretem, corundem autem
 tunicæ fucifervæ abeunt in membranulam subfanciālam
 (F) a. tis

Tab. VII. f. 1.

d.
e.

tis validam; in uterum vero d) cui Tuba per membranam communem, e) adnectitur, descripta, comprehenduntur & efformantur foventque folliculos in longum & latum productos utrinque convexos, sive, secundum *Rondeletium* (§. XXXIII.) pulvinaribus, quæ capiti supponimus dormitari similes, coræe substantiæ; cujus substantiæ quocumque sunt æneus capillamentorum specie *Aristotelis*, sive mentus capillares *Rondeletii*, etiam capillamentis mentus abneget *idem*, alias *secundum dicta*.

Porro suspicamus, ova tali modo immutata tandem in utero ††), qui forte *superior vaginæ pars Aristotelis* audit, hærere, usque dum folliculus cum foetu perfecto involucrium luccesive attenuatum perfrigerit, inque *vaginæ* (a nobis differre multumque rugosa) inferiorem partem f) descendit, ibidemque tandem catulus excludatur.

f.

Tab.
VII.
f. 2.Tab. VII. f. 2.
a. b. d.

c.

e.

f.

a) Est ovum acutum cum funiculo, quasi umbilicali in involucrio membranoso b. d); hoc involucrium ab altera parte cuncto solvitur, ut appareat integer folliculus c); quo aperto, non nisi materiam vel humorem foeculentum, similium illi, qui in ovulis continetur, comprehendimus; e) sunt capillamenta, quæ & secundum dicta; f) autem est idem folliculus †††) ab altera parte transparent, qui eodem in loco f) involucrium suum propria virtute jam attenuale videtur, ut legitimo tempore prorumpere possit.

f. 3.

Tab. VII. f. 3.

g.

†††) Est folliculus profectione nudus, & ab involucrio membranoso liberatus, quo aperto, loco foeculentum humoris, corpus g) quod embryonem umbratilem describit, offendimus, substantiæ quasi vitelli ovi gallinæ obeis justo ditius cocto similis, ex parum flavo rubentem & ex albo matronatum, filitumque humore vitreo, albumini ovorum simili.

f. 4.

Tab. VII. f. 4.

h.

†††) *Tertium* folliculum exhibet, ubi fetus excludendi proximus h) in situ naturali conspicuus; hunc demum sine difficultate ex folliculo extraximus, & explicatum in magnitudine naturali prout & supinum fig. 5. diligenter deline-

f. 5.

gnitudinis naturali prout & supinum fig. 5. diligenter deline-

delineari fecimus. Matre, quæ foetum tulit, destituti certo determinare non possumus, cujus sit speciei. Supra cauda fore tota & ipsa partem dorii pisciculus aculeatus videtur. Conf. Caniculam *Aristotelis* cum folliculo & capillamentis apud *Rondelet.* p. 320. & *Boyslium* p. 162.

†) In pilis *Cestrie* simili *dermatitis all. lico* patet ovarium in utero latere unum observari, ovarique majore, melioris, minime, alba, aquæ, flavescens, rotunda, oblonga, multis tuberculis incrustata; item ovoductum geminum. Uterique ovoductus, ubi sub hepate ad diaphragma pervenerat hepatis inter & diaphragma adnectatur venter uterique reliquos menses abdominis linæ eo modo amittitur, ut fluctuantia in radem ea ova infundibula aliam excipere possit, *Rajæque m. illius* simili modo confirmatos esse credit. Parte inferiore ovoductum diffusa, liquor albus effluit, cui corpora quodam *longa*, nec multum crassa innatabant, in quibus corporibus unum quicquam videt, præter binos lunares, quarum exterior rugosa & creta, interior lavis & humore crystallino plena; eademque copiosa pro ovis habuit, in quibus nec dum ulla facies delineata patet. *Plura apud Boylium.*

††) Uterum, ventriculo æquum hoc diffimilem, sic invenimus, prout laudatus *dermatitis* uterum *Rajæ in epistola* sine allegata describit, ex duplici substantia constantem, exteriore albescente, interiore cretula. Totus subtranslucent, cujus tamen fibrae apparent, omniaque, forte ab ovis matris & foetu quæ condita fuerant omnia, ut dictum illarum ab elaborationem repetitam intelligi hoc potest; Intus cavus membranaeque obductus, qui tota quævis viscido glutinosa & plinguita. Vagina f) quam dicimus, plena sunt papillis per lineas parallelas, secundum longitudinem dispositis.

†††) *Embrionis* folliculum appellat, testulam; est autem, prout dicimus, substantia propter eorum vel tenacissimi coram præparat, quod pergamenum dicitur; & miratur cum illi, *Rondeletium, Cestriam, Yostium*, (adde *dermatitis*) simpliciter adeo & absolute præstantiæ *ovarii* folliculo tales, quæ cum modo pilis cum partu exclusis re-jectis leguntur, quæ frequenter ad rariis *ovarii* *Rajæ* imprensæ se delineant videntur, non fecit ac in *Synopsis*, utique parallelogrammi cetera superficies sunt exte-riores, prout hujusmodi folliculorum figuram describit *dermatitis*.

§. XXXVI.

Quod reliquum est, opinamur, non omnibus *Galeis* unum eundemque esse modum naturæ quo foetus suos fovant & excludant; conferatur *Cavulus Galei Asteris*, sive *Musculi* *stellatus* vel varii *Tab. I. f. 7.* qui in funiculo umbilicali & fasculo (an secundum?) instructus est; cum simile quid in i-

f. 3.

tu

46 DE PISCIBUS PER BRANCHIAS OCCULTAS SPIR.

tu Tab. VII. f. 5. non invenimus. *Rondeletius* de *Acanthia* testatur (sive sex in ventre perfectos fetus observasse, quos ex ovis per venam, quam anatomici umbilicalem vocant, excludat pendentes, multis aliis ovis nondum exclusis: ova autem nullo vinculo nligata esse: itaque ab ovis alimenta trahi ab illis, donec perfectiores emittantur. Data occasione, reliqua in clariore luce exponere allaborabimus.

§. XXXVII.

Jam justo diutius merfus in aqua, an homo an piscis, tempus est *επελεγεσθαι*, summaque potere, ne nimis spoliis, quorum densa agmina refluunt, onustus vel tedium vel culpam contraham, quod ultra vires egerim urinakerem; remaniam itaque inpono huic *Misui* TERTIO, quem si sara amuerint, reliqui excipient, de PISCIBUS PER BRANCHIAS APERTAS SPIRANTIBUS: DEI providentia de vita, salute & ceteris omnia committens. Interim humanissime LECTOR, nazvos & errores, cum homo sum, nec humani quicquam a me alienum putem, æqui bonique interpreteris, hocque levitentie munus cum reliquis benevolenter luscipias, rogo.

Seneca

Liv. VII. quest. natur. XXXI.

Multa hoc primum cognovimus sculo, & multa venientis ævi populus ignota nobis sciet.



ADDENDA

Misf. III.


- p. 2. lin. 17. i. e. pro: lege: i. e. aquam pro
p. 9. note c) adde: -- Jecur in liquidum illius tubescit o livum &c. ad jecoris du-
ros consert cæcosque dolores, nam jecur emoluit viribus omne suis, Fel
vero jecori pendens hypochymata delet, quis tantam tali in pilce putasset
opem. *Bouffier*. de nat. aquar. p. 158.
p. 11. ad notam f) adde: vivum animal vulpis parit, in semetque recepat, præque
meu magno protegit ore lusa. Mirus amor, ipseque suavitatem parvus
eorum, qui propriis fraudant quos genuere bonis. *Bouffier* p. 167.
p. 13. ad notam a) adde: *Em* carne quidem dura est, respitque firmum, nescio
quid -- jvdicio non renuenda meo. Illa puellarum prohibet grande-
scere manimas, & laxas stabiles efficit esse diu -- sique id resciscit fe-
mina, pluri ement. *Bouffier*: de *Ignatia* p. 157.
p. 15. ad finem nam i. adde: vid. *Severinus Zosteron*. P. IV. p. 348: sub maiores pin-
nas duo quasi brachia in longam posita per cavitatem, quæ fertur ad
branchias, articulata & muculis adornata.
p. 23. ad notam e) adde: Hanc multi pileem dignantur nomine *Lunæ*, quod lu-
nam ex aliqua parte referre putent; forte eam noctu quod multo splen-
det igni, a tali dictus lunæ luna fuit. *Bouffier* p. 179. *Lobat* way: aux *lules*
des Ameriques *Ton*. I. p. 312. mentionem facit *Lunæ* & *diæci* (des *Lunes* &
des *Assietes*) ali, prout plura apud autorem, sic hoc loco & figuræ & des-
criptiones suspicæ sunt. *Lafette* ad sic dictas *Gnapæras* auferendus.
-- lin. 29. adde: Sub ossibus auriformibus branchiæ latent. Bipartitum est
eius corpus. Pars altera, quæ supra anum, pars altera quæ infra. Superior
tota connecta munitaque coricæ toti corpori communi; inferior ventrem
revert veluti saccum, sed hic uterius consistit; ibi ventriculus cum hepate,
intestino, vesicula, renibus, corde. Anus initio sacci se offert non facile con-
spiciens; viviparus est, si quis præparatum inspexerit. *Sever. Zoot.* p. 271.
p. 28. ad notam a) adde: Adversus hanc orificia, urinæque summi; sub quibus in-
gulis quærent branchiæ, quæ respondent arteriis. Inde patet incuria *Phi-*
losophi, qui branchias mararæ negavit integras; *Plinii*, qui dixit nul-
las. *Severin*. cit. p. 368.
p. 31. lin. ult. adde: vid. *Bouffier* p. 153. 154. Piscium figuras vel propemo-
dum meliores exponit, quam *Rondeletius*, in cuius gratiam epigrammata
scripsit, quæ non in omnium manibus sunt.
p. 34. ad notam c) adde: Ne teli peracuta culpe ledat -- virus enim insun-
dum, quod fit mortale nisi obites, namque gravi tentat, cumque dolore lo-
cum *Bouffier* p. 138. de *pallinaca*.
p. 37. ad notam b) adde: *Bouffier*. de *alia* *raja Oxyrrhyncho* *Rondel*. hæc habet:
omnino nullæ sunt huic in corpore spinæ, nam tantum in cauda spicu-
la acuta gerit. p. 143.
p. 36. lin. 5. a. fine adde: Est ipis horrida tota suis, proin solum hanc munda poteris
comprehendere manu, quæ gemina in cauda pinnula parte subest. *Bouffier* p. 171.


CORRIGENDA




Myff. III.

- p. 2. lin. 15. lego : i. e. aquam pro.
 p. 5. lin. 6 & 7. — transverso
 --- lin. 8. — rante rictui simili;
 --- not. a. — pie defunctus
 p. 8. not. a) lin. 10. — pisces sordidos,
 --- lin. penult. — subrotundo
 p. 9. lin. 25. — Acanthiz
 --- -- 28. — Lanneus
 p. 11. lin. 20. — pinnarum
 --- -- 24. — menticule
 p. 14. -- 25. — Mermaid
 p. 28. -- 9. — ut ait Martialis
 p. 35. -- 10. — ficuti in rubo,
 --- num. 2. lin. ult. — ad oculos
 p. 38. not. + + + lin. 2. — sunt sent
 p. 40. lin. penult. — quarum motu aquam in aqua;

Notand. Ex incutia pictoris pinna lateralis anguillæ Tab. I. f. 1. motu contrario replicata respicit rostrum, sic spiraculum branchiarum, quod prius radicem pinne est, a pinna tegitur, & videri nequit. Hanc incuriam ante non observavi, quoniam Tabula fuerit celata; monendum itaque duxi, spiraculum rursus circa regionem ubi sit. & sub pinna replicata situm habere, ibidemque in anguilla deprehendi.















Tab. IV




N. J. delin

J. M. Sculp. Pinxto. N. J. delin













JACOBI THEODORI KLEIN
HISTORIÆ
P I S C I U M
NATURALIS

PROMOVENDÆ

MISSUS QVARTUS

DE

PISCIBUS PER BRANCHIAS
APERTAS SPIRANTIBUS
AD JUSTUM NUMERUM ET ORDINEM
REDIGENDIS.

HORUM

SERIES PRIMA

CUM ADDITAMENTO AD MISSUM TERTIUM.

Lucretius:

Quid nobis certius ipsis

Sensibus esse potest, quo verâ aut falsâ notemus?

CUM FIGURIS.



LIPSIÆ proſtat apud JO. FRID. GLEDITSCHIUM
ubi & reliqua autoris opuscula.

GEDANI Typis SCHREIBERIANIS. 1744.

Seneca Epist. 33.

Qui ante nos ista monuerunt, non Domini nostri,
sed Duces sunt: Paret omnibus veritas, nondum
est occupata. Multa ex illis etiam futuris reli-
ctum est.

PERILLUSTRI. ET. GENEROSO.
DN. DN.
DE. REAUMUR.
ACADEMIÆ. REGIÆ. SCIENT. PARISIN.
SOCIET. REGIÆ. PHILOS. LONDIN.
ACADEMIARUM.
PETROPOLITANÆ.
ET.
BEROLINENSIS.
INSTITUTI BONONIENS.
MEMBRO.
ET.
SODALI
COMMENDATORI
ET.
PRÆFECTO.
ORDINIS. REGII. ET. MILITARIS.
SANCTI. LUDOVICI.
FACTORI. OPTIMO.
S. D.
J. TH. K.

X

Gravem



*gravem & Illustrem eruditæ
Reipublicæ Civem appella-
re epistola in angustum contracta, onerare
levidentibus plagulis, sæpissime magno pe-
riculo erratur. Quid mirum, si pro
cauto timidus accipiar. Tamen me mo-
vet aliqua vis; nulla perturbat, ut in-
fra vulgus timerem. TUAMONITA,
ut propositum non mitterem, quo, Natura
magistra, nantium greges ad illius leges
disponerentur: TUA HUMANITAS,
qua insequentes conatus suscepisti, & citra
mendas*

*mendas probasti, vim mihi dedere, ut
ulteriora studia TIBI dicarem. Jam
TE nominare sufficit. Quis enim
non novit, quanta sit Cura Cordique
REAUMURIO, res physicas di-
gnissimamque Genere humano historiam
naturalem & Oculis & Mente intueri,
scrutari, perficere? Hanc curam quis
TE curatius gessit? Quanti celebres
fæctus & INGENII & INDUSTRIÆ
TUÆ in Commentariis Regiæ Scientia-
rum Academiæ Vestræ delineati! Q,
quantum est, quod Animalcula, quæ
plebs erudita despicere solet, TE extollant.
Utar*

*Utar Plinii Secundi verbis: Opus pul-
chrum, validum, acre, sublime, varium,
elegans, purum, figuratum, spatiosum
etiam, & cum magna laude TUA diffu-
sum: Volumina modo Sex; quæ tracto,
retracto & amplector: MUNERA
TUA.*

*Calamum sisto; ne Epistola sinistram
manum impleat. Vale & fave.*

Dabam e Museo

Gedani. 18 Martii

1744.

DE



DE
PISCIBUS PER BRANCHIAS
APERTAS
SPIRANTIBUS.



§. I.

animal aquaticum, cui PULMONES, ut Cetus, illud
c. a. BRANCHIAS, quas nullis aliis natura tribuit,
respirat, piscis, Aristoteli audiuntur. Cetus, qui
autem in eumque fugiunt, in Missu II. ad ordinem
natura em redegit, suntque omnes PHYSTE-
RES: c. P. M. C. S. a). Fibrae, Lutrae, Phocae,
Manatus &c. b) quod pedes sunt, non pinnis
praediti, nec flatterer, neque in fluitu degunt, lubet
aquas perquandiu non commorantes, dummodo victum inde emolantur,
inque sicum rursus exeuntes, & in terra vel super saxis aut rupibus dor-
mientes. congregantes, parientes, unde vulgo amphibia c), ad illo-
rum in coetu aggregare nobis non licuisse, aqua clarius liquet, ne, quae ani-
malis natura distincta, & toto a ceteris ad invicem differre voluit, confunde-
reantur. 723 129, (quae et alia non involvant) sive Branchiatorum,
duos (Missu II. §. I. X.) advenimus ordinis summos: eorum scilicet,
quae vel occulta aut obconditis, vel apertis aut manifestis gaudent bran-
chiis. P. m. ord. nis pices, quos BRANCHIOPOCRYPHOS d) dixe-
ris. Missu III. abolvimus, modo secundi ordinis pices, nimirum branchi-
as apertas, quos BRANCHEDELOS e), si liber, salutare licuerit, hoc
Missu IV. aggredimur: DEO volente, Veto Missu absolvendo.

†) Unde

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

§. 11.

jam vero docemus *Arctulium Tachyrrh. Pl. II. p. 54.* fatur, *ter* altero-
ris esse indaginis, *piscum spongiorum* a invenire characteres genericos
vero; quod quidem diffucili non possumus, cum ob multitudine[m] ne
fuerint externam, inter diverfos pisces talis similes, *ab incautus* non facili-
ter ab invicem dignoscitur, unde etiam *est*, quod auctor citi. l. iudicat, *primu*-
m et precipue *difficili* generum ab aliis, *quoniam ab externis par-*
tibus diffucilius esse.
Ad hoc adducit non potuimus, ut generum cruciter aliunde doceretur
peremus, quam vel a *facie externa*, ubi *sula* sufficit (*Art. 52. §. 62.*)
vel, ubi *loca* facies non sufficit, in sublidum vocatis *partibus externis* oc-
currimus numero, figura & tri: qvi characteres (*cod. aut. lib.*) omnibus
relinquit antecellunt ob evidenciam, & quod facili in oculis hominum ca-
det. Ubi vero chara a spina ejusque numero, & interna, v. gr. a dentibus
& vilceribus, vel etiam a moribus aut natura pilorum diversorum, &
neciam de loco (*Art. 52. §. 62.*) differendi, vel loca ut mores eorum quia invelligandi
sunt, quoniam ejus generis lin. cognatum haberebus, verendum est, ne delu-
ti. invero genide nature, operam prestatimus.

PISCES

Fasciculus I. Capite & ventre notabilis: SILURUS. & VI.
A. Ore prono: capite in solidum rostrum exu-
te: ACIPENSER. §. VII.

Fasciculus II. notabiliter rostrati ore vario.
B. Ore fissi:
 1. *Et in brachis rostri retulo, denubis horridis. LA. GARGUS. §. VIII.*
 2. *Mandibula superiore in rostrum notabile exente. XIPHIAS. §. IX.*
 3. *Anteriori mandibula ultra superiorem rostratam producta. MA-STACCENBELUS. §. X.*
 4. *Utraque mandibula equaliter rostrata. PSALISOTOMUS. §. XI.*
C. Ore in rostri tubulosi extremitate: SOL ENO-STOMUS. §. XII.
D. Capite & cauda rostratus: AMPHISILEN. §. XIII.

SERIES
I.

Aperti-
bus no-
tabili-
bus &
corpore
an-
guille
formi.

PISCI-
UM
BRAN-
CHIIIS
APER-
TIS

Fasciculus III. ocelluliter plani & oculati.

Fasciculus IV. Thoracati & notabiliter armati:

Fasciculus V. Vel sterni vel capite notati ad iuslar rictini omnibus corporibus libique invicem adherentes: §. XXVII.

Fasciculus VI. Corpore terrestriale, unde ENCHELYOPUS, anguilla adipeum habens. §. XXVIII.

Fasciculus VII. Dorso alactrypero. &c.

Fasciculus VIII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus IX. Dorio alediptero. &c.

Fasciculus X. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XI. Dorio aledonoptero. &c.

Fasciculus XII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XIII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XIV. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XV. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XVI. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XVII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XVIII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XIX. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XX. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXI. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXIII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXIV. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXV. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXVI. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXVII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXVIII. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXIX. Dorio pseudodiptero. &c.

Fasciculus XXX. Dorio pseudodiptero. &c.

BRANCHIIIS APERTIS.

a) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-
 b) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-
 c) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-

b) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-
 c) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-
 d) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-

§. V.

Forse etiam in Missu Vro, notis minus generis e. gr. a squamis
 a) peritas (hinc diffinitur) amplexum; quod AUTOR nature sapien-
 tissimus mundorum piscium, Ilraelitis in victum concessorum, caracte-
 res generis in prunis squamisque deposuit Levit. XI. Sane, natura nil
 recondit, nec ita inter ludic cum piscium pinis, si eum in dorsales live
 ventres, sic alio loco licet distinguere pisces a facie & partibus corporis
 exterius b). In antecessum autem parvis esse cupimus, ne nobis vicio
 vertatur, ubi vel Harengum ex amplissimo Cyprini, vel alio vulgariori ex
 Luno live Elici, & plures ex aliis generibus ab Ardeo conditis, vindi-
 cemus pisces eo non pertinentes, vel ubi nova condita genera ad pavore
 contraxerimus vel species erronee congestas ad certiora genera refer-
 rimus, neque Merluum Willagaberi vel Argosum L. 15 affilia esse agno-
 scimus c). An Lupo-perca sit perca, trutinabilis nomen equidem
 communium est, ideo tamen pisces non est mixtus, ut voluit nonnulli,
 prout nec mixtus est piscis Squazine regia live Rumbatur Miss. III. §.
 XXV. d). Ubi necessitas postulaverit, indicabimus opercula branchi-
 arum, an ossa sint, an vero ex membrana in solidum confusa, ceteri hanc
 omnia ad ipsam piscium huiusmodi potius quam ad ordinem piscium per-
 tinent, ab operculis vero generis colligere, maxime nobis non erit
 credere la. est, eum, qui tale quid itaque velle, vel libi vel aliis necum hi-
 storiam piscium in ordinem redigende latius deorum esse. Denique nomi-
 na greco-latina (quod moris iam est, nova condere, ubi vel antiqua suffi-
 cere possent) generibus inscripta, suis locis sufficienter explicabimus, ut
 vel minus doctis recitare liceat, quid dicta venint vocabula.

a) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-
 b) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-
 c) In ore, ubi et in cauda, in notabilibus hinc et inde una parva interdum una et dom-

zamen squamas habet, existimas quidem & a *Leptocentrus* (Vid. *Misf.* 11, p. 27, n. 6) de eadem & amplius, pinna vero (quae de dextra colla in *Ardea* p. 11, p. 1) conspicua: non autem Deus praecepit *Levi*, *XX*, §. aquasque in aquis *pinnae* albae & *squamae*, tam in mari quam in fluminibus, et concedens: videri magis possit, quod Deus omnia sunt deus, datus fuisse illudque fructum commensuratum gressu: verum, cum nullas angulas nobis evidenter habet squamas, quae per seipsum ante *Leptocentrus* & sine ope microscopii necesse fuisse, *Leptocentrus* voluit obediunt Legi ubi praestandum simpliciter iuxta characteres a *pinna* & *squama* & *videtur* tantum desampcos, qui numerum ambo mox sub aspectum venient, utique evidenter altero characteris evidenter *arguebat* prohibendum fuisse iudicamus. Iam ex inventura in vasa, pons de *squama* superadditur: quod piscium carum de- fendant, ne ab aqua continuo allapsi *staccet*: creditur cum pice, & si rediit, iam passu fuerint, restituerunt: & a *Roche* pice sine anguliferis pice & labris qui dicuntur, non omnino carum *squama*, impiiuxta iuxta ventrem, licet per seipsum & obitu, qui sunt praeceptum est eadem coracae carum descendere, utiqueque *viscose* praedita, quae fons confertur caro ab *epistula* aqua, & mania transpiratio impeditur. Squamae ex pluribus lamellis constans: Vid. D. Reamurum *sur la formation des osseilles des poissons*, *mem.* de l'acad. 1716.

b) Pinnae beneficio pice corpora sua in nequibus servant. *Reffert*: & in anteriora promoveat, sed praecipue via mellei est in cauda: oculi *Barth.* de *mura animal.* §. §. *de mura*, *Ch.* 5, p. 693: plures auctores.

c) Vid. infra §. XXIX. not. b)

a) Sic *Thalassophis* nomen compositum est a *Cervus* & *Rince* ab *ἑλκός* (ἑλκός) ἑλκός, de quo vid. *Deleat.* *offic.* *fig.* p. 121, in *qre*. *Uta* compositi de *Uta* & de *Cet.* Hinc: *Cervus* ex capibus montanisque locis manitibus apud *Se.* *Cajum* *rar.* *animal.* *hisp.* p. 13. Inter animalia multa istum referunt: vid. *J. C.* *Cypr.* *Myrsal.* p. 17, r. 1. sed perperam. A nomenclis non evibus adnumeratur, quos referunt *Barthol.* *Horae.* p. 11, *Lb.* p. 2, & *L.* *Hujus* genera integram familiam anno 1733, d. & *Mura* *Drade* vid. & observari in *Solubio* *Edictiano* *Indone* in regio *proda* *offic.* *dicta*, *blarem* *inspector* appellatur *Alfons* *africanum*, *temas* *Beringen*. Mas *retoritur* & a latere consideratur: sola est *Cervus* natio, *cauda* & *loca* *hinc* (de *Blume*) *cervi*, prout & color pice pedesque carorum sunt, collum adspice villosum, ut cervis. Anterioris capite oculi & cornibus ad ventrem referantur. Cornua sunt veretici, rudi, oblique, nomenclis compositi, annulata & ad latera reflexa: sic *feris*, *tempa*, *cat* & *catenata*. Feminae pariter ad *empa*, non rudi antroscum *inspector* capite vel *empura*, imberbus tamen, *refertur* illa *sic* *manitibus*: *paribundum* *ille* ad *insolitu* *strep* *tum*, *ideo*, ut *grat* *solita* *solita*, in *periceto* *arcol* *tent*. Ex hac descriptio- ne evigilant patet: *Thalassophis* natus *Cervus* nec *veretum* esse vel *blaram*: sed quae ex propter *dictum*: ex comitente *Cervi* & *lure* *refertur* *l* *manet* *venit* *sal* *genetis*, propter caput, principalem animalium partem, & cornua ad familiam hinc nam

nam & genus *Alceis*, specie cornubus ad latera reflexis, pedibus referendum, quam ad familiam vel genus *Cervum*: hoc cornua habet ramosa non simplicia: *Cypr.* *rar.* *anim.* *hisp.* p. 60. *scribit*: „in utroque frons angula quatuordecim decidit, ut in *Cervis* *acornis*, valente natura in angulo cet. „in *acornis*, cum in cornubus, quae ca- *veris* magis sunt, non possit. „Cetera *speculorum* *convergencia* *cornicula* *fune* *vel* *biveli* *trifurcata*, quia *posita*, non *attende* *cornubus*, ad *teperum* *genus* *referenda* *hinc* *anomalotus* *pedibus* *digitatis*.

§. VI.

PISCUM BRANCHIIS APERTIS
FASCICULUS PRIMUS.

Capite & ventre notabilis.

SILURUS. EA piscis *branchiodelus* sine *branchiis* *apertis* vel manifestis (*Misf.* 11, §. IX.) inter omnes qui branchiis respirant, caput depressum, rictum a), ventremque habens amplissimum os cir- colum. Multi auctores veteres cum latini, tum graeci, *Cetaceos* ac- ceperunt pro grandibus cuiusvis generis piscibus: & si quis, inquit *Cetaceus*, marinus beluas pro cetis dicere malit, non impe- dio: nam cetarum nunc cetaceorum pulcem non tam de *Ceto* pro- prie dicto & pulmonibus spirante, quam de maximo pice bran- chias habente, ut *Thunna*, *Lamia* & similibus (quibus etiam de Siluro) acceperim, sic & *Scaliger* ad *Arif.* lib. 11, cap. XVII. atque episcopatam significat, aliis nomen hoc nequam a vera inter *Phyleretes* *Bilene* caput veritatem propemodum partem totius corporis abolvit, (*Misf.* 11, §. XII.) rictusque & venter ipsi tantum amplissimi, reliqua corpore post annum fructuosa, sic de Si- luro nobilissimum *humum* *grallatore* *idem* *astrum* *humum* *est*: qui in *visibilia* aliquando 16 pedum longitudinis, capite, & de quo *Plinius*: „Grallatur *Silurus*, ubiqueque est, omne ani- mal appetens, cypos innotens *lure* *demergens*: praecipue in *Meno* *Germania* *amne* & in *Danubio*„ inio periculum nobis habent, *Rondeletii* figuram balneae vere *nucleatum* *mare* *barbae* (*Misf.* 11, §. 11.) tanquam cerebrinam, ex *balena* & *Siluro* compositam esse. *Silurum* *Willughb.* minus recte ad anguillifor- mes numerat.

b) *Volturnus* de *Esper.* *animalium*, quae a partem *discrimine* *orientatur* *cap.* *XXIV.* p. 21. *Acta* *magnitudine* *discrimine* *existere* *anomalotus* *pedes* *est* *plus*

SILURUS

polia et in eo magno hiatu recisam est — alij parvum. „ Vide autem
rem pluribus de multitudine & paucitate partium; de lenitate & asperi-
tate; de figurarum differentia dea. conf. cap. CXC. fol. 189. de Siluro, &
Scalpinos polia ad Arif. Hif. Anim.

Species funt:

- [illegible]

- b) *Silurus*, quem *Aristides* describit, spec. p. 147, cirro initio in mento exhibit, *habe* Avee, non est *Silurus*, dei *Wetzel*, sed *Gadus* dorlo apertigulo fuleo magno ad pinnam dorsali primam, ore curvato, *Aristides* multo vulgaris *Gomari*; murelii maculato; nobis infra: *Ensiolyporus* gajius, habent pinnam dorsalem longam; fecundum *Aristidem* pinnam dorsalem; alcatam brevem ad sulcum, alteram anguam; cum *Silurus* dei *Wetzel*, habet unam pinnam dorsalem exiguam nervorum trium, branchialibus pinnis sece oppositam.

2. *Silurus ciris* quatuor carnosus e superiori maxilla, cauda bifurca. Ichthyocolla e Exos Rondelietii e Belloni, the Giew-Fish Anglus. *Charl. de different.* pife. p. 40. paulo lupra (puncum operimentum branchiarum quodam ad ejus latera impresso foramine pervio; addit Willgöb. p. 244: Pulcis hic ab Hufione Germanorum omnino diversus

SILURUS

diversus est, quantumvis & *Rondeler*. & *Bellonius* eundem faciunt, *Bellonius* scribit: quod pinnae in tergore duas ad caudam erectas habeat, sub qua rectissime videas podiei vicinam; cum tamen *Willughbejus* lehtyocollam inter plices marinos aculeatos, quibus unica in dorso pinna, collocaverit. *Acipenser* tuberculis carens *Art.*

9. *Stilurus*, cirtis pluribus; capite crasso, rotundo: ore anpliffi-
mo; in quod pices sui generis intrare possunt; sub utroque o-
culo cirtus longus; ante oculos brevis; sub labio inferiori plu-
res breviusculi; duobus pinnis conicis in dorso; cauda furena
vel lunata; corpore crasso. Ragz secunda: speciei Margravi
affinis. *Cateby Tom. II. p. 23. & ibi figura.*

§. VII.

FASCICULUS SECUNDUS

Notabiliter *rostrati*, *ore vario*.

Sunt pisces *branchiis apertis*, corpore longo, versus caudam attenuato, ventre plus minus acili; quorum vel superior vel inferior, vel ambz mandibulae in rostra variz figure productum; vel quorum rostrum habent tubulotum; os in tubuli extremitate.

A O'c pro' o, e leant' , a b' ro'ro' cl' do.

AC. 17. N. 1

Galeus *Acrope* a). *ἀκροπηνος*; *Sturio* a); *porcus* *fluvi-*
atilis, *Dalpinus* *similis* *Marcellino*. *Antiquorum* *Sikurus*.
Galeus *Gelaxias* *Galen* b). *Elops* *Ovidii* c). *Huso*.
Anacurus. *Acetius*. *Galeus* *Rhodium* d) *Stoer* *Germ.*
Surgeon. *Angl.*

- a) Quid sit *Streplos*, quod recte praenae puppis coacta: speciem gerat.
 b) *Galerium* non una species; nam pictis, qui in maximo pretio habentur apud Romanos, et *galaxus* vocatur, ex genere ei *Gale* ^{rus} — *rus* *Lk.* *ix* c. *vii.* apud antiquos piscium nobilissimas habitus. Ac pictis — quidem ante in ipso vocant.
 c) Et pretiosus *Elopi* uellus interrogamus unde
 Tuque peregrini, Antaeusque, *Antaeus* ^{Antaeus}

A. Ore prono
ACIPENSER.

- 1) *Rondelotius Lib. XIII. p. 416* & *p. 17* restans ens, qui alias atque alias pilula pro Styracis representantur, conclusit *p. 17*. Quae cum Saurio atque retentum lupus sit, neque Attilus, neque Turpis, neque luctus, neque flatus, neque ac magna in canis, *Lib. 1* sententiam, ut Acipenserem Romanorum & Germani *Elephas* sine Ostentis Galadum esse credam, a qua sententia non emovebor, donec aliquis alius ingenio vel diligenter aliud, quod magis acribit, inveniat & comprobaverit.

10. *Acipenser* proboscide Elephantino; indicus; Elefant nomenclis itinerariis; Pezgallos; poisson coq; Demoielles; figuram vid. apud *Frenser voy. de la mer du Sud Planch. XVII.* Elephant, à cause de sa trompe; amphorem descriptionem ulibi non legi; piscem enim suspicatum, hoc loco praetermittere nolo.

§. VIII.

B. Ore fisso

& labrace a), rostro retuso; dentibus horridis.

LATARGUS;

Latargus, *Latargus*, *Latargus* i.e. canis clavi vel lateris mordens; vel, si mavis, *Ichthyolupus* pilula-lupus. Lupus marinus notiss & *Schoneveldii Willughb. p. 139. Ray. Syn. Pys. p. 46.* *Schoneveld*, ein coiffes frische, und bei Schoneveld *Ichth. Olear. Gott. S. p. 49. Tab. XXVII. num. 2.* *Wolff Heiligland. Anarchicus* vel *anarchus Gerneri*; *Silphio horticis* populis. In *Islandia*: *Steindöfner. Angl. Sea Wolf*, *Wolf-fish. Anarchicus Arcti.* Caput Galco vel Canis inalis & magis orbiculare habet, coloris, prout *Cynocephalus glaucus*, & cerulei; pellem glabram; nire vocis mordaxque animal est & dentibus suis terribilibus, anchoram enim si prehendit mordicus, sonum edic & strepitum, ac vestigia conspicua relinquit; nam in acie mandibulae interioris dentes acutos & rotundatos, gemino ordine dispositos, decem habet, hos molares utrinque duodeni, duplexa serie collocati, sequuntur. Superior mandibula sub rostro dentibus duodecim rotundis & acutis munitis, reliqua vid. apud *Schoneveld. p. 45.* Ejus dentes molares venditione pro *hyssopitis orbiculatis* b); prout *Cynocephalus* & *Galeorhinus* dentes *glossopetris* audiunt. Sane nemo, qui piscem vidit, cum *Willughbejo* dixerit *Anguilliformem*.

a) 12

B. Ore fisso
LATARGUS

- a) 12 est, *rostrum villosum*; *Latargus* *Latargus* *Latargus*, quia illi sit et os & repente ac cum impetu & voracitate etiam devorant; unde & veterum *lupus pilula* *Latargus* dicitur; vid. *Charlier. de diss. p. 11. p. 11.*

- 1) *Ichthyodentes* *Gottlieb Lycht.* *Toadfishes*, quos *Da. Storror* *poisson* et *Lepo* *anarchus*, *Wolffsch. Schoneveldii* derivavit. Similis sunt *Ichth. mactes* *pilula* *anarchus*, *anarchus*, *Dentatus*, qui in insula *Moravia* *clavi* & *anarchus* *pilula* *anarchus* vid. *Isle nana* *specul. p. 27. Tab. 11. Ichth. Trans. Vol. XI. No. 219. p. 155. Ray's Trans. p. 121.*

§. IX.

Mandibula superiore in rostrum notabile exeunte, inferiore brevi, triangulari, mucronata.

XIPHIAS.

Gladus; *Schwerdsfisch*; the *Swordfish*, *Anglis.* *Pesce spada*, *Ital.*; *Miles Albaris*, quia gladio nuntius. *Rostri* coniformis (inquit *Gefnerus*) in hoc pisce tam evidens est nota, ut ab eadem in diversis lingvis nomen ei eadem significatione sit scilicet. Secundum *Adrevandi* & *Salviani* figuras non solum *Xiphias* rostro longissimo, ancipiti gladio, sed etiam rostro triangulari, ab altera parte cavato (*Schoneveld*) ostendunt; *Hottel* *Xiphias* *E. N. C. G. Dec. II. A. VIII.* ob suspectam figuram, nec non *Xiphias* *Schoneveldii* *Cent. I. & II. in app. N. C. G. in suspensio* relictis; ultimi placidum dentem dixerit *piscis* *Norwhal*. Sic neglecta figuræ magis confusum, quam explicant, & lapsissime descriptiones vage ac ambiguis reddunt; e. gr. *Willughbejus* *p. 161. Irribit*: „Pinnam habet in dorso unicam a superiore branchiarum angulo inchoatam & ad caudam prope continuam, hæc latior altissima est &c.“ *quem & Rapis* *Syn. Pys. fecerunt*, aut figura *Gladii*, quam a *Salviani* mucronem tradit *Willughb. Tab. I. 27.* descriptioni deueigam responder; *quin Salomon ipse* dicit: „In dorso pinna duas gerit, superiorem augustin & pinnam caput, inferiorem exiguiam propeque caudam.“ *Quem vero* *Willughbejus* descripsit *piscem*, *Guebuc* *brasilienfis* est, diversius i reliquis *Xiphias*, infra No. 5. confer apud *Joan. Cq. rarior. anim. p. 164.* descriptionem *Gladii* hujus *piscis* *Xiphias*.

1. *Xiphias*

B. Ore fissi
XIPHIAS.Tab. I.
f. 2.

1. *Xiphias* pinnis quovque, demta cauda kmata; rostro horizon-
talter recto, gladio aciculi angulato simili; mandibula
inferiori acute conica; Tab. I. f. 2. Pinnæ branchiales in
superiori angulo branchiarum & propemodum in cramo radi-
calescunt, coriaceæ, speciem eriste vel alarum sagitte refe-
rentes, pariter ac dorsalis prius paulo post branchiales; in
alium omnes erectæ; ad caudam quarta pinna vel dorsalis
secunda, humilis, modice interrupta; quinta ad anum in-
vertæ eriste figura. Branchias habet octonas & quidem du-
plices, ut recte scribitur *Rondeletius* & *Salvianus*, non qua-
druplices, ut creditur *Gillius*. Corium admodum leve, ad
instar ferici. Or plane edentulum, non nisi raris, & tenui-
bus spiculis curtis versus guttam, guttur flavescit. Dorsum
furvi, pinnae fuscæ coloris; ad latera & in ventre ex glauco
rubellicæ; caput & rostrum ex chalybe glaucescunt; bran-
chias intus rubræ; sequina branchiarum ossæ, parum mo-
bilia, & hiant. Nares mox ante oculos patent; reliqua in
figura; hanc iusta proportionē abbreviatam transumptimus
ab egregia imagine, quam ad naturalem magnitudinem fecit
famaus *Samuel Niedenbaltus* Victor Gedon. de pisce
anno 1672. XI. Aug. haud procul ab ore Vissulæ in mari capto,
que inter alias picturas in conclavi maximo Curie Gedanen-
sis, quod civici ordinis & iudicii consilii dicitur, suspensa
est. Pictis ab extremo rostri ad exitum medii caudæ longius
sunt pedes X. Dantianos. Hæc figura autem considerata,
precebat, *Xiphias* nullibi accurate pictum exhiberi; & quod
hic piscis differat, minimum rostro vel gladio a *Xiphias* fe-
cundo, qui sequitur; nam hunc, anno 1736 ad litus He-
lenium ab alio fusi generis in duello necatum, integrum non
vidimus, cuius duntaxat caput, reliquo corpore a Cælio-
neusius iam consumpto, iussu Illustris & Magnifici Domini
Joannis WATIL, Tra. Consulis, tum temp. Hele Admini-
stratoris ex Prædictis Magnifici Senatoris ad manus nostras de-
catur. Conferatur figura nostra cum *Xiphias Hartmanni* N.
C. G. Dec. 11. A. 11. in app. qvæ a nostra valde abluide; si-
milis piscis anno 1710 d. 18 Sept. ad portum Pillaviensem ca-
ptus, cuius longitudo fuit 88 pol. Gladii 35 pol; hunc
venit, Dominus *Schrotenberger*, minister verbi divini, Re-
giomonti in ære incidi curavit, cum ampla inscriptione, ad
picturam minus exacta est.

a. *Xiphie*B. Ore fissi
XIPHIAS

2. *Xiphie caput*; dimidio minus pictum Tab. II. f. 1; cranio Tab. II.
clavo; gladio subcavo & convexo, ac decilvi; extrema
gladii parte in duello deperdita, de quo supra mentionem feci-
mus. Substantia gladii est inter cornam & ossæ media,
unde colligere licet fastidiosius esse priorem fabulam, quas
Aldrovandus complavit, *Xiphie* naturam & mores explican-
tes p. 129. c. Maxilla inferior nonnulli recurvata. Oper-
cula branchiarum a. b. ossæ, cum parte cranii denticulis c. a. b. e.
sibi invicem arte coherente, unde est, quod, prout iam
monuimus, parum mobilia sint, & perperno hient; fig. 2. f. 1.
inferiorem mandibulum ad naturalem magnitudinem pictam
exhibet, ut os edentulum & linguam quasi duplicatam ac
curvatam, siue linguam in concha, cernere liceat. Jam diu
absoluta iussu *Oyarro*, VII. Nov. an. 1742 juxta littora Neth-
ringæ, retribus pro captura aliorum, *Pannichien*, expolis
(ad quæ coloni propter implacabile mare per Octidum ap-
propinquare non poterunt) implicatum, emortuum & for-
tulem offensum plicatorem *XIPHIAM*, forte a reliquis
omnibus specie diversum. Prout tui relatio plebecula gen-
tis, pites circiter quatuor pedes fuit longus, ore tam vasto,
ut caput humanum amplexu potuisset, in cuius extreme eni-
mit indolens ruber, procerum gladiiformem procedens;
hunc ad radicem ferra solverunt homines, abjecto, ob fe-
rorem insuperabilem, cadavere. Gladium dimidio mino-
rem delineari curavimus, exhibitum Tab. I. f. 3.

Tab. I.
f. 3.

c. Quod secundum *Strachem* duplas rostro vulnere, & ex *Reland*;
quod nulli non autem sit, rostri duntaxat & mucrone acutissimo
rostri perforare quod de pisce Bartholi dicti fides, *Reland* II. §. 2. *Strach*
Sic *Opilatus* mucrone carinam stat penetrant; & *Opilatus* Xi-
phias autem latera ad squamularum alveolus perforare. Sed
de hoc ex tabula relatio est, quam a viro quodam ducta & fide digna
acceptam tradit *Generius*; quod *Xiphias* juxta naturam naturam
videtur, medium ab hoc pisce rostro deli. f. 3.

3. *Xiphie*, ex nigredine albis Zonis variegatus. Ab omnibus
cora facie diversus, & a nemine auctorum vel pictus vel de-
scriptus; gladio triangulari & maxime decilvi; dorso ar-
curato; tribus pinnis singularibus instructus, fortior ocula-
tis, demta cauda coriacea, lunata; Tab. III. f. 1. Prima
c. 2. pinna III. f. 3.

B. Ore fissio
XIPHIAS.

pinna in summo dorso ex sex aculeis constat membrana conjunctis; altera ventralis sub branchiis ortum trahens, triangularis, septem aculeis; tercia octo radiis post animum; branchialibus carens. Operculum branchiarum osseum, ex argento resplendens, striatum, conchae vel pectunculi forme collare hystionis, qui Scaramuzza, quadammodo refertur. In mari verius os vitulæ caput, & a præfato Niedenrhaffio ad vivum pictus; excrementibus a gladio ad caudam usque æquavit pedes X & VIII pollices danticanos. Xiphias rarissimus nondum exhibitus d).

d) *pandus Jovius cap. P.* Xiphias in genere seu raris esse piscis ait, sic enim: „Xiphii hostitate de presso Jovis ferus sunt æquales, verum hac litora raris adeunt, veluti qui perpetuis moris æstibus, non in fæto acido Siculo, gaudent videntur, propterea Xiphii infirma, ut in aliis fuit piscibus, *piscaria non capiuntur*, quod veluti videtur hystionis nihil esse conquirenti, c). Dolomieu, figura piscium, quos fieri solet P. Jovius litoris res depicturus nunciat *Barbuletum in auro*, Xiphias *Crot. II. Obs. 271* „Alena hystion piscis colubæ *Græcorum*, sed raris, quia ipsam nunquam viderunt; melius colere depingunt *Aletrianus & Jovianus*, sed nec ipsi accurate scita omnia, n

4. Xiphias gladio excavato in conum acutum productum (quasi *hobit Stoptinger*) pinna, nō fallat imago, *fax*, *Salviani & Willughbi* e); septem pinna *Aldrovandi*; ventre argenteo, tergo ex cineracco nigricante; ore, prout superiores tres, edentula f).

e) *Græcorum* Salviani figuram elegantissimam vocat; nescio, quia fiduciam, quod nunquam videret Xiphiam *Græcorum*; valde dubitamus, quod nunquam piscis esse formam, quam exhibet *Aldrovandus*.

f) *Barbuletum* Risi Xiphias, in porta Ithacensis caput invenit dentes in pilato interiori medio, palam vestitus, sagulatus, non bene videri, utrumque tres aculeos, barbam edentulam, quod nullum signum deditit. *vid. plat. anat. ed. L. p. 184.*

5. Xiphias lata, longæque per integrum dorsum pinna; in ventre duobus beccis fornicibus corporibus nigris, duris plane ut os *lapie*; ore edentulo. *Guebucur Brasili. Marggravii* Xiphias affinis; *Lafraam*; Bicuda *Willughbi* p. 163. Tab. 3.

B. Ore fissio
XIPHIAS.

27. f. 1. capite porcino, rostro acuto, osse, duro; partis superiores longitudine 16 digit. inferiores vero decem digit. *conf. Append. ad Willughbi. p. 3. Tab. 3. n. 6:* de Zee - Saip; beccasse de la mer; præter eandem, ab illo diversam, est idem piscis *Guebucur*.

6. Xiphias, rostro superiore ensi filculo simili; acus minor *Bel. p. 164. Willughbi. Tab. P. 2. f. 3.*

Notandum. Habet *Artedus* Goregonum maxilla superiore longiore, conica, quem albulis & Thymallus associavit; qui *Oxyrinchus Rondelleti & altorum*; *Willughbi* p. 187. Tab. N. 1. f. 3. Si verum est, hunc piscem habere tres pinas dorsales, non erit hujus loci; audiamus *Rondelletum de Pif. Parte altera p. 165:* Sunt in maximo *Caspie lacu* *Oxyrinchi*, ab acuitate rostri truncati, magnitudine octo cubitarum. Eos *Caspium* capros distrahunt & mari conductos atque exliccatos vendunt, simul etiam adipsa cetraclo, terminis ex eis conficiunt &c. — Alius est *Nili* alumnus. — Alius *maris rubri*. — Alius *Oxyrinchus* dictus *Astrucopie* crebro cernitur. & *Havini* appellatur. Pinna in dorso tres habet, inæquali ipso a se distantes; totidem in ventre habet quos barbati, *figure & Rondelleti & Willughbi* tres dorsales exhibent, licet *Willughbi* non nisi duarum dorsaliū mentionem faciat; hic est *Regonius Artedi*. Ambigui, ad quam classem *oxyrinchus* referendus sit, quod piscem talem nunquam vidimus, nec de figura *Willughbi* certiores facti, suspensus maneat, ob incertam, ut audivimus, *oxyrinchorum* historiam.

§. X.

Mandibula inferiori ultra superiorem producta.

MASTACEMBELUS; a *μασ* & *μαβου*, figura vel holla missilis; rostro in sagittam excavato; & integrum piscem terrem capite rostro non inepte hæcæ nullum nullum dixeris, unde *Salviani* *Βλαβου* audit, f. verum, cum non inepte piscis a rostro cui formi *Xiphias* vel *Gladia* vocatur.

1. *Mastacembelus*, mandibulis longissimis, tenuibus, acutissime denticulatis, quarum ramus inferior antecedit superiori.

Acus, *capitulum* variegis *Coppiani*, *Adrens. Lib. I. cap. 29*; *Ende-
lar. Salviani*; *Apollinis* c. m. mucro *areolaris*, the *Hornfish* of
Garfish, *Willughb. p. 231*. *Tab. F. z. rostrum cuspidatum, gracilius,*
capitulum *Salviani* *fig. 68*. *Elois* a. rostrum cuspidatum, gracilius,
subterfretis & *ipiharmali*, *Arctidi* (sub eodem ordine) *Arctidi*
elois, qui auctor: *Elois* rostrum plagiopodum. *Est* pectus *gracili-*
us, longus, ventre quodammodo fissili, totum splendens
quali argenteus; *nebristatus*: Schneffeli; pinnis flexi; duobus
foramen branchialibus, coridem ventralibus ante aures; quatuor
pone foramen excrementorum amplum; qui oppositur fupur
qualiter longa pinna flexa; accuratam figuram vid. *Tab.*
III. f. 2.

Tib.
L. 52.

2. *Mastacembelus* corpore tereti, maculoso, quod linea viridis media secundum longitudinem dividit; inferiori mandibula in speculum longum producta; Elefants-neufe; Willdgbb. opp. p. 4. Tab. 6. f. 4.

e) Vid. §ph. seq. in notis.

§. XL.

Utraque mandibula æqualiter rostratus.

PSALISOSTOMUS; rostro forcipato longo; ψαλῖς, forceps & στόμα, os. Ore denticulari; a similitudine forcipis, quo Chirurgi utuntur in altis vulncribus, rostrum forcipatum dicitur.

1. *Fsalioglossus*; omnium innoximus, ad tres pedes excresecens; squamis ocellis quadratis, obliquis, opus quali foliaceum pulchrum constans; a dorso ad medium ventrem viridis, ventre pallide rubro; sex pinis infrastratis: duabus laterali-bus, in ventre & ad aumum unica; quinta caudæ proxima, qui opposita est sexta; cauda ovali. (Acus maxima, squa-mola, viridis; the Green Gar-fish;) *Catesby* *Tom. II. p. 30.*
2. *Fsalioglossus*; ad priorem proximè accedens; an idem? *Acus maxima squamola Lysteri Willughbb. app. p. 22. Tab. P. S. f. 2.*
inferior

B. Ore fido

PSALISOSTOMUS.

Inferior mandibula Listero ad sex digitos longa, superior paulo longior visa; sed forte, quod piscem ficeant habuit Listerus, inferior mandibula paulo brevior apparuit, cum apud Catebejan omnia aequaliter in rostrum exeunt, imo nec in figura Willughbeji differentia notabilis mandibulorum sub oculos venit. Elōx a) maxilla superiore longiore, cauda quadrata, Arctedi.

- [illegible]

3. *Pfalzstomus* ventre & cauda purpureis. Naedelnish; *Acus pultis Willughbijsi* app. p. 2. Tab. 3. f. 2. ibi pag. 2: ab aculeo non video, quid differat, nisi ventris & caudae colore purpureo.
4. *Pfalzstomus* quadripennis; unica post anum longa, cui brevior opposita in extremo dorso; duabus lateralibus; *Acus Gessneri*, qui figuram ventris accepit. Aldrov. pag. 108.

§ XII.

C. Ore in rostri tubulosi extremitate.

SOLENOSTOMUS σ Σολῆς, tubus & Στόμα os. *Caput* rostrum prope idia tubulosum, quod ne dixerim *cap Ardeo*, collare ex mandibulis congeris, hi aculeare praelatus naturam, commisisse errorem. The extrusitate aperituram habet, vel *os finium*, instructum opereculo parti inferiori adnato, quod sursum artrothur ad elaudendum, demittitur ud aperiendum, vel, ut scribit *Salvianus* f. 68. *opus* quidem rectus non in

CPL 15-

C. Ore in rostri tubulosi extremitate
SOLENOSTOMUS.

transversum sed in altitudinem dehiscit. Extremum itaque oris firmi & operculum officina mandibularum pisci præstant. Opercula branchiarum sunt tenuissime lamellæ membranaceæ; pinnae laterales in nonnullis præ tenuitate vix exprimentur, quod & reliquæ pinnulae tenues sunt a). Cauda in quibusdam apertis & teres, in plerisque pinnata, in unico, qui sequitur, spina est serrata supra caudam.

a) Vide tamen *Olearii* Gotschoff, *Kunff*, *Zammer* Tab. P. 111, f. r. ubi & opercula branchiarum & ipse branchia cum pinna lateralibus di Rudin & expōitō sunt. Sic *trypacium* nom. 12. *ABP* 111. §. 373. branchia caudæ & *Solenostomus*, branchia apertis, intercedit parallelum, quatuor *ambrosia* et in rostri tubulosi extremitate. *Solenostomus* habent branchia quatuor. Vid. *Albu*, p. 104.

1. *Solenostomus*; rostro tridentem totius piscis æquante; plicæ vix quatuor digitos longo. *Scolopax Rondel. Albu*. *Grenier*. *Trombetta* i. c. ruba *Gemmus*. *Sohera* i. c. foliis, ob similitudinem, *Roman*. The Trumpet of Bellowfish *Angl.* Balides aculeis binis loco pinnarum ventralium & solitario infra anum, *Artedi*. Ad branchias pinnatus; in ventre caret pinnis, sed pinnarum imitamenta habet in binos oculos velut domoscellos ciliatā. Retro anum pinna est; in dorso duæ, situ singulares; anterior, potius spina, inferius serrata, mobilis. Reliqua apud *Willughb.* p. 161. Tab. F. 25. f. 2. & *Rondeler*.

2. *Solenostomus*; in medio corpore hexagonus; a pedice ad pinnam usque quadratus; exiguis pinnis ad branchias, alia in medio dorsi, vix conspicuis, nisi in aqua moveatur piscis; serpentum more integrum corio pulchre cælaro & duro. Acus secunda species *Rondeler*, *Gesneri*. Typhle b) five Typhlino antiquorum *Beloni*; Cæcia *Sittardi*, *Gesneri*; *Willughb.* p. 157. Tab. F. 25; pullos infra se excludit; prout reliqui. Syngnathus corpore medio Hexagono, cauda pinnata, *Artedi*.

b) De hoc nomine vid. *Willughb.* p. 159.

3. *Solenostomus*, a capite ad caudam heptagonus, præcedenti major; acus *Aristot.* species altera major, *Willughb.* p. 159. Syngnathus corpore medio heptagono, cauda pinnata, *Artedi*.

C. Ore in rostri tubulosi extremitate.
SOLENOSTOMUS.

terti, qui observavit quadrangularem ab ano ad ciudam; *Willughb.* autem, quod fit ab ano ad finem pinnae dorsalis pentagonus, infra ad caudæ pinnam usque quadratus c).

c) Putat *Aræus* incusuram numerum in Syngnathi genere omnino esse observandum; verum in omnibus id fieri non posse, immo in multis aliis præbere solum quilibet deprehendit, qui vel figurat; quæ deducit accuratè, tenet dignatur; forte in *hippocampus* hanc curam non male locatam dixeris: ad hunc piscem branchia accipit ad Syngnathos non numerandum esse in *Albu* 111. & in hoc *Albu* *Opera*, modis; Sileo quod potius callus, quam incusuram deprehendit in *hippocampus*. Sic, *Solenostomus* plerique, sic ducit amicos, non habent utilitatem, sed eadem notentur, quadrat figurat sepius pictam, vel multitudine variegatam. Et quid tum? Si numeraverit incusuram in terrestri aliove lumbico, vel in polypo aquæ dulcis.

4. *Solenostomus*, cute glabra coloris hepatici; maculis caeruleis, quæ intercedunt viridescentes; inferius albescens; caput a fac branchiarum ad rostri extremum unius pedis & unius pollicis; ore edentulo. Petiambulo *Brasili. Maragravi*. The Tobacopype fish *Willughb.* p. 233. Tab. P. 6. f. 4; octo pinnis instructus, extrema cauda spinosa. Alium *Lillier* vide apud *Willughb.* in app. pag. 22. Tab. P. 8. Acum scilicet rostro cranio, osse, ungulato, i. c. Petiambulo *Brasili*: plane diverium ab illo, cauda pinnata.

5. *Solenostomus*; coloris fusci, pinnis dorsatibus tribus, quibus exacte respondent ventrales tres, cauda ad crura utrinque pinnata & in Scuticalem longam excurrit; rubulo tres pollicis longo. Alter Petiambulo, vel tertius; five varietas præcedentis. Petiambulo, the Tobaco-pipe fish *Carebiji* Tom. II. p. 17, Jamaicensis.

6. *Solenostomus* Indis orientalis, corpore sexangulari, cranio elato & acuto, corio flavescente ex quadratulis simplicibus composito, ad branchias pinnatus; tertio in medio fere dorso pinna unciali, quæ brevi, illi opposita in ventre scilicet; cauda in acutum terminante. Tab. IV. f. 1.

7. *Solenostomus*; unica longa pinna in dorso; sexangularis; cauda longa in exitu pinnata; corpore denticulato. Acus marina

T. II.
IV. C.

C. Ore in rostri tubulo extremitate

SOLENOSTOMUS.

rina amboventris uodique spinosa. *Rorychii Thes. Anim. 1. Tab. II. fig. 11.*

Tab.
IV. f. 1.

8. *Solenostomus*: indicus, productiori rostro quam fectus, corpore quadratus denticulatis asperis; ad branchias pinnatus; ceterum apertis. *Tab. IV. fig. 2.*

C. 3.

9. *Solenostomus* indicus, gracilis; dorso viridescens; tripianis; ad branchias duabus pinnis, tertia triangulari in dorso extremo, cauda recti apini. *Tab. IV. f. 3.*

C. 4.

10. *Solenostomus*, quatuor pinnis, præter caudam falcatam; ad branchias duabus, tertia triangulari in dorso, quarta post. anum. *Tab. IV. f. 4.*

f. 5.

11. *Solenostomus* brevis; corpore ventricoso; capite caudaque falcatis, gracilibus; quinque pinnis donatus; duabus branchialibus; tertia dorsali intermedia quarta & quinta ventralium, aut & pone foramen excretorium. *Tab. IV. f. 5.*

Tab. V
f. 1. a. b.

12. *Solenostomus* maris baltici; fuscus; transversalibus lineis albis infectiones nectentibus; ventricosus; post branchiales unica pinna dorsali, humili, instructus; cauda recti, apini. *Tab. V. f. 1. a. pronus; f. b. semisupinus; ventre scissili, qualis in omnibus appar.*

f. 2. a. b.

13. *Solenostomus* maris baltici, ex fusco variegatus, angulosus; medio ventre versus caudam scissili, versus caput teres; pinna præter branchiales unica in medio dorso supra anum, unciali & humili; cauda gracili in pinnam plumosam desinente. *Tab. V. f. 2. a. pronus; f. b. semisupinus.*

f. 3.

14. *Solenostomus* angulosus; gracilior precedenti; pinna in medio dorso unciali, sub qua in ventre imitamentum vel apophysis pinnaeformis ex tenuissimis quasi pilis confusa; in cauda cauda pinnula velut falcata, vel ad instar papaveris capituli; maris baltici. *Tab. V. f. 3.*

f. 4.

15. *Solenostomus* maris baltici, gracilis, variegatus, rostro brevis; ad branchias pinnatus, quæ pinnae non nisi in fluido distincte apparent; in dorso caudam versus pinna satis longa & deccrescente instructus; cauda opini. *Tab. V. f. 4.*

16. Sole.

C. Ore in rostri tubulo extremitate

SOLENOSTOMUS.

16. *Solenostomus* lumbrici formis nostras, tenuissimus, longissimus; præter pinnulas branchiales oculo armato detegendas, reliquis caret omnino; ex mari baltico, juxta litora Gothlandica cum præcedentibus. *Tab. V. f. 5.* Tab. V
f. 5.

17. *Solenostomus*, maris baltici; cauda a ventre interpolata, ad ejus ortum unica pinna dorsalis; sub mento apophysis acuta. Quorundam iuxta litus *Helenstam* appareat, certissimum prædictum fere, impensum imminere tempestatem; unde est, quod *Helenstam* audiat *Samuelis*, i. e. piscis procellam præsignans.

18. *Solenostomus* i. acutus lumbrici formis, aut serpentinus; acui *Aristotelis* coeogen pitecelus, pueris Cornubienibus: Scaddor i. e. vipera marini dictus, *Willughb. p. 166*; magnitudine pennæ corvinæ, raro anterior. *Syngnathus* teres, pinnis pectoralibus caudæque carens, *Artedi*; an idem cum *Solenostomo* isto. *Tab. V. f. 4.*

19. *Solenostomus* ex mari vegetabili vel viridi, *batavis*; Crofsee; badii coloris; albis lineis transversalibus variegatus; ventre brevi, scissili, triangulari; posteriori corpore recti; præter pinnas laterales ad anum, ubi desinit ventris, imitamentum pinnulae, diametraliter fere oppositum initio pinnae dorsalis laus longe & elevata, se ex albo & fusco picta; cauda pinnae simili modo variegata; ad amicum *Klitzevici* ex ind. s. reducere. *Batavis*, *Kauzbandje*, *Germ. Heft*, oder *Stran. d. Vind.* *Tab. VI. f. 1.* Tab.
VI. f. 1.

20. *Solenostomus*; minor precedenti; five varietas; gracilis; badii coloris; brunnis lineis transversalibus distinctus, ubi pinna dorsalis cum ventre desinit; ad anum in prona parte pinnulae imitamentum. Cauda pinnata. *Tab. VI. f. 2.* f. 2.

21. *Solenostomus*, minor & gracilior vigesimo. Imitamentum pinnae medio pinnae dorsalis oppositum; cauda pinnata. *Tab. VI. f. 3.* f. 3.

22. *Solenostomus* omnium minimus, gracillimus; differt a reliquis, quod præter pinnam dorsalem habet & ventrali longiorem, variegatam, quasi verrucosam; cauda pinnata. *Tab. VI. f. 4. d)* f. 4.

d. 2

d) Adipida

C. Ore in rostri tubulosis extremis
SOLENOSTOMUS.Tab.
VII. g.

d) Adhuc est in hac Tab. VI. figura res pisciculi, externa sive & ore quodammodo Ammodycti *Centri* in *parafysum*, p. 3. similia, pinnis tam ab illo directis, & quod ille teret, hic quadrangulis, ille argenteus, hic lateralis coloris; de quo tandem loco loco. Hic solum inspicimus, ut differentia appareat inter pisces, quorum *caput* cernitur, in casu apertis & angustis, brevissimum *mandibulis* oppositis. Si inter *solonostomus*, quorum eque rostrum *protrahit* *subulatum*, operculo singulis in eodem tubuli instructum. Ille itaque similesque ad eorum *Solenostomus* vocandi non sunt.

23. *Solenostomus* præter unam pinnam in dorso & caudam pinnatam, reliquis carens; piscis latus vel acus *Salviani* fol. 63. P. V. 11.

§. XIII.

D. Capite & cauda rostratus.

AMPHISILEN. Notum est, inter Angues dari, qui vocantur *Amphisilen* i. e. qui aurosum & rororum serpunt, latisque perperam genium caput, scilicet ante & pone habere dicuntur. Ad evitandam confusionem cum Angue, AMPHISILENEM (quo nomine *Albertus* utitur) vocamus piscem capite rostrato, posteriore corporis parte in eundem rostriformem rectum, unco aculeo in fine donato, exsurgens, sic pisciculus iure vulgari ante & pone rostratus erit non ante & pone natus (prout *Amphisilen*, serpens) considerari potest.

Tab.

Ipsum Piscem non vidi, figuram eius Tab. VI. f. 6. a pie defuncto Domino Linckio Lipsiensi nactus; & Cuius delecta vidua benevole individuum in liquido e Mulso Linckiano cum amicissimo Dn. L. M. D. communicavit, qui in gratiam historiae operam suam præstitit, ut curarius pisciculum nobis deteribere liceret.

Pisciculus in naturali magnitudine delineatus corpus habet complanatum, in medio a. sibi pellicidum, ex argenteo lutescens, & ubi sicut umbrarum apparet, ad solum colorem vergens; dorso leviter convexo; oculis æruleis; his vicina opercula branchiarum, ex duplici lamella ossa b, continua membrana superinducta; c. est transparentis musculus, pinnam lateralem d. dirigens, facit a lamella branchiostegæ dilatant, ut in intercapedine

D. Capite & cauda rostratus
AMPHISILEN.

capedine viscera, obscurius quidem, translucent. Rostrum capitis, a silium, superiori maxilla, in exitu quidem tenui, (si nulla in pisciculo ibidem lesio intercesserit) rostrum porcelli mentiens. Pone, ubi cauda piscibus esse solet, in linea recta cum rostro capitis, hinc simile rostrum (ex k) protenditur spiram, in aculeum aduncum, mediante articulatione B, exiens. Ex a ad β lamella tenuis, pellucida, in margine sinuata, extenditur: quæ densioribus, argentei coloris distinguitur striis, quasi spinule essent, membrana duplicata comprehendit, nec tamen elevare uritque, modo iuxta ventrem amplores, descriptæ, verius aceni lamellæ in cuspidem decrecentes; ex medio hujus aciei vel marginis undulati dependent velut ex bulbulo e. fete circiter oculo vel decem, argentei coloris; literæ f. g. h. indigitant pinnulas argenteas, quæ primo intuitu sterule discrete videntur, accuratius vero considerate membranæ filis invicem junctæ; ad hinc ram i. lamellæ (a. β.) utrinque sinus, non pinna, est. Ad medium pinnulam g. incurvate sine dorso continuo k. transiunt; ideoque vel ante vel pone hanc pinnulam anus, qui accuratius distingui nequit. In intersitibus membranz arcuatis & ventralibus oculis per puncta siliis transparent. Equivari piscium forte plures dantur species, huc usque vel neglectæ vel non cognitæ.

Superfunt alii pisces insolentes, nobis noti, quod insolenter sunt rostrati; hos vero tanquam natantia spectra suis relinquimus moribus, usque dum aliquando exstantia ad propria redeant diverticulo.

§. XIV.

FASCICULUS TERTIUS

Notabiliter plani & oculati.

Sunt pisces quasi compressi, *in plani*, qui fere æqualis habent latera, sive sint prout sive lupini projecti; & periperti; i. e. circum circa corpus plerumque pinnas habentes. Horum alii vel in altero latere, vel utrinque oculati. Morum alii in dextro latere, seu, ut loquuntur Willughbejus, a sinistra oris parte, alii in sinistro latere, seu a dextro oris parte oculati. A dextro latere duo genera, a sinistro

A. In dextro latere ocellatus.

I. SOLEA.

a) Omnes Soleae sunt corpore oblongo, altero latere albo, pinnae circa caudam, nullae tamen angulum formatas, bracteae confusae. Neque haec species supra squamis est.

Tab II
13.

2. Solea cota levis; vera ac genuinis Lingulae. Tange *Barras* piscis delicatulus; parte dextra, in qua ocellus, f. ca. Tab II f. 3. *Geymu*. Zange. *Danic*. Tunglederi; edentula. An *Arnoglossus*, quem vocat *Rondeletius*? Sive *Bagnoglossus* 12vis, quem multas quidem squamas tenuissimas sed statim deciduas habere dicit? an eadem cum praecedenti? vid. *Aldrov.* p. 235.

3. Solea, maculis rotundis, oculos referentibus. Solea oculata *Rondel.* Willughb. p. 100. Tab. F. 8. f. 4. Pegoutie *Massil.* a squamarum tenacitate ut arbitrat *Rondelet.* Edentula.

4. Solea, ore peramplio, squamata & dentata. Linguatula *Rome.* Poia *Bellonii.* Willughb. p. 104. *Pleuronectes* oculis a dextra, uno ad latus finitrum dentibus aculis, *Artedi* b).

b) Omnes, qui in dextro latere ocellati, anal caecum habent in finitro, & vice versa.

5. Solea parva; dodrantalem magnitudinem nunquam excedens; linea corpus dicimene ex squamis maioribus illis, quae in reliquo corpore, consistat. Lingula *Rondeletii*, *Geym.* Willughb. p. 102. Tab. F. 8. f. 1. Oculi male ad finitrum latus positi sunt; insuper pilcis monoculis pictus.

6. Solea, squamis rhomboidalibus magnis, lingua soluta; dentibus serratis. Citharus *Rondelet.* *Linn.* *Rome* satis frequens.

7. Solea fusca, fomiculiculis cyaneis, quorum extremitates sibi invicem oppositae figura circuli interrupti; punctis quoque cyaneis eleganter picta; spinis pinnarum validis; Solea lunata & punctata, *Gasterbeij* P. II. p. 27.

8. Solea squamis in dextro latere griseis, parvis. Aramaca *Brasyl.* Lingua & vulgo *Cubricumta Lusitan.* *Margravis* p. 181. Willughb. Tab. F. 8. f. 6.

§. XVI.

II. PASSER. Caput productius habet, quam Solea & Rhombus (p. XIV.)

1. Passer

A. In dextro latere ocellatus.

II. PASSER.

1. Passer, cute densis tuberculis sive papulis scabra; in dextro latere & in pinnis maculis flavicentibus notatus. Nostribus stricte: Flunder. Passer *Bellon.* *Plage Gall.* a *Plais Angl.* *Quadraculus Rondelet.* *Placis Algoni* (Placis vid. num. 5.) Prona parte, ubi oculi, fuscis, maculis rotundis ex flavo miniatis picta, quibus & pinnae aspergantur; latus supinum album, carne in lamina undulata disposita, squamis exiguis, cuti tenaciter inhererentibus; Willughb. p. 96. Tab. F. 3. a) Rhombus levis marinus *Schoneveld.* *Pleuronectes* oculis a dextris; linea laterali aspera; spinulis lupine ad radices pinnarum, dentibus obtusis, *Artedi.* Accuratam figuram tradimus in Tab. VII. f. 1; varietatem Tab. VII. f. 4.

a) An idem, quem vidit Willughb. p. 98. inter passeres fluviales? colore olivaceo, qui maculis flavicentibus cum in corpore tum in pinnis ambiendis habeat — Apud *Geddes* nullas passeres fluviales est.

2. Passer quatuor cubitos longus; unde dicitur Hippoglossus i. e. *Buglossus maximus, Rondelet.* *Geym.* *Aldrov.* *Holius Angli meridion.* & *septentr.* Turbot b). Succis *Haly-flundra.* *Pleuronectes* oculis a dextris, rotus glaber, *Artedi.*

b) Turbot, qui *Terrebot Gleditsii*, Rhombus accensendus, quod oculos habet in finitra parte.

3. Passer sordidi coloris; interdum fuscus vel marmoratus levis obicrioribus; pro varietate passeris primi agnoscimus hunc piscem, maculis flavicentibus Tab. VII. f. 7. a cren. Tab. VII. f. 7. Flex vel *Flexus Bellonii.* Passeris tertia species *Rondeletii.* *Geym.* a *Flounder* or *Fliche Willughb.* p. 98. Tab. F. 3. *Schoneveld.* species *Schoneveld.*

4. Passer asper sive squamosus *Rondelet.* Passeri primo squamis cougener, sed maculis crenis; *Gallus:* *Limande.* *Anglis:* a *Dab.* Willughb. p. 98. Tab. F. 3. videtur altera varietas passeris primi. *Grece* sive *Kleithre, Schoneveld.* *Pleuronectes*, oculis a dextra, squamis asperis, spina ad anum, dentibus obtusis, *Artedi.*

5. Passer, in dextro squamis valde exiguis, albicans, a sinistra albusissimus,

A. In dextro latere oculus.

II. PASSER.

T. VII
E 1.
E 2.

albissimus, levissimus. *Noftrathus*: Blareus; Plateis; Playeyfus, ab instrumento five theca orichalcea, cui immittitur ferrum candens, ad plananda lineas ornatus mulieris; Tab. VII. f. 2. Ad. Struſsbute, Platen, *Schweidlich*? Rhombus non aculeatus, squamulos; Lug. aleat. *Cornub. Willgbb.* pag. 95. Tab. F. 1. Hunc *Artedus* forte accensendum putat pleuronectidi oculis a sinistra; corpore glabro; verum secundum *Willgbb.* huic pisci oculi sunt in dextro latere, ad sinistram oris huius ideoque passer non Rhombus est. Apud nos frequentissimus.

E 3.

6. *Passer*, ex obscure cinereo marmoratus in dextro latere hinc inde maculis leviter flavicantibus; in altero latere albicante magis flavis; mandibulum inferiorem duplo longiorem habens superiori, fereque os retinuum; *Noftrathus* Schollet; an, passer ex rubello colore obscure cineritius *Schneuwelz*; vid. Tab. VII. f. 3.

7. *Passer* lineis transversis notatus; The Flounder Dni. Hans Joane fr. *Jamaic.* vol. II. p. 277. Tab. 246. corpore albo, lineis 6 vel 7 nigris transversis, longitudinalem lineam fecantibus; vid. *Raji Syn. Pisc.* p. 157. a Sole de Braille, of an *Anonymous Portugal* apud *Purchas Lib. 7. cap. 1.*

8. *Passer*, oculis protuberantibus & fere sibi contiguus, intercedente ore angusto; leviss, maculis nigris; Cornubiensis; *Raji Syn. p. 162.* Putat autem Rhombum esse, cum revera passer sit. A Kitt *Cornub.* vid. *ibid.* f. 1.

9. *Passer* alter, cute dura & aspera; oris magno hiatus; a Whieff *Cornub. Raji. ib. p. 163. fig. 2.* Coloris ferdie cinerei, circulis & quadratis per puncta pictis.

§. XVII

B. In sinistro latere oculus.

RHOMBUS.

T. VIII
E 1.
E 2.
E 3.

1. *Rhombus* aculeatus, nigricans, maculis obscuris fuscis in pronas parte; in altero latere ex olivaceo & albo creruleis; resupinatus pictus Tab. VIII. f. 1. pronus projectus Tab. IX. f. 1. Rhombus aculeatus *Rondeletii Germ. Aldrov.* Rhombus *Vener.* Pleuronectus oculis a sinistra, linea laterali in

B. In sinistro latere oculus

RHOMBUS.

in sinistra parte tantum aculeata, *Artedi*; vide tamen figuras nostras. *Willgbb.* p. 93. Tab. F. 2. f. 3. Stenbunt, Trencbunt *Schoneo.* p. 66. *Dontjeonis* Stenbontie.

2. *Rhombus* cineritius, aculeis aperrimis, inferiori mandibula superiore, quâ dimidium fere, excedente, pinnis & cauda T. VII
E 2.
fulcis maculis variegatis. Tab. VIII. f. 2.

3. *Rhombus* maximus, colore profunde cineritio super flavo variegatus; dextro latere, quod Rhombus cuspium est, albus, & maculis quasi dendriticis pictus. Rhombus asper, maximus, non squamulos; *Angl. merid.* a Turbot; *Septent.* a Brets. *Willgbb.* p. 94. *Raji Syn. p. 31.* Geden. Theob. T. VII
E 3.
bot; Tab. VIII. f. 3. 4. pronus & supinus. Pleuronectus oculis a sinistra, corpore aspero? Rhombus squamulos *Charlet.* p. 145. *Artedi.*

4. *Rhombus* o unum unum, palum longitudine. Rhomboides, *Konh. in: Grm. W. ill. lib. p. 96.* Tab. F. 3. f. 2. Rigische Botten, qui siccat; Gedsium comportantur.

§. XVIII

C. Utrinqve oculus. Picesiani oculati figura vel ad Rhombos vel ad Passeres, vel ad Soleas accedunt: corpore quasi compresso, & circum circa plus minus cuneilato; pinnis caudaque variis; ano, respectu corporis attenuati, magis minusve capiti proximi. Audiant nobis I. RHOMBOTIDES a). II. TETRAGONOPTRUS, b). III. PLATYGLOSSUS, c).

a) A *ῥήμβωτις*, Rhombi figuram habens: ne dicamus *Rhombotides*, quod vocabulum cum *Artedi* negre statum. Quod vero nec *Rhombotides* celebrandum videtur, notandum utrum notum EUROPI, quod *Cramer* est *Euphrates* *apud* *Europam*, vel ubi quatuor affluunt, quod collatet quoniam minus dixerit PSETTAM quod quod dicitur propriis nomine vobis latine audit: RHOMBUS? *ῥήμβωτις* τῶν ῥήμβων, pices, qui specie sunt Rhomboides. Dicitur hinc a capite ad caudam corporis pars dorsalis notabiliter accedens prout in *Rhombus* & amplior apparet ventrali corporis parte.

b. *Τετραγωνόπτερος*, i. e. quadrilaterus *apud* *Europam*.

c. *πλατύγλωσσος*, i. e. *apud* *Europam* *lingua lata*.

E 2

§. XIX.

§. XIX.

C. Utrique oculus

I. RHOMBOTIDES vel, si mavis, EUROPUS: PSETTA

1. *Rhombotides*, obscure ceruleus; pinna crassaque lunata intente ceruleis cyaneis; ore singulari, parvo, edentulo; ad orum enoda habet utrinque aculeum mobilem; *Catesbeji* *Tonn. II. p. 20.* *Turdus rhomboidalis*; vide infra *Platyglisum grun.*
2. *Rhombotides* viridis pfitaci coloris; pinnis branchialibus, gutturali & cauda aurantiis; dorsali & ventrali laeis, falciformibus, ad medium usque cyaneis; ceterum aurantiis; ante pinna in dorso & ventre aculei tres. An *Acarana* major pinna cornuta *Margravii*? the *Angelsih*, *Catesbeji* *Tonn. II. p. 31.*
3. *Rhombotides*; in nigricante corpore squamis flavis quasi lunatis. *Petu Brasil Margravii*; *Willughb. p. 217. Tab. O. 1. n. 2.* *Charodon niger*, maculis flavis lunulatis variis, *Arazu.*
4. *Rhombotides* ventre suberulco; corpore maculis fuscis variis; vix spithamum longus & latus, *Willughb. append. p. 2. Tab. 7. n. 2.* *Strom-vith*; pisces *Stereocarius*; addit *Rajus*; hunc ex eorum genere suspicor, qui in latus projecti nascantur, verum, in figura fallit, hinc oculorum utrinque repaginas; omnes enim *Rhombotides* etiam si pisces plati & quasi compressi, nasant erecti; feli pisces, qui in alterutro latere oculati, in latus projecti nasant; vid. infra *Tetragnoptrum* undecimum.
5. *Rhombotides*, pinna dorsali 17 aculeis pertusis; zona lata, perpendiculariter oculos intercipiente; cuius latera obliquis lineis tenuibus 13 distincta sunt. *Tab. IX. f. 2.*
6. *Rhombotides*; cuius pinnam dorsalem radis conjunctis inornibus antecedunt 11 vel 12 aculei incurvi simplices; septem lineis arcuatis lateralibus; primo oculos intercipiente; postrema quatuor in pinnas excurrentibus. *Tab. IX. f. 3.*
7. *Rhombotides* ore exserto dentatus; decem vel 11 aculeis recurvis pinnam dorsalem tranſſecantibus; squamis laeis; unica zona obliqua caput ad oculos utrinque secante. *Tab. X. f. 1.*

§. Rhom-

T. IX.
f. 2.

f. 3.

T. X.
f. 1.

C. Utrique oculus

I. RHOMBOTIDES.

8. *Rhombotides* dentatus; capite magis contracto; oculis in medio zonæ unice obliquis; 17 aculeis curvis incurvis in pinna dorsali eminentibus; squamis laeis. *Tab. X. f. 2.* T. X. f. 1.
9. *Rhombotides* ore brevi edentulus; unica zona lata recta, in qua oculi, caput dividente; quatuor priores aculei pinnæ dorsalis eminent; squamis parvis, cuius latera multoties lineis argenteis longitudinalibus picta; cauda in exitu filamentosa. *Tab. X. f. 3.* f. 1.
10. *Rhombotides* edentulus; exprorecto capite per zonam nigram latam & curvatam diviso; squamis quadratis sulphureis; in lateribus due picture late incurve, badii coloris; aculeis 10 rectis pinnam dorsalem in anteriore parte perforantibus; cauda in exitu filamentosa. *Tab. X. f. 4.* f. 4.
11. *Rhombotides*, fasciis umbratilibus, laeviusculis, tribus; pinna dorsali & ventrali o medio corporis oriundis. *Tab. XI. f. 1.* f. 1.
12. *Rhombotides* duabus fasciis obliquis, latissimis, piscem in tres partes dividit; tribus vel quatuor radis in pinna dorsali excurrentibus. *Tab. XI. f. 2.* f. 1.
13. *Rhombotides* parvus, ad orum caudæ, in medio latere & ad oculos fasciis tribus divaricatus. *Tab. XI. f. 3.* f. 3.
14. *Rhombotides*, dorso valde arcuato; planus & latus; veluti pascor majori; cute glabra, cauda lata, dorso fusco maculis albis vario. Latere ad ventrem candidiora & striata; *Klip-vith Willughb. append. p. 7.*

§. XX.

II. TETRAGONOPTRUS (§. XVIII.). Ducta linea a capite ad caudam corpus in duas partes dividitur propemodum æqualiter.

1. *Tetragnoptrus*, super squamis argenteis, tribus zonis ex fusco fuscis, variis. *Tab. XI. f. 4.* f. 4.
2. *Tetragnoptrus* lavis, ad caudam bruna macula circulari intra eandem albicantem, ophthalmos; simili zona obliqua oculis

c 3

C. Utrinqve oculus.

II. TETRAGONOPTRUS.

T. XI.
h. 1. los excipiente; corpore, ex astantio albicante & leviter fusco, vario. Tab. XI. f. 5. conferatur Rayfishi plicis militaris Theatr. Animal. I. Tab. II. B. macula supra caudam; zona cinctus.

3. *Tetragonopterus* parvus, dilute cinerascens, squamulis perexiguus. Tab. XI. f. 6.

4. *Tetragonopterus* cinereus, levis, pinnis nigricantibus. Tab. XI. f. 7.

5. *Tetragonopterus* cinereus, levis; ad caudam zona cinerica, nigra lineis obliquis decemprae; altera in medio latere ex albo var. i. similibus lineis, tota fere, caput a reliquo corpore separante; pinnis dorsali interrupta. Tab. XI. f. 8.

6. *Tetragonopterus*; densa cauda fere ovalis versus caput, inferiori mandibula barbeatus; plicis squamis parvis, rotis coloris; sub obliquis ductibus latis, badii coloris; operculis branchiarum ceruleiscentibus. Tab. XI. f. 9.

7. *Tetragonopterus*, squamulis plicisque coloris ad instar bombycini, splendidis nigris; circa os linea crassa purpurea, duplici; corpore lato & compresso quatuor digitos longo; tres lito; Cusperua Brasili. *Maregravi* p. 145. Willughb. Tab. O. I. f. 43. pinnis in dorso & ventre longis ac latis, antecedentibus in funiculos, quos vocat *Maregravius*, excurrentibus. Conferatur *Maregravi* Cusperua Brasiliensis p. 178. cuius descriptio fere eadem est.

8. *Tetragonopterus* rotus argenteus; corporis figura praecedenti similis; levissimus; pinnis dorsali & ventrali simplicibus, Tab. absque filamentis; plicis admodum compressis. Tab. XII. f. 1. Conferatur Rayfishi pliciculus, Abacania Brasili dictus, Theatr. Animal. I. Tab. II. f. 1. E. radis pinnae dorsalis, albus forte, excurrentibus.

9. *Tetragonopterus* levissimus, rotus coloris argentei uti praecedens; praeter duo fila longa in ventre & uicem ex pinnis dorsali oriundum, nigra; Abacania Brasili. Peixe Gallo Lufitano. *Maregravi* p. 161. Willughb. p. 295. Tab. S. 18 & app. p. 3. Zous cauda bituata Ariadi.

IO. Te.

C. Utrinqve oculus.

II. TETRAGONOPTRUS.

10. *Tetragonopterus*, dorsali & ventrali pinnis longitudinem corporis aequantibus; gutturalibus pariter longis, filiciformibus; Sci Batt Belgis. an ex Acanthis? a pictoris archetypis D. Jacobi Frazer, Willughb. Tab. O. 7. alium vide ibid. App. p. 3. Meerhahn Tab. 7. f. 1. utique ex Acanthis est plicis.

11. *Tetragonopterus*; capite amplo, ad latera valde compresso, oris hiarumini; latera olivacea colore ex creulo albicante variegata; in medio utriusque lateris macula nigra; squamis parvis; dentatus. Faber, sive gallus marinus *Haendeler Geineri*. Faber Aldrovandi Lib. I. cap. 25. Peixe di S. Pedro a) Venet. Salviani 75. Anglus: a Doree i. c. decoratus, a gallis nominis mutuo; Willughb. p. 294. Tab. S. 16. Plicis valde planis compressis admodum corpore, aequalis ubique crassitiei ad passerem figura accedens, verum cretius notat (prout annex plani utriusque oculati) non in latius reclinatus, ut passer; Willughb. p. 294.

a) Vid. *id.* t. 5. XXXII in fine. De hoc p. *Finchius Rem. Pige. cap. XXXII* line habet. Sapore prout de cingit, si esquis abstergetur, ipsi Rhombus persimilis. Nomine etiam Petri plicis vero Cusperua vocatur; gemini orbes in utroque latere pinnae linte impunctuam digitosus veligius habentem —. Diversa ergo est a plicis S. Petri, qui lapidis S. Petri fere *id.* Ergo duo plicis dupa nominis. Regis autem ex duobus statuerem utriusque *id.* S. Petri?

12. *Tetragonopterus*, ore parvo, dentato; pinnis dorsali ligulata ab anteriore parte. Faber marinus fere quadratus Da. Haas Sloane Ir. *Jaime*. II. 290. Tab. 251. f. 4. Ray. Syn. p. 106. The Pilottih.

13. *Tetragonopterus* magis laevis quam longus, densis ore & cauda; in mediis lacertis cineritis, carcerum ex fusco variegati coloris; pinnis ventralibus & branchialibus & cauda, falcatis, priores duo imprimis radii pinnae dorsalis conereri in longissimam ligulam attenuantur; ore exteriori & dentato. Tab. XII. f. 2.

XVII.
f. 2.

14. *Tetragonopterus*, tribus lineis latis; amplissima versus caudam, pinnas simul maculante; pinnis dorsali radu erentem

100

C. Utringve-oculatus.

11. TETRAGONOPTRUS.

sex concreti excurrunt; ore precedenti magis exserto & dentato. *Tab. XII. f. 3.*

- f. 3.

15. *Tetragonoprius*, anterioribus radiis pinnae dorsalis fere aequaliter cum capite & cauda exsertis; lineis amplis, badii coloris & cyaneis, varius. *Tab. XII. f. 4.*

III. PLATIGLOSSUS, (6. XXI.
(5. XVIII.)

5. 5.
5. 6.

1. *Platiglossus pinnatus*, squamulis levibus, quadricus, quasi recitatus; scutulis dorsali et ventrali flaccidis, fuscis; ciliis coloris sunt et branchiales, in medio albicantes; cauda obtusa et quasi mucilinea, se subterocens lineis laevis ad orum et in extremo notata; ore parvo, minutissimis dentibus instructo. *Tab. XII. f. 5.* Hic congener est *turdus* ad Institutum Ascension dictus, apud *Willenboeggum* app. p. 25. *Tab. X. f. 1.* colore ex viridi caeruleo ad dorsum et in mediis lateribus; ad infimum ventrem velut tres lineas rubefcentes habens, squamis quasi quadricus; ut reticulatus videatur.

2. *Platiglossus dilutiori* colore rufo; squamulis rhomboidilibus; capite ex flavo parum cinerascēte; cūjus coloris quoque spinæ laterales & gutturales; Dorsales & ventrales fuscidæ flavedine contrahunt, prout & cauda. Tab. XII, f. 6. An *Xanthurus indicus*, *Geelstraet* apud *Wiliughb.* app. p. 2. Tab. O. 3, f. 1. cūjus tamen pinnae rubent, & cauda falcata est; illius vero cauda quāsi abscissa vel mutila, instar coni truncati.

3. *Platiglossus*, squamulis nigricantibus, cauda bifida; pinnis, dorsali & ventrali, in postica corporis parte circiter pollicem latis. Acaena a) *Maregravi* p. 144. b) *Willughb.* Tab. O. 1. f. 3.

a) Vagum undique nomen: *Acaranthus*; panther vagum: *Gnapheria*; pro Synonymis tamen conservanda; ut intelligamus autorum nomenclaturam.

b) *Maregravius* ipsi tribuit aculeum (qualem habet *Tardus rhomboidalis* *Casterhoji* vld. *Rhomboides rannus*) in utroque latere ad caudam, scutellum, nec frustra queras aculeum in *Maregravi* figura, eam dedit.

4. *Plati-*

C. *Urringue oculatus*.

III. PLATIGLOSSUS.

4. *Platiglossus*, qui *Acarouna altera major Listeri* apud Willughb. in app. pag. 23. Tab. O. 3. f. 1. corporis figura Soleam referens, pinnæ utraque & dorsi & ventris in tenuissima filamenta corniculata, productis, ad branchias calcaribus exiguus.

5. *Platiglossus exiguus niger*; Zonis aliquot luteis pictus; Aca-
rauium exigua nigra, zonis luteis distincta; Willughb. app. p.
23. Tab. O. 3. f. 4.

6. XXII.

FASCICULUS QUARTUS.

In *Missa III*, vidimus *Hylrices* & *Caprisos* angularibus aculeis præditos habuimus quoniam *Cyraneyron* i. e. Struma vel corpore infuso laborem; quoniam *brachitis oculis*. Mlorum pedifigui sunt pice, *brachitis* autem sunt quæ sunt manifesti, vel *loricatis*, gemant, qui variat aut *corporati* sunt quæ sunt veterum variis locis, ricens, cataphraxis, thoraces hamatos & *inueniens*, pabos, canis, fides laxatas, clathratis, cancellatis vel *clausis* vel apertis vel eorum & quæ plures cognoscit sunt, non obicere representent, vel noceant aculeis, vel corpore quasi *hypos* tumescat appareat, hoc loco in corpore redigendi. Exhibet itaque *Falci-phra* d) vel *Corinthos* e) & *Centrif* f) qui sunt *Cyraneyron* g) vel *QVINTUS* h) completetur *Onices* i) & *Rebeuer* l).

a. *Oxypractes*, *Indicatus* vel notabiliter armatus; quod vocabulum in stricto sensu sumimus, quo sensu sumitur i. *Sens*, *XXIII* r. „de castis aerea su-
per caput eius; de lorica hamata inducitur, & apud *Barbarum*
L. III de Persarum equitibus caput vocat^{ur}.

b e. circumspecte animi munitio: καὶ ἐκείνους, corpore loricato &
capite galato. Sic Schenvelid, p. 391. novis nominibus ab accidente
... ἡ γὰρ ἐκείνους πρὸς τὴν ἀρετὴν ἀποκαταστάσεις εἰσὶν, in nova
rebus explicandis uti et in rebus recte utimus; quare = cataphrasis,
in nova et tota phrase, vocabatur,

c) Κόρυς, Galea, από τῆς ἡλικίας ῥινοειδούς, quod caput defendit; Is Cery-
sionet, Galea arcau, relinvo corpore, loco lorica, non nisi corio
granulato

- granulato (ad nut cinctu Colles) testis: ne *Galeatus* deamur, ad evadendam negotiorum cum *Galeis* piscibus, vel cum *Galeis*, qui species est *Lacera* filiozani apud *Pinnam* Lib. XXI. c. 17. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
- d) *A. neri*, pongo: ex autoritate *Thyphra*, qui pinguis, vel pinguetior, sive pilosus communiter *senilis* sutorum, *Cremifus* filitavit.
- e) *dypteryx*, tumefactus: sterco ut rictus omnibus corporibus aliusque pilosus adhaerens.
- f) *Echeneis* *Asiatica*, Lib. II. c. 4. cap. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Thoracati

I. CATAPHRACTUS.

1. *Cataphractus*, rostro refimo, quatuor scutulis munito; totius squamis offeis denticulatis cinctus; labis edentulis, alpeis tamen, faucibusque hirsis, *Scheneveldii* *Willughb.* p. 211. Tab. N. 6. A *Pogge*, *Anglia*. Cetus cirris plurimis, corpore octagono. *Artedi*. *Charltonius* de *diff. pisc.* p. 35. speciem *Ilurionis* esse autumat.
2. *Cataphractus*, in dorso, lateribus caudaque squamis scabris, cuius caput *Galei* scabra, osses, rectum, pectus & venter duntaxat nullo finit. *Cataphractus* *Brasilensis* *Mus. Soc. Reg. Willughb.* p. 212. Tab. N. 13. f. 3.

3. Cata-

Thoracati

I. CATAPHRACTUS.

3. *Cataphractus* congener *cataphractus* *Scheneveldii*; ore triangulo, auro, superiori mandibula recurvo; tripinnis; unica dorsali pinna praeditus, ventrali carens; maris *Baltici*. *Tab. XIII. f. 1. XIII. f. 1.*
4. *Cataphractus* totus horridus; ore rostrato; mandibulis quatuor forcipatis; *Lyra* a) *Bellon.* p. 209. *Pesces* *forca*, *Roman.* a *historico* rostro. *Molarnus*, vel *Mararnus*, *pescis* *armato*, quasi *maris* *armatus* *Maffi.* & *Gemm.* *Squamus* non habet, sed eorum loco osseorum vallo bene munitur, quae ossa dura, integra permanent pilice exsiccat. An, *Lyra* altera *Randele.* 111. f. 206. An idem cum *Cataphractus* *Geo?* Sic misere fallunt & figurae & descriptiones. *Trigla*, cirris plurimis, corpore octagono, *Artedi*.
- a) A cetero lo distere dicitur, quod hic terminus habet utrinque in lateribus (piscis in gutture) cirris, quos alii digitos alii appendices vocant, *Lyra* tantum ducit, *Bellon.* confertur *Charlton* ad. 1 p. 21.
5. *Cataphractus* barbatus, ore parvo edentulo. *Tamora* *Brasil.* *Soldido* *Luliran.* *Marcegravi.* *Willughb.* p. 211. Tab. N. 13. f. 61. pinna branchialis utrinque a latere protensa, firma inflexa cornu, digitum longa. Totum caput superius regitur testa dura inflexa clypei, & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis, transversalibus, squamulis corporibus compositis, iunctisque haec corpora per ambitum minutissime serrata, & tota lorica quadruplex ordine disposita est; coeunt nimirum partes lorice in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre.
6. *Cataphractus* rostro in duo cornua lata protenso; *Lyra* prior *Randele.* p. 208. *Alatro.* L. 2. c. 7. p. 146. *Organic* *Genia*; *Piper* i. c. *Tibicen* *Cornub.* *Willughb.* p. 282. Tab. S. f. 4. *Trigla* rostro longo ducancho maribus tubulosis, *Artedi*.
7. *Cataphractus*, rostro simplici supra os protenso; in dorso serrato tripinnis; anteriori ex quatuor arillis, media ex duabus, brevi membrana conjugatis; *Lyra* vel *Capone* *Salvian.* *Willughb.* Tab. S. 3. *Trigla* cirris plurimis, corpore octagono *Artedi*; cui idem est cum *Cataphractus* 43. nec habet nisi duos, ad summum tres cirros five digitos vel appendices utrinque; vide figuram *Salviani*.

f a

8. Ca-

Thoracati

I. CATAPHRACTUS.

8. *Cataphractus*, corpore brevi, digiti magnitudine, colore nigro b) squamis parvis serratis, oblique sitis. Mullus asper; Cavillone c) *Rondelet*, p. 296. porius cuculi species, *Willughb.* p. 279. Tab. S. 1. f. 2. *Albrevandus* p. 133. quadruplo majorem facit mullo imberbi, sequenti; *confer. Charleton*, p. 13.

9. *Cataphractus*, casside stellulis cæleta, cute aspera; aculeis pinnae dorsalis anterioris parum serratis d) nullus imberbis *Rondeletis* p. 295. porius cuculi species, *Willughb.* p. 278. Tab. S. 1. f. 1. colore rubro vid. *Charleton* all. l.

b) Placium cataphracti & Coryllone habent.

c) A clavigeris, qui Caville dicitur, simul habent.

d) Id quod in nostro alio piscis, præter illam, qui Sagittarius dicitur, observatur. Habet *Willughb.* p. 296. & alium mullum imberbem, Regem mullorum, Reth Trigla lautatum, nescit autem, cur ita vocetur a melleisibus. Trigla capite glabro, tota rubens, cutisque carnea, *Ardet*.

10. *Cataphractus* ocellis squamis hispide loricator, ventre serrato; octo aculeis validis in unicam pinnam dorsalem dispositis, præter pinnae laterales alius duobus longis simplicibus & appendicibus, alarum species gerens, & *quoniam*, simul volans; casside retro bifurcata & amplius sinum delatibens; appendices tres habet membranaceas quarum binæ pone oculos, tertia a gula dependet. Tab. XI V. f. 1. mullorum specie, *aurum*, cotus loricator, multi olim nostri. *Hirundo Cataphracti* Tom. II. Tab. 8, & Da. *Hans Sloan* Itin. Faun. l. p. 27 non sunt hujus loci.

11. *Cataphractus* squamulis eminentiis. c) duris & asperis; duobus pinnis dorsilibus; ventre laevi; quibus characteribus præcipue a precedente differt; *quoniam*. *Milvus Solitarius*, *Belloni* & *Albrevandus*. *Hirundo Rondelet*. *Rondelet* Romæ, *Volador* *Hisp.* *Valant* *Gall.* *Itin.* *Oppian.* *Itin.* *Plin.* *Falcone* in *Stellia* & *melita*. *The Flying Fish*, *Swallowfish*, *Kirefish* *Angl.* *Willughb.* p. 283. Tab. S. 6. Opercula branchiarum ocella ex Galea producta in longas & acutas pinna ultra utramque pin-

T. XIV
C 1.

L. 111

Thoracati

I. CATAPHRACTUS

nam lateralem procurrentes exeunt. Trigla capite parum aliculo, pinnula singulari ad pinna pectorales f) *Ardet*.

c) Quod in figura 3. *solitarius* vel *stellatus* esse deprehendimus.

d) Per pinnulas *Engulatus* intelligi auctor. Pinnae branchiales natantia reseruantur, & eas sunt amplius, quibus eiusmodi ostia velint, *Itin.* *Oppian.* *Itin.* *Plin.* *Falcone* in *Stellia* & *melita*. *The Flying Fish*, *Swallowfish*, *Kirefish* *Angl.* *Willughb.* p. 283. Tab. S. 6. Opercula branchiarum ocella ex Galea producta in longas & acutas pinna ultra utramque pin-

§ XXIV.

II. CORYSTION, sive Galeatus. Dicitur autem Galea vel Cassis pectus erulla ossis, validum ad instar cranii quodret; scabra; plerumque cuspidibus fortibus exornata & armata. Salicantur ejusmodi pices communis nomine cuculorum, cum quibus tamen sæpius confunduntur Cataphracti, Coraces, Hirundines, Melvi, Lyra. *Coryllones* sive galeati reliquum corpus corio granulato, non squamulis, Galearum more retentum habent; sicut ac Cataphracti.

1. *Coryllion*; corpore granulato & tribus, toridemque cauda latius obliquis variegato; plicis *epithymis*; ætærum cataphracti ideo similis. Tab. XI V. f. 2. T. XV
C 2.

2. *Coryllion*, ore lato, casside in sex aculeos eandem versus exeunte acutissimos; quodam reliquo; corio hispido; pinnis naturalibus caruleis, latis, quos antecedunt appendices, lineæ cili vel digiti tres utrinque; duobus pinnis dorsilibus aculeatis; unica longa post anum. Lucerna coccyx sive Cuculus *Belloni*. *Willughb.* Tab. S. 5. nobis. Tab. XI V. f. 3. Trigla parum blando rostro, linea laterali; ad eandem bifurca, *Ardet*. C 3.

3. *Coryllion* ventriculosus; ore simplici, denticulato; præter alas, duobus pinnis naturalibus, cum appendicibus, una digitorum, ventrali pinna longa post habita & duobus dorsilibus instructis. Corvus *Solitarius*. *Willughb.* Tab. S. 4. Trigla capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinna pectorales, *Ardet*.

f 3

C 4.

11. CRYSTION.

4. *Coryllion* venter coctus, ore denotato; alga superiorem mandibulam furca acuta supereminet; galeus. Cuculus *Salsmani*. Red-Gurnard Rochet *Willughb.* Tab. 5. f. 2. Trigla tota rubens, rostro parum bicorni, operculis brachiarum striatis, *Artedi*.
5. *Coryllion gracilis*: griseus; pinna ventrali carenti; duabus pinnis auricularibus rotundae brachia sua gaudens. Cuculus griseus, Gray Gurnard *Willughb.* Tab. 5. f. 1. Trigla varia, rostro diacantho, oculis geminis ad utrumque oculum, *Artedi*.
6. *Coryllion*, capite conico; in cuius specie truncato os parvum, quasi tubulolum; appendicibus tribus utrinque; duabus pinnis gularibus rotundae dorsalibus gaudens, nigra macula in antecetris; unica pinna ventrali, post min.
- Corax Rondeletii*. Tab. XIV. f. 4.
7. *Coryllion*, facie plana, sursum spectante: ore amplo in eadem incisi plentire, scissura perpendiculari. Calhomyus, vel *Uranocopus Aldrov.* & *Salsmani Rondeletii*. *Gener. Lucerne* & p. ex. pet. *Rosae & Vener* remque Bocca in Capto. *Willughb.* p. 287. Tab. 5. f. 3. Pinna, quae gularis esse solet, multo anterior quam branchiales ex adverso oculorum sita. Trachusius cirris nullis in maxilla inferiori, *Artedi*; quae descriptio non sufficit, ut cognosceres *Uranocopus*; vid. *Aldrov.* Lib. 2. cap. 51.
8. *Coryllion* 7ymo congener: capite crasso; ore rante amplo, edentulo; scissura ore perpendiculari. Nigri Brasili. Piscem Tab. II. f. 8. *Araucus maris Belgii Mercator*, *Willughb.* p. 287.
9. *Coryllion* simplici facie in unicum cuspidem retrorsum exeunte utrinque; cirris carenti. Draco f. *Araucus Flami*, *Rondeletii*. *Gener.* Draco marinus *Bellouii* f. *Araucus Flami*, *Aldrov.* Draco marinus & *Trachina Salsmani* utroque *Jes.* 71. *Willughb.* p. 287. Tab. 5. f. 4. Dracoonis species in *Willughb.* p. 289. Tab. 5. f. 6. f. 7. Trachusius maxilla inferiore longiore, cirris destituta, *Artedi*. Confer. *Char-*

T, XIV
144.

11. CORYSTION

leton p. 27. *Aldrovandus* tertium insuper & quartum atane-
um p. 250. 251. exhibet.

10. *Coryllion* pinna longissimis, partium aurei parvicornis argentei coloris; ventre lauto, plano, candido. Dracunculus Rondelst. Aldrov. qvi et aliam speciem tradit. Dracunculus Armeti species Gesneri, Willughb. p. 136. Conus pinnae caudae dorali alba, Ardeti. Quod secundum Rondelstum aquam, per foramina lupra caput, trahat & NB. per eadem iterum emittat, non dicitur; concedo prius, non posterius; sed emittit attractam aquam pout refrigerationem branchiarum (quas aureas esse ait) dicit peritit cuculi, quorum capita limili modo galeata sunt, iuxta aculeos caudam spectantes.
11. *Coryllion*, capite maximo & aculeis valde horrido; corpore perlongitudo; ore albo; coloris caudam liburondum gracilem; appendices habet utroque colore ex cinereo & fuceo varis. Annis circumspicis pinnae laterales duae, fere in circum. Nonnullorum ceteri & ambius pinnae laterales habent rubro, flavo mixto, variis. Tres differentias habentus quatuor & pinnae laterales diversimode ex rubro variegati. Scorpis Virginiae apud Willughb. Tab. X. 15. An Scorpis marinus Schomelzsch. p. 67. Tab. VI. Bonifae; ex Gleditsch vulgo: Seehahn, Gallus marinus, g. IX.
12. *Coryllion* totius ruber; apina pinna dorali, interrupta tantum digitis carinis; maculis interdum subobscuris variis; Scorpis minor Rondelst. Aldrov. Willughb. p. 331. Tab. X.
12. Scorpina tota rubens, ceteris plurimis aliis, Ardeti.
13. *Coryllion* ferdide flavescens, apina perum interrupta pinna dorali; caput crebris pinnis horridum & rugulom; appendicibus carens. Scorpis minor vel Scorpina Rondelst. Aldrov. Scorpina seu Scrofaeolus Salomani p. 94. & nates. Ardeti. Tab. X. 13. Scorpina pinnulis ad oculos

§. XXV.

§. XXV.

Thoracati

III. CENTRISCUS.

A. *Lavis armatoris*: Sunt aculeati vulgo, five pungitii vel punctores. Quatuor gaudent pinnis: duabus branchialibus, una post anum, ex adverso quartæ; an Cernua fluctilis, aculeis asperimus?

1. *Centrifusus* aculeis quindecim in dorso, retrorsum inclinat, discretis, nullaque membrana connexis: in medio ventre aculei duo ad latera averti, ad podicum unus. Aculeatus, vel pungitius marinus, longus, *Steindler*, *Existuer*, primum a *Schönweidli* descriptus & delineatus p. 10. Tab. IV. *Willughb.* p. 340. *Dub.* X. f. 2. aliis *Spinochia*. Gasteroflexus aculeis in dorso quindecim, *Artedi*.

7. XII
f. 4.
l. 5.

2. *Centrifusus* 3 duobus in dorso arcuato aculeis, totidem in ventre: Tab. XIII. f. 4. five tribus in dorso depresso, in ventre duobus, post anum sexco armatus: Tab. XIII. f. 5. *Zeidling*, *Edm.* *Stedehat* *neglat*. Innumeri quovis annis capiuntur, ex quibus *Nehringian* oleum crassum optimum, *Wahr*, coquendo præparant: vid. *Schonev.* p. 10. Pisciculus aculeatus *Rondelet.* parte alt. p. 206: *Generi*: *Pungitius* piscis *Aldrovandi* p. 618. & *Alberti*. *Stickelbeck*, *Bantheck*, or *Scharpling* *Willughb.* p. 341. & de altera specie p. 342. *Gasteroflexus*, aculeis in dorso tribus, *Artedi*: vel duobus.

3. *Centrifusus*, sex aculeis in dorso; sub ventre duobus: *Schoneveldi.* ad. l.

4. *Centrifusus* spinis decem vel undecim, non perpendiculariter erectis, sed vicissim una dextrorsum altera sinistrorsum inclinat; the latter *Stickelbeck* *Willughb.* 342. *Gasteroflexus* aculeis in dorso decem, *Artedi*.

B. *Galeatus*:

1. *Centrifusus* galea picta multicolore; piscis squamosus trium vel quatuor pedum; rostro longo, in extremo mandibula superiori quatuor, in inferiori duobus longis, cæterum utrinque in mandibulis ultra 30 dentibus curvis, & acutis munitis; in dorso quatuor insignibus aculeis, discretis velis caudam recurvis, instructus. Sautius; le grand Pourcau, the great Hog-fish *Catesbeji* *Tonn.* II. p. 15.

2. *Cent-*

Thoracati

III. CENTRISCUS.

B. *Galeatus*:

2. *Centrifusus* barbatus septem pinnis, quatuor aculeis fortibus; cute argentei coloris squamis carens; ab hoc pife laeius magnos patitur dolores & difficulter sanatur: Bagre species *Maregravi*: prima *Willughbeji* p. 139.

3. *Centrifusus* capite compresso & lato testa dura punctulata recto; ore inferius parabolice figuræ; barbatus exiguam; Bagre altera species *Willughbeji* ibid.

4. *Centrifusus*, pinnis longis & latiusculis instar ligulæ; cæterum centrilo 3tio similis. *Willughb.* p. 140. Bagre tertia, barbata.

5. *Centrifusus*, in summitate dorso testa dura ossica, in lateribus testa pyramidalis angusta testis. *Willughb.* ib. Bagre quarta; vulgo Clip-bagre.

6. *Centrifusus* maculis numpi Munici magnitudine variegatus; *Willughb.* ib. Bagre 5ta species.

§. XXVI.

FASCICULUS QUINTUS.

Hoc fasciculo comprehendimus duo genera piscium branchiis apertis; inter quos & *Petronyzonem* sive lampetum suaviatilen, branchiis occultis, locum habet parallelismus; prout enim lampetra ore, sic pices, qui sequuntur, vel sermo vel superiore capitis parte quibuslibet corporibus tenaciter adhærent. Alteri iuni corpore tumefacto, unde est, quod ONCOTTONES salutarimus, (f. XXII) alteri corpore productio, quorum nomen atqueque LICHNEVDUM cum *Artedi* retinimus.

I. ONCOTTON.

1. *Oncotus* colore nigrescente & dilute rubente varius; ventre rubescens; tuberculis cutaneis in acutum terminatis spem alperatus. Lumpus Anglorum, quasi massa inornatus, *Charletoni de diff.* pife. p. 12: *Turneri*: *Generi*: the Lump or Sea-Owl, *Scotti*: Cockpaddle, *Willughb.* p. 208. Tab. IV. 11. Lepus marinus *Schoneveldi* p. 41. *Eschsch.* aculeis maris baltici; *Hatiliandi*: *Sch. Padd.* *Barne* *Snor-* *tol*, sub sternio habet quiddam circulare, instar scuti a),
 g
 cæterum

I. ONCOTION.

carinatum, quo lapidibus, ligno, solo, aliisque corporibus arctissime haerere potest, ut egrae avellatur. (Cyclopterus b) *Artedi.*

a) Pars illa circularis circum dicta minutis fimbriis munita, quae bene nam format. Hinc a cartilaginea parte intermedia fimbriarum deorsumque collata ex se sparge, figura quae circulus impositus est plus minus cartilagineus in fimbriis supra dictis abstinat. Idem fimbriae tamen procectus extendit. n. In parvi cartilagineae cavam, a procectis eadem usque in os tendit, huius Linguae format; minime moliturque vestitum mascula. Huius fimbriae, quod materiam, adhaeret quoque diaphanum.

b) A nubes, circulus & *Onctio* pinna, quod pinna ventralis in orbem convergit fimbria. *Art. Ichth.* P. 11. p. 797. fimbriae, me non ita intelligere, quod fimbria pinna ventralis. (quorum nec umbra velligium) in orbem convergit nec diaphanum, nauticum commisit eorum: quod in locum pinnae ventralis sublevent hunc circulum, mediante quo piscis (prout dictum) omnibus corporibus adhaeret.

2. *Oncotio* gibbifossus; Lumpus balticus & scoticus *Gesneri para-liponi*, p. 1285. piscis gibbifossus, *Aldrov.* p. 480, quod in dorso gibbus artolitur, figura sere pyramidalis, pinnae rubentibus *Willughbb.* p. 209. *Tab. M. 10. f. 2.* piscis gibbifossus *Charier.* p. 13. *veridicus*, Hoger-Lump German. the Bunch-back-Lump *Angliz.* contra. *Harvius* de generat. anim. Exer. 3. Sed quis ipsius fuerit, Lumpum *Schneideri*, quem *Gesnerus* siccarum vidit, piscem cute molli ventreque inflato, non fuisse suspensum e medio dorso, unde non sit factum, quod gravitate corporis dependentis corio dorsali extenso, tandemque exsiccatio piscis, gibbum contraxerit?

3. *Oncotio*, dilute viridis & vivide coloribus pavonis resplendens; dorso parum nigrescente & culicellato in medio, ibidemque oblique & notanter incilio; pinnae viridibus, ad ambitum deauratis; frequens in mari prope Gedannum, non ingratum saporis; cuius figura *Tab. XIV. f. 5.*

§. XXVII.

II. ECHENEIS; *ἄγκυρα* ἢ *ἔχμη* ἢ *ἡρατὴν τὰς ναῶν*, quod naves sistat fundorum carum adhaerens: Parva-Echeneis adell, mora puppis aegens.

T. XIV
f. 5.

II. ECHENEIS.

ingens. *Oppian.* Naucrates; Remora *Imperati* & *Aldrov.* Lib. III. 22. Remeligo. Iperuquiba & Pirauqua *Brasil.* Maregr. Piexa Pogador & Piehe *Piolho Lusit.* *Suyger Belgii.* The Sucking Fish, Scrophth *Angl.* Capitis superiore parte vel vertice circolo ad instar acetabulorum polypti prout *Oncotio* firmo, corporibus, vicini modo, adherens. Varias de Remora opiniones vid. apud *Aldrov.* Lib. III. cap. XLII. & *Phu.* Lib. XXXII. cap. 1. Nonnullis *Resorpi* seu Invenis audit *Last* p. 6. Riverii col. f. 112. qui plane diversus est piscis, de quo multa fabulatur auctores. *Conf. Watoupi de different. animal.* cap. CLXVI. fol. 149.

1. Echeneis catulefens ore retuso; a mediante corporis tam superius quam inferius pinna decrefcente usque ad caudam sustentata. Remora *Imperati* & *Aldrov.* *Willughbb.* p. 119. *Tab. G. 8.* Echeneis *Artedi.*

2. Echeneis *Willughbb.* *App.* *Tab. 9. f. 2.* Remora *Imperati.* Habuimus plures varietates, capite in rostrum acutum terminante duobus lineis albis a capite ad caudam decurrentibus, alios nigricantibus, alios plumbei coloris. *Conf. Caterby Remora* *Tam. II.* p. 26. & *Dr. Hans Slane In. Ann.* I. p. 28.

§. XXIX.

FASCICULUS SEXTUS.

In *Missu III.* vidimus *Congres*, *Anguillas* &c. branchiis, quas vocamus, OCCULTIS. Collaterales illis sunt *congrui* vel *anguille-formes* branchiis APERTIS, quos, natura praemonstrante, quilibet prognatis cognoverit, est differentias de quibusdam branchiarum non fuerit edoctus; fuit enim cunus, corpore productio & quidem teretiusculo, unde est quod eiusmodi pisces titulo *ἰσχυρῶν* anguilla vel *congrui* aspectum bobentium investire constituerimus. Horum operculi branchiarum sunt oblonga, laeva, non ossa; plerumque quasi ex pergamento plus minus duro consistant, ut facile comprimi possint; pisces plus minus longi, plus minus teretes. Differunt inter se pinna vel longia vel brevibus; illae sunt vel ventrales & dorsales caudam ambientibus; quae eadem cauda continuae esse solent cumque pinna retro anum; hoc est, ut explicat *Rajus*: anguilliformibus una pinna a medio dorso

g 2

incipiens

incipiens & caudam in gyrum cingens, ad anum desinens; vel alterutra longe; harum in medio dorso unica est, fig nobis audiunt anguilliformes omnes pisces corpore teretiusculo, five sint longi live breves, dummodo producti & teretes; idem *Reyn* ad anguilliformes connumerat *Ginucellum*, Alaudam non cristatam & cristatam Gobionem fluviatilem &c. Exhibebimus itaque I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa, II. ENCHELYOPUS pinna dorsali brevi.

§. XXIX.

I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa.

1. *Encheiopus* capite producto, serpentino, extremo mandibula superioris ad instar rhinocerotis hamato, dentibus acutissimis 20 vel 21; oculis magnis orbicularibus; tripinnis; duobus branchialibus, unica dorsali ex moris aculeis membrana conjunctis constante, & a cervice ad extremitatem caudae teretis & spinis decurrente; nulla ventrali. Longus fuit quatuor pedes minus uno pollice. *Tab. XII. f. 7.*
2. *Encheiopus* totus fuscus; rostro longiusculo, plerumque hiante; dentibus acutissimis, non facile conspicuis; induratus; *Willughb. App. p. 3. Tab. 3. f. 2.* Meer-ael i. e. anguilla marina; *Ubirre J. de Laet.* Dicitur habere anteriorem corporis partem tenuem, posteriorem duplo crassiorē; sed contrarium iuvat figura apud *Willughbium* & quod cauda in acumen exeat. Dorsalis pinna remotius a capite incipit, quam in precedenti. Diversis perhibetur a *Marggrav.*
3. *Encheiopus*, capitulo conico acuminato; oculis & ore parvis; in dorso & lateribus fuscus; in ventre hepatici coloris; duos plus minus pedes longus; cauda tereti; ad branchias pinnae; pinna dorsali longa usque ad decretescentiam caudam; ventralibus carens. Muci *Brazil. Lampetra affinis Brasil. Marggrav. Willughb. p. 106. Tab. G. 7. f. 2.* *Ubirre Joan. de Laet Lib. XV. cap. XII. p. 575.*
4. *Encheiopus* barbatus; dorso cinereo; mediis lateribus argenteis; dorsali & ventrali pinnis longis in ovum corporis conjunctis; & mento cirriformis. Barbulas quatuor habere scribit *Willughbicus* p. 113. & *Arredo* Ophidion itius audit, citris quatuor in maxilla inferiori; verum nec *Willughbicus* *Tab.*

T. XII.
l. 7.

I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa.

Tab. G. 7. f. 6. nec *Rondeletii* figura plus quam duos indignant cirros; quinimo *Rondeletius* p. 397. diversis verbis loquitur: „a congro gemina barba e maxilla inferiore propendens differt, & oris rictu, qui in congro maior est,“ Ophidion a) *Philus*; *Gryllus* vulgaris *Rondelet.* *ASELLI* b) *species Bellonii*; *Gen. 1043 Aldrovandi Lib. 3. cap. 26.* *Rondeletius* congro tam similem esse scribit, quam sit ovum ovo; *Bellonius* pro congro vulgo accipit & pro eodem ab *Ichthyopolis* romensis interdum supponi refert; nihilominus tamen scribit, palmum in mediterraneo non excedere; quos *Willughbicus* vidit, non octo uncias longitudine superarunt; imo *Rondeletius* eos *pisciculus* vocat. Squamas dicitur habere insolite figurae; quia omnia conciliare nequeo; sic excutitur nos faciunt & celeberrimi auctores, & qui ipsos eam fide sequuntur. Sane, nemo *P. J. Seepho Gammarslag* p. 44. vitio vertit conquerenti: „dum multa sciuntur, plurima tamen adhuc nesciuntur, non immerito subit hac reputantem inspicere pudor, & aliena ignavia dolor, dum miro artificio a veteribus commenta exhibita, alii in eodem hasitant luto, non quatenus ulterius eniti,“

a) Quod parvus sitpens; ab ὄψις vel ὄψις, parva anguilla *Bellonius* opinus, ophidion est serpentis marinus live draconis marinus.

b) Ecce *ASELLUS* *Ichthyologia*, vel *species* speciosae; licet in textu auctor fa-teatur, pag. 113, quod vix in promptu, quid de eo statueret possit. Sed quid *Rondeletius* p. 397? „Imperio licet, qui ophidion inter auctores numerant, cum plura illis diffinita sit corpora huius ex-ample, pinnis, utque cum longis plane communantur. Plures tereptum vocantur ὄψις, q. vel vix nescimus, tale eum videri: Merluccius seu Aleutica prima *Rondeletii*, vel *Codrus* dicitur; *Thyrsogaster* maxilla inflexione longiore, *Arctidi*, & *Ling. Willughbii*; quod nec *Callias*, live *Callias* *Mallinck* nec *Galus* vel *Codrus* marina *Bellonii* alii sunt. Veniam equalem est, quod circa *Bellon. Capitis IX. Libri 12. Rondeletius* scribat, sed *merluccius* „Hoc capite NB. a vulgaris omnium linguae temeritate doctorem ho-minum factatam non recte, qui MERLUCCIAM dixerunt. *Ichthyologia*, „Hic esse NB. *credent* *Ichthyologia*, „Hic paulo ante jam dixerat: „Hic *merluccius* est, etiam veteres nomina alia confudit, & superius utque duo *Ichthyologia* & *Ichthyologia* si quis semper cavet danda est *Ichthyologia*, statueret recte est additum, quod NB. *Ichthyologia* non est *Ichthyologia*“

I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa.

„*Aut res merula habetur, neque broi neque furesco dici possit.* Recundum Aristotelem, Ab omniibus autem dicitur Merulus in pinna in dorso. Sed quid ad hoc *Rondeletius*, ubi pag. 297. contra *Doriscum* disputat, qui dicitur non merulum spinam (sive pinnam) unicam solum habere NB. Ostendo, qui Collares f. Callaris (*dorsale Phycia*) ductus est, similem? verus quis fuit? „Qui „*hæc asello competere possunt, quem spinas permutas habere con-* „*stat.* „ & pag. eadem infra „*quæ, est dorsalis per damna-* „*tionem dicitur ab *isop*, non oblique tamen *asellum* converterim.* „*Itæc dicitur Doriscus Asellum piscem. Lilius nominatum esse *ce-** „*pheliscum.*“ Proverbius præterea ad *Rajam, Libr. I. quod Willughb.* „*cap. XI. p. 21 circa finem: „qui tres in dorso pinas gesserit, præ-* „*ter asellum, nullum piscem nominat.*“ Sufficit autem *Rondele-* „*tius:* „*asellum antiquorum non esse asellum; & in fine pag. 297.* „*factum:* „*isop* & inde per hypocothesionem nomen *isopiscis* a *Calla-* „*ris* & veterum permutas pro eo accipi pisce. quem hic (Cap. IX) „*aspiniscum, quique MERLUCIUS vocatur.*“ perisam me ha-

bico, *Rondeletius* figuram quam dedisti, mensuri duas spinas in dorso, sed revera unicam resurre debuisse, idque non sine ratione: 1) quod pag. 296 ait: Merulum pinna quatuor natare — a pollice ad caudam pinna consistunt, *hæc finis est alia in dorso ad caudam fore quatuor.* 2) quod *Rondeletius*, qui non nisi unicam asellum exhibuit, quem vocat *græci: *isop*, latine Asellum, Græcè Mer-* „*lucan, ipsa vero in texto MERLUCIUM, ipsi moris Locum,* „*punxit hunc piscem proat delictis, unica nimirum *et longa pin-** „*na in dorso: verum Willughbæus, forte signa *Rondeletii* indu-* „*xit, transumptam Merula a *Savino* figuram *Tabula I. Mem. II* „*Et system non auduit, quibus *isop* de *despi pinna* argueretur *Eub-** „*jecti: quem autorem & *dorsale* locutus est, quod tamen *Rondele-** „*tius Lib. XII. p. 291. indignandum reprehendit: „hoc non* „*„*is* docere, sed studium vituperare, aliud pictura aliud verbi de-* „*monstrare.*“ Quod porro ad Piscem LING Anglorum autem *Willughbæi* *Tab. L. m. a. f. 2,* nemo non dixerit, esse anguilla formem, fuisse etiam dorsali pinna casu interposita, cauda nulli asellorum communi. Nescio itaque, qua fiduciam elatit, *dorsale isop*, *p. 16. n. 29. interpreti:* „*Quo tamen negat, Asellum longum* „*LING Willughbæi, & asellum.*“ MERLUCIUM autem cum *Willughbæi* norem Aselli & *Gadi* speciosius, quem dedidit *Willughbæus*, eodem genere convenire, hæc Asellus longus & Merulus pinnas*

„*finis*

I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa.

„*Aut tantum in dorso & unum non obtrineant, reliquæ vero spe-* „*cies omnes tres pinas & duas ad unum habent.*“ Minus recte etiam *Willughbæus* asellit: Tamen tertium *Rondeletii* sive *Polsem* veterum *Rondeletii* ad Asellorum genus accedere: idem dicendum de Asellorum dicitur *specie *isop*, ubi* „*quæ, est dorsalis per dam-* „*tionem dicitur ab *isop*, non oblique tamen *asellum* converterim.* „*Itæc dicitur Doriscus Asellum piscem. Lilius nominatum esse *ce-** „*pheliscum.*“ Proverbius præterea ad *Rajam, Libr. I. quod Willughb.* „*cap. XI. p. 21 circa finem: „qui tres in dorso pinas gesserit, præ-* „*ter asellum, nullum piscem nominat.*“ Sufficit autem *Rondele-* „*tius:* „*asellum antiquorum non esse asellum; & in fine pag. 297.* „*factum:* „*isop* & inde per hypocothesionem nomen *isopiscis* a *Calla-* „*ris* & veterum permutas pro eo accipi pisce. quem hic (Cap. IX) „*aspiniscum, quique MERLUCIUS vocatur.*“ perisam me ha-

bico, *Rondeletius* figuram quam dedisti, mensuri duas spinas in dorso, sed revera unicam resurre debuisse, idque non sine ratione: 1) quod pag. 296 ait: Merulum pinna quatuor natare — a pollice ad caudam pinna consistunt, *hæc finis est alia in dorso ad caudam fore quatuor.* 2) quod *Rondeletius*, qui non nisi unicam asellum exhibuit, quem vocat *græci: *isop*, latine Asellum, Græcè Mer-* „*lucan, ipsa vero in texto MERLUCIUM, ipsi moris Locum,* „*punxit hunc piscem proat delictis, unica nimirum *et longa pin-** „*na in dorso: verum Willughbæus, forte signa *Rondeletii* indu-* „*xit, transumptam Merula a *Savino* figuram *Tabula I. Mem. II* „*Et system non auduit, quibus *isop* de *despi pinna* argueretur *Eub-** „*jecti: quem autorem & *dorsale* locutus est, quod tamen *Rondele-** „*tius Lib. XII. p. 291. indignandum reprehendit: „hoc non* „*„*is* docere, sed studium vituperare, aliud pictura aliud verbi de-* „*monstrare.*“ Quod porro ad Piscem LING Anglorum autem *Willughbæi* *Tab. L. m. a. f. 2,* nemo non dixerit, esse anguilla formem, fuisse etiam dorsali pinna casu interposita, cauda nulli asellorum communi. Nescio itaque, qua fiduciam elatit, *dorsale isop*, *p. 16. n. 29. interpreti:* „*Quo tamen negat, Asellum longum* „*LING Willughbæi, & asellum.*“ MERLUCIUM autem cum *Willughbæi* norem Aselli & *Gadi* speciosius, quem dedidit *Willughbæus*, eodem genere convenire, hæc Asellus longus & Merulus pinnas*

Nullus additus forare in verba negotii

regre mihi expeto populariter sed constantes & graves Conclaves, dummodo veritatem pre oculis habeant, reliquis præjudiciorum impedimentis: cum omnium eorum similitudo vitiosa est, reliquis periculis veri.

5. *Encheilus flavus*, imberbis, præcedenti congener. Ophidion flavus *Rondeletii* & *Schæfferii*; piliculus longus & lavis, congro similis, pinna dorsali unica longa in caudam usque producta, aspera & velut serrato mucrone fuscudente; altera a podice leniore, duabus ad branchias exiguis. Ophidion cirris carens *Artedi* & *Willughbæus* hunc varietatem prioris non speciem esse pisse.
6. *Encheilus*, in dorso effuso cæruleus; cujus latera lineis seu cretis parallelis oblique descendentibus, variegantur; rostro acuto, maxilla inferior superiore paulo longior est; dentibus caris, pudentem longitudine raro excedit. Ammodytes *Generis*; Sandia anglorum *Savino*; Sand-Eels or Laurens; Acus Ammodytes; an Cicerellus *Mull. Hæroni*? *Willughb. p. 113. Tab. G. 8. f. 1.* Ammodytes G. *Pisc. 13. Artedi* qui recte monet, *Sabiani* (& *Willughbæi*) figuram non accuratam esse, quod in dorso, loco unice pinnae, duas pisces tribuit. Duas observavius varietates, earumque absolutas figuras modo tradimus *Tab. XII. f. 8. 6. 9. p. 12. n. 29.* Prior & major, pallide flavus interludens aliquantisper de-

gentio

I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa.

genito colore; posterior fuscus, in lateribus dorsum inter & ventrem vividè argenteus; huic cauda pinna est lineata; illi obrute falcata; perperam Tobianus maris balnei Sebnerveldi.

7. *Enchelyopus*, labro mandibulæ inferioris superiori mandibula acuminata longiore; sub carulis, ex argento totus splendens; haud procul a cervice pinnam longam, alteram ab ano ad caudam descendente, ad branchias utriusque unam habens; omnes ex argento ceruleo-centes. Hic est Tobianus *Schoneveldii*, ad mare balneum norissimus; Tobian, *Zuwaas*, *Enchelyopus*, non enim adeo diffusilis est *Spirincho*, quem *Schoneveld* pro *Saod* *Eel* sumit, sed specie a precedentibus plane diversus; *Tab. XII. f. 10*; hinc rectè *Aguius Syn. Pisl.* p. 169, quod ad *Ammodytes Saluam* multum differat; estque *Ammodytes Anglorum* verus, the *Launce* sive *trac* *Sandeel*; vid. *Raj. Syn.* p. 38. *num. 3*.

8. *Enchelyopus* cauda longissima & tenuissima; coloris ex incarnato ceruleo-centes; squamarum protius experts. Præter pinnas branchiales, in dorso habet pinnam digiti distantia a capite inchoantem & ad eandem extremam pertinentem, cum cuius pinna continuatur, concurrente ventrali pinna pone anum, quemadmodum in anguilla. Tania prima *Rondeletii* *Cepole Romanis*. Tania auctorum *Artedi* & a quibusdam spale vocatus, *Gesner*.

9. *Enchelyopus*, coloris argentei, subrubra pinna dorsali; linea aspera in lateribus, cæterum mollis. Tania tertia *Willughbeii* *p. 117. Tab. G. 7. f. 7*. Falx venetorum, *Belloni*. Falx venetorum dicta *Artedi*. Tania (melius quam a *Bellonio* expressa) *Aldrovandi*; perperam a nonnullis ad aëlios numeratur; vid. *Enchelyopum* *atum* in *nota*.

10. *Enchelyopus*, totus pallide rubens; in imo ventre albescens; ad latera magis compressus quam anguilla, cauda tenuissima; pinna dorsalis ab occipite ad caudam continua; cui ventralis opponitur ab ano decurrens. Tania rubra. *Gené*. *Cavaggio* & *Freggia Willughb.* p. 117; sã Tania altera *Rondeletii*? Tania altera dicta, *Artedi*.

11. *Enchelyopus* phœnicei coloris; pinna, dorsali & ventrali, a capite ad extremum caudæ acutè continuatis. *Myrus* alter,

T. XII.
f. 10.

I. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa

ter, seu serpens rubescens, *Rondel. Aldrovandi*; Taniæ potius species censenda, *Willughb.* p. 118. *Tab. G. 7. f. 8*. Tania, serpens rubescens dicta, *Artedi*.

12. *Enchelyopus* totus ex fusco flavescens; lituris singillatim, maculisque variis; in pinna & ad latera diluvioribus, paulo circo ad extremum mandibulæ inferioris. Muscula vivipara *Schoneveldii*, cuius tamen figura, quam adopravit *Willughb. Tab. H. 3*. parum valet; pinnas dorsalem & ventralen post anum habet longissimas, caudam in acutum terminantem ambientes. *Nakapape*, *Nahmatte* vulgo. *Blennius* capite dorsaliqve fusco, flavescens; lituris nigris pinna ant fava, *Artedi*. Idem est cum *Willughb. Luripen* *Antwerp* dicto p. 120, cuius deterioro ad nostrum piceum quædrat, figura autem *Willughbeii* minus accurata; suppedita-

T. XV.
f. 1.

13. *Enchelyopus* subincertus ex fusco maculosis; barbula facis longi & incerti; pectoralibus pinnis donatus; pinna dorsali ad principium interrupta cum ventrali post anum ad caudam usque falcellatam excurrente. Muscula maculata, scabulifera omnium, *Schoneveldii*. *Quappe*; muscula vulgaris *Rondeletii*, *Gené*. Aëliorum altera species *Belloni* c). A *Sco* *Loche*, *Cestrie* 2. *Willefish* in Cornubia *Willughb.* *Figura Tab. H. 3. f. 4*. via alicujus momenti; Gadius dorso depressio, luteo magno ad pinnam dorsali primam d), ore cirrato, *Artedi*. *Tab. X. V. f. 2*. *Botanarite Saluam* *sol.* 52. 213. alius *Serino*; *Rondel. Jovo*, *Trifus*.

c) Vid. hoc sp. *notam* b).

d) Non incertum dum in muscula vulgaris speciosissima pinna dorsales, sed incertum ex parte ad latera pinnas; *Willughb.* p. 120. pinnas immensissimas brevissimas vocat, quo, nisi in pinnis non omnibus & recte hinc, & sic certum, sed incertum & falsum sequatur, certe videntur, ut prope pinna (videtur altera) dici nequeat.

14. *Enchelyopus* cirrus tribus, altero e mento, duobus inter nates & reliqua brevibus; cauda prolata, lateraliter pressa & sensim attenuata ad extremum usque, quod transgreditur pinna

1. ENCHELYOPUS pinna dorsali longa.

pinna dorsalis & refectitur usque ad anum; Nigricat piscis; quo colore deterio ex albo & luteo, nigredine anatis, varius apparet.

Muscula fluvialilis, Eelput, Barbot, Treischen, Kutton, *Willughb. p. 127. Tab. H. 4. f. 4*; quæ parum valet. Lons *Rondelet. Gars* Gadus dorso dipterygio, ore cuneato, maxillis equalibus *Artedi*. Muscula, Ruten *Marsili Op. Danub. Tom. I V. p. 7. Tab. XXI V. f. 1*. Kulsch *Reichnitz*, Menghal *Ungar.*; Pegorella *Illyrici. Charleian de differ. pisc.* p. 3. piscem hunc ex genere anguillarum esse agnovit: cum hoc pisce convenit *Serge marina* & *Donzellina veneticus*, quem describit *Willughb. p. 121. figuram vid. Tab. H. 2. f. 1*.

15. *Enchelyopus* capite Callionymi five Uraoscopi, quod oculis calum respicit; Clarus Nilotici *Bellonii*, musclæ fluvialis species. *Willughb. p. 127. Tab. H. 4.*

16. *Enchelyopus*, qui Ling Anglorum *Willughb. p. 175. Tab. L memb. 2. n. 2. de quo supra nota b*.

17. *Enchelyopus* capite limacis facie cornuta, cirrisque donato. Bont Ael seu Neegenooq. i.e. Lampetra Indica seu Enneophthalmos Listeri apud *Willughb. app. p. 4. Tab. 6. f. 2*; addidit *Reisus*: si tamen plura utrinque ad branchias obstricta foramina, ut nomen indicat, novum piscis genus est.

18. *Enchelyopus* quinque maculis oculorum xmulis in pinna dorsali, cauda proximæ; rostrato capite, pinnis rubris, cauda caerulea. Vifboog, Pseudophthalmos; *Willughb. app. p. 6. Tab. 10. n. 1. ibi*. Anguilliformis est piscis, & ad Lipiran Cornubiensium accedit.

19. *Enchelyopus* congro forma & nolo similis, venenatus; *Laet cap. X V III. in fine 27.* cute inenle viridi & elegantissime variegata, rictu patente & denobis acutissimis; caro detracta cute candidissima est & non ingrati saporis, verum qualitatibus adeo virulentæ, ut in summum discrimen atque adeo mortem conjiciat eos, qui illam gustaverint; an, serpens marinus compressus lividus D. *Hanz Sloan II. Tom. I. 26. 27. Tab. 1. f. 2*; nulli fit mentio de qualitatibus branchiarum; in dubio hoc loco positus inter pisces branchiis apertis; quovis oculus gaudeat transferendus ad *Musf. III. §. XV III*.

§. XXX.

§. XXX.

11. ENCHELYOPUS pinna dorsali brevi.

1. *Enchelyopus* barbulis sex mandibula superioris, quatuor inferioris. Musgun seu Musgun, piscis lampetiformis Norimbergæ & Ratisbonæ; *Willughb. p. 118. Tab. G. 8. f. 4*. Cobitis carulelens, lineis utrinque quinque nigris longitudinalibus, *Artedi. Willughb. 124.* musclam fossilem (quæ sequitur) eundem cum hoc pisce mutare; verum illa non nisi tres barbules habet, hunc decem habere dixit autor.

2. *Enchelyopus* lineis laxis atro-fuscis, punctisque fuscis super cinereo & subfusco variis, pinnis branchialibus rubicundis; cirris evidentibus tribus. Muscula fossilis *Gerardi*, vel potius *Georgii Fabricii*; *Germani* Peitscher, Beitscher. *Melpate*, *Wiettrische*, *Wiettrische*, *Agricola* *Wiettrische*, *Pocillia Schonta*, cui tamen octo carnes particulas circa oris incisuram adstrictas, & musclæ vulgari tres. Cobitis barbata, Lampetra barbata, *Saintesche* mit von *Want Du. Ja. Leimb. Frischii* *Miscell. Berol. Tom VI.* Egregia est fabula, qua *Georgius Fabricius* impostum optimo *Genere*, quod hi pisces e terra fodiantur. Certiorum de hoc pice communicamus historiam: Ample viro, aqua fluvialili, quantum satis, repleto, si committitur piscis, diu conservari potest fructuulis panis filiginei; erigat tibi vivum Barometrum; nam quovis intra 24 horas ingrata tempestas aut procella oriunda, certo certius tumultuatur egregie; sere quieto, & cauda sereno valde placidus, eisque consumitur, in fundo vitri immobilis jacet, barbulis ludens. Figuram femine ovis brevi edendis (dem *Stridgen* nasci) tradimus *Tab. X V. f. 3. 122v.*

3. *Enchelyopus* nobilis, cinereus, umbratilibus maculis fuscis variis; cirris sex; Cobitis barbata *Rondeletii* & aliorum; longe majores sunt figura nostra *Tab. X V. f. 4*. Cobitis *Buvinili*, *Smerla*, *Smerling*, *Smerla* *Schneuwaldi*; *Willughb. Tab. 2. 8. f. 3. p. 265*.

4. *Enchelyopus*, præcedenti congener; non tamen edulis; ventre ex albo luteus; dorso ad medium corporis maculis rotundis nigricantibus lineas longitudinales efformantibus, variis; *germanice*: *Stenbeiler*, *Stenbeiler*, *Balneri*, quod parvulus lapides deglutire creditur; an, Cobitis barbata aculeata; *Gen. Willughb. p. 265*. Lampetra pungens, cobitis

h 2

II. ENCHELYOPUS pinna dorsali brevi.

cobitis aculeata laudari *Du. Frisch* ell. L. (sic jam memorat.) Cobitis aculeata, Steinbeisser, Steinbeis *Maffili*; *Al-drov*. Cobites oxyrinchus *Genero*. Vix distinxerit hunc pliciculam a *Smerlus* costis: adeo sibi similes sunt; confusum tamen non potest idem crenum esse, se si eorum Aleis eorum dentibus inspicere praesumpseris; plicis *Apirios* valde fallens.

5. *Enchelyopus* squamulis parvis, deciduis, ventre argenteo; dorso nigris maculis variis, myxace simpliciter ad angulos oris utrinque. Fundulus; *Gobius fluviatilis aeternus*. Grindling, Grindele, *Schönwäldti*, Tab. XV. f. 5. Sapidissime confunditur *Fundulus* cum *Enchelyopo* tertio, pinna dorsal. brevi, sine cobitide *Rondelii* barbata; hanc primatum inter omnes plicis obtinere revera credunt & nostrates & exteri. Ingens copia *Enchelyoporum* & tertii & quinti in Prussia est. *Fundulorum* caro mollis, dulcis, plus salis requirens; *Smerle* gracillimi sunt saporis vel vino vel aceto praeparati collata neque in mensis delectabilis; si ad propinandum iuxta potueris vinum generosum.

§. XXXI.

His obsonis uteres; non abutere, *amississime Lector*; ne nascam contrahas. Dispono aliter; adde condimenta; deinde ingratas; ut accipias huc omnia Tibi mihiqve, ubi intellexerim selectum, quem feceris. Confractores simul rogo: non esse multiplicanda genera, ubi vel digitis absolvere poteris omnia. Si *DEUS* optinus maxime secundum dignabitur utereri. Copiosius, reliquos plicis nostris & aperitis branchiis spiritantes insinuas. Absolvere amant; alios, vel ob discrepantes aeternorum sententias, vel propter figuras variantes & descriptiones proletarias, minus noceos, vel p.a.c.s. utique dum cognitos, quorum uberrima seges est, missu demum VI congregaturus ita, ut tanquam noviter conducti veteranorum aciem intratent; Si vero *Nummen* NUMEN Teuui amplius consabulari negaverit, vel praesentia molimina Tibi accepta habeas, opio.

Aristoteles:

Imbecillis ingenio est, demonstrationem eorum querere, quae sensus ipse docet.

ADDI-

ADDITAMENTUM

ad

MISSUS III. Sphum XXXVI.

A. In dicto spho XXXVI, opinari sumus, non omnibus *Galeis* unum eundemque esse modum naturae, quo factus suos foucant & excedant, idque data occasione in clariore luce exponere elaboraturi. Expolimus ovarium *galei* (forte *Aristotelis* Caniculae apud *Rondelium* p. 380, vel alterius) plicisqve carulum ex folliculo corneae sublimiter desumptum, statim suum nulloqve funiculo umbilicali & quae dicitur solent, placenta, vel sacculo tali, quo alter pliciculus *Missi* III. Tab. I. f. 7. gaudeat, instructum; De simili illi plura addere liceat.

- B. Mense Aprili 1742. *Nauclerus Schleuter*, cuius & *Blasferri* nomina, quod ex sua gente vires perquam humani sunt nobisque amari, recitare volumus, e mari Britannico in pariam redux *Galeum Acanthium* duos pedes & sex pollices Rhinland. longum, *Sphenium*, nobis exhibuit, qui caput pario 32. horarum quatuor edidit cutis, tandem spiritus vini gallici una cum prole in itinere extinctus.

- C. *Pulli* per omnia similes erant corallo (*Missi* III. Tab. I. f. 7.) quem pro *Cilico* Altera habuimus, nisi quod hic alterius spiritus, quo dicitur, carens, illa alterius carens acanthi fuerit, spiritus equidem dorsalibus dantibus adhuc molibus.

- D. Mater inter pinnam ani duplicatam (vid. *Missi* III. p. p. not. b. Ann. Tab. I. f. 6.) res aperturas habebat ad triangulum displicatas; superius unam, oxium incestino excretorio pandentem, inferius duas: ad dextram alteram, alteram ad sinistram, officina duorum iterorum constituentes. Inter has aperturas apparebat *Vulva* columella alba brevi processu praedita; an Clitoris?

- E. Ab hominis a diaphragmate ad usque duplicatam vulvam aperti long. Abdomen erat XIV. pollicum. Hepar, venterculus, ovaria, ut eorum, Tab. I. Uteri, Lien & intestinum praeter reliqua totam occupabant convitatem. Renum vesiculae nullum vestigium.

A 3

F. Hepar,

Hepar. F. Hepar, viscerum omnium maximum sub diaphragmate eiqve arte sdnetum, tribus divisionibus: nempe hepate ipso & duobus lobis ex hepate prognatis. Superior & indivisa pars hepatis partem ventriculi & ovarii urisqve lateris cum tubis vel cornibus uterinis sub se fovebat; Lobus seu dexter seu sinister reliquum ovarii & tubae uterinae cum toto utero obtegebat, quod lobi ad usque pubis os, quod dicimus, progrediuntur. *Vesica fellea nulla*; hujus loco innumera vala ab hepate versus pylorum mitebantur, cum & faeces obscura tinctae erant flavedine.

Ventriculus. G. Medium inter hos lobos pars reliqua ventriculi situm tenebat; qui Canalis, fascus potius oblongus, validus carnosus extus intusque albo & musculolosi tunica munitus. Hujus superficiei interna innumeris rugis papillisqve donata, concentricos villos lubriles habens; quo propior autem canalis pylori, eo arctior, eoque majores & longiores fornice rugae, quales videres valvulas conniventes juxta longitudinem positas.

Pylorus. H. Pylorus, circulus contractus inter ventriculum & intestinum; huic adnectebatur Lien ope minutissimorum vasculorum. Ceterum viscus minutum vix pollicem longum, & ejusdem cum hepate coloris medium oblidebat abdominis locum. Tandem intestinum, novem circiter pollices longum, faciefor-
Intestinum. me, post breves levesqve anfractus in fornicem superiori ad pinnas ani terminabatur.

Ovarium. I. Ovarium utrinque nullam secum communicationem habebat, prope nec tuba uterina & uterus dextri lateris cum tuba & utero fissi lateris. Ovarium 4. pollices erat longum, dextrumque tria, sinistrum duo foveas ovula fecunda.

Ovula. K. Ovula exacte rotunda ex materia constabant sebacea tenaci, magnitudine per diametrum duorum fere pollicum, macula quadam e cinereo-fusci coloris & lentis magnitudine notata; quae forte rudimentum Embryonis.

Tuba L. Ex ovarii superiori parte tuba pronascitur, levi anfractu uterum petens; est autem textura ejus ovario validior, valvulis gaudent multis variisque, quorum ope adhaeret ventriculo, mul-

ta & ab hepate recipiens; inque flatu naturali semipollicena pro diametro habens.

M. Uterus fascus est oblongatus, membranosis, variis & notis. Uterus bilibus valis dives; uterqve, licet spiritus vini contrictus fuerit (separatim, non ambo simul) flatu ad tres pollices quae diametrum augendus, hepatis, ventriculo ac intestino adnexus, sub infima hepatis lobi parte in unoquoque latere, uti supra dictum, situm habens.

N. Uterus dexter (pisco resupinatus) adhuc unicum exclusioni proximatum fovebat iterum, nudum, nulli membranae involutum, tamen placenta, forma sacculi & funiculo umbilicali per processum tubularem, *vis bilis disphaladema* (*Arif. de gen. Anim. III. 2.*) penduli, liquidaeque materia itatis repleti, cauda & abdomine amplexatam, capite versus uteri orificium porrecto. Funiculus umbilicalis per brevis hepatis foris inferitur.

O. Haec sunt, quae pro temporis ratione in hoc pisce & circa ejus cuticulos observare potuimus; an ullibi lapsum tulerimus, severiori Eruditorum examini nos submittentes; eumque in finem notas subiungere decrevimus separatas, ut interranteorum observationes planae & distinctae manerent.

Notae:

Ad lit. A. Feminae: In genere notandum, impletis postum vulgo emulgatorum feminas majores & plendiores esse masculis; in Culeorum utero per sepe factus condeuntur; in Raje utero ab figuris ceterorum plures vix commode equari possent. *Notae ad Ray et Willughb. p. 17.*

Ad lit. B. Orificia dupliis utriusque prope moribus per se generi Ray, de op. n. M. III, observato habet pinnas ad anum emittit vid. Willughb. Lit. n. cap. p. 16, qui non nulli emitti excreta mentum meminit. Eiusdem Culeum habere utrumque intermedium cuncta huius poratione huiusmodi Charlevoix, *man. d'Annam. n. 161 p. 16.* Raderius vulvam pinnas diaphragma disponit, *Arif. de op. n. M. III, p. 16.* Peru quoque emittit (hic enim erat mas) qui compressis emittit genitalium. Viscum in ovulo pinnas aut nulla corpore substantia, sive Culeo Asanthia

Note:

Asamblea de la Catedral, observaciones de los miembros autorizados de la

Ad lat. C. *Renatus* *offuscque nullum* *offuscque* aut non licet mihi esse
cani, *renatus*, ut *renos* *refuscque* *videtur*, aut *ambo* *non* *esse*
in *maribus* *apparuit*, *cani*, *Galeus*. *Nefarius* *tamen* *fecit* *quod*
even *deplorat* *anxi*, *renes* *paulo* *habet* *dupremque* *canon* *et*
ad *annum* *ite* *deficiente* *habuerit*, *fuerunt* *quidem* *angulos* *et*
pallidos *parastilesque* *lucumbentes*, *inferos* *autem* *amptos*, *canos*
et *ruicandos* *endentes*; *Charlet*, *vol.* *ii*, *p.* *24*. Sic *et*
Wingfield, *p.* *23*, in *Cane* *Galeo*, *mare*, *vidit* *renes* *longos*; *mo*
divers *in* *difficili* *effugit* *ex* *canum* *genere*, *Mylog*, *p.* *216*, *huc* *habet*:
visum *offuscque* *non* *poterat* *tenere* *urriter*, *ex* *spis* *erat*
amplius; *in* *media* *volu* (*ergo* *et* *femina* *renes*) *insigne*
rubrum, *in* *eminebat*; *culus* *post* *urriter* *aut* *erat* *periculos*.

Ad lit. D. *Lobi ad usque pedis us: Sic & Emilius* uterque ejus lobus a diaphragmate ad anum protenditur. *Charlet, p. 33, vii Stena-
at, l. p. 275.* Le foye du Renard marin s'en a-
partagé en deux lobes fort longs, aussi qu'il est à le plus part
des Poissons, *Perrault Rec. de l'acad. des Sciences Tom. 111. p. 222.*

Agave filifolia Willd. Hanc oblongam nectungam plantam in nostro pice.
Epulum Wulffek, p. 68. de Galco Acanthia. Agrov. Cylindri-
folia longior (ex quom in cas. 72.) & dependens in lobo
vestro; cum tamen idem p. 63. de Cane Galco cum Enrie ex-
pressit dicens: *Wulffek filia noli adliq.* & notandum tamen
quod Enrie apud Charlevoix pag. 84. in genere de Galco lo-
quatur, ubi inter alia dicit: non minus proprium fide
quod Enrie omnes carabologos, & quosdam carabos, sed
Concilia, Mammalia, Stellaria, filiosum, & reliqua pice
ejusdem; item *Asteriscus* p. 139 Galcom impliciter dictum
picealem piceis esse contendit; cum & contra Dictionarium
affertur nequequam, quod descriptum Galcom filia, innomi-
nati, ad omnes Galcomum. Piceis gravitate piceum. Quod
tamen filia, in vulgo maritima filia noli dicit. Perreus ad h.
p. 122 appropiit: *filia vetula* dicitur esse conformis ad hanc
admodum ad ditione de piceis, quod & noli pice
velut ad ad ditione, *filia* in vobis fultem piceis & piceis

Note:

passet au travers de la tunique du foye; est *Strangem additus*.
amedu (le pars) pars stranguis l'um sub diaphragmate jun-
ctura vesiculae telaeum subconditae, unde per ipsam hepatis sub-
stantiam color ductus in intestum via erat. Suspicioni hec,
et anachronica, quae vesica felica desitui credimus, licentem for-
te in substantia hepatis vesiculae guttatae indicium eludere.

Ad n. 1. *Pterocleus* (*Gaster immanissimus*) indicat egregiam figuram exhibet *Charlevoix* p. 85, ubi & *Oesophagi* pars infima; valvula ventriculi descriptus; pylorus; duodenum; foramen duodeni in tertium patefactum; Iarla duodeni; Lien; pancreas; ductus bilis; et; m. rectricum.

Ad lit. F. *Bylurus*: In vulpula quaque pollices longus fuit, & facile pro duodeno haberi posuit: *Perrault* *all.* l. p. 121.

ten vid. *Charlestonum* ad figuram ventriculi *fort. d. h. de W'ingh.*
de *Casco Acanthis p. p. d.* » Lien ad fundum ventriculi habens
» picea, qui intestinum committitur quoadvisque reflectitur, per
» hinc se hincque spazium ubi enim pascere committitur. Est du-
» plex pascere duplex ad angulum, quem intestinum cum se ipso
» ten, quod deorsum secundo reflectitur, sumum.»

Ad lit. Q. *Nulla ferre communicationem*: Sub diapragmæ ætropheæ racemus ovorum fuit vitelliarum, uterque infra vitellaria continebantur, sub diapragmæ in se mutuo perula erant, Willughb. op. p. 6. conf. *Rafus apud Willughb. p. 17 n.* Sed, quæ, *mutuo perula* per com duplicata vulva foemina, maribus penes gemini, ita, ut ovula utriusque vitellarii separatim imprægnantur, quin etiam in uteros separatos recta via deponantur.

Ad lit. H. *Essie rotunda*; rotunda, gallinacea minor, *Willingb. p.*
rf. in *Stenopus* fide etate magna, mediocria, minima; etate
 alba, aqua, flavescens; etate torrida, oblonga &c.

Sebacea renalis: Willughb. l. cit. „nulla, quod observare potuimus,
„albicans & vixit ad 1/2 hunc. Color interioris substantiae fla-
„vitatis nonnihil, velut flos lactis, aut candido magnus.”

Ad III, L. *Ex ovarii superiore parte: Equidem Willughby, infra vitella-*

Notæ:

via continetur cornea uteri dextra attamen utrum trahunt ex fe-
rior. ovarii parte.

Ad H. K. *Forma facculi: Securius de vipera pythia p. 186.* „In
Galeo multiflori simpliciter apparent ovarium: ita vero non fuit
utrum, verum ovarum primo formam rotundioris ante fatis-
centem & conceptionem referentis, mox a *formata fatis* succedunt
sicut *Oenophori flammii* formam — *ille* appellat de oviformes
membranas, quæ quævis apparent quidem, non sunt tamen
ova, verum *ovarii pythia p. 186* & cernitur ovarum in em-
brione.

Ad L. L. *Uterus dexter:* Quod uterus in duo corpora glandulosa in-
mediat, quæ tamen in medio pervia, *Willughb. scribit:* intellige
secundum longitudinem canalis pervium lobentis, non quod cornea
uteri dexteri & sinistri per media in se mutuo pervia sint.

Nulli membrana: Ita & *Willughb. p. 177:* „perfectus & parvi
proximus nulla membrana ita secunda inclausa, sed nudus in utero
pocent — Ova nullo vinculo utero alligata sunt. Constat
figata, quam dedit *Ad. de Securius etc. p. 227* uteri Galei cum tri-
bus catulis perfectis.

Liquidiq. materia: Raduli pulli facculum oenophori flammii forma,
secundum *Securius*, secum vehunt, exinde exire, ita, quæ in
utero videntur, incruentis & rubris, do ut de cibo per ora fi-
bi ipsi prospicere queant, vid. *fig. 7. Tab. I. Missus III.*

Funiculus umbilicalis: Umbilicus paulo supra pinas laterales, vel
secundum *Willughb.* paulo super pinarum par, & quo foras de-
pendit ovi funiculus cum vitelli parte; cum tamen perplicatissimus vit-
ellum in ovulis observaverit abovoidis & vitelli delinquentem; const.
Missus III. §. XXXV. Quod autem *Polygraphus de gen. anim.*
p. 14 per *hysteron umbilicus* ad unicum hysteron, appendicula
nostrum, ita enim ait: „Galei tertia ova in media vulva gestant,
vix cunctula, quæ postea in utroque uterum descendunt: mox
mutual gignitur, *umbilico hysteron ad unicum*, ita ut ovo absum-
pto partus non alter, quam in quadrupedibus contineri videatur. „
Et perro: „adhuc umbilicus ille prolixus capite altero ad partem
vivulorum infertorem, velut ex accubitu addeus, altero ad me-
diam

„alterum factum, quæ in parte juxta est. Id Galen ex *Aristoteli*
verum & uti *p. 204.* Galei alteri pili ova abundare appendicu-
la. *Willughb.* vero vel placenta utero five inferiori parti vulve ad-
necti, *Willughb.* omnino est, vid. *not. ad §. 18. nulli membrana.*
Inter *Securius p. 177* ita fuit concordantia: Galei viperæ
ova facile dissolvi in membrana, Apud *Missus* p. 177
membrana: hæc periculum effugient, quoniam ventriculum esse dixerit,
quæ tanquam ovi vitello perpetuo repleta esse conspiciantur: eujus po-
tius, est in ventre modum, daboque hepatis lobus subijciatur, ac
quod via se res habet, catulum a matris utero excludit, si per ven-
trum dixerit, verum ejus venerendum perpetuo vacuum de se ipsa non
competet: nihil enim per os affluit & devoratur: redium vero lute-
llum necesse est liquidum & egere conspiciat, hæc *Willughb.* apud
Willughb.

Ex iis, quæ in medium prolata sunt, concludere licet, dupli-
cem esse modum Galeorum generacionis: vel enim mediane folliculo
(*Missus III. §. XXXV.*) prout Canicula *Aristotelis* apud *Rondeletium*
p. 380 vel ovarum membranis fasciculatis & in *busse* figuram abovoi-
dibus foras flammii saus formatur, ut Galeus *Acanthias*, *tertium*
modum, quem ex inductione *Aristotelis* *Rondeletius* de Galeo *lavi*
p. 375 introduxit, ubi mox minimal gignitur, *umbilico hysteron*
ad unicum, ita ut ovo absumpto partus non aliter
quam in quadrupedibus contineri videatur,
reperendum esse arbitramur.



Errata,

Errata,

quidem levis, B. Lectori corrigenda committimus.

Addenda:

P. 2. *lin. 10* egrediuntur *add* (*) Iret ejusmodi aves postures ad hominis instat cecidit pagina 1, ut incedere videretur.

P. 1. *not. a)* ad finem *add*
Judei in populi nunquam contentis unus,
ne nulla piteas, dum vis continere mulas.

P. 7. §. P. *lin. 2.* amplius *add* (*) copulatur i curvenhocclus iratem piscis à squamis peti polle; *conf. Phil. Trans. Angl. Vol. XVI. No. 163. p. 131.*

P. 8. *lin. 2.* amplius *add* (*) *conf. Phil. Trans. Vol. XVI. No. 163. p. 131.*

— — Astero P. 11. p. 3. *add* (*) *Phil. Trans. ibid.* These Fishes are also provided with Fins, like eel Fish; for they have on each side of the head a petiole for the whole hinder part, or Tail, as well above as under furnished with a continued Fin.

P. 12. *lin. 17 a fine* Secretus *add* (*) *Gefucus de Aquat. Lib. IV. p. 94.* Sigismundus, Liber Baro, inter cetera magni Principis Moscovitarum dona multa, quaque piscum frulla multa, sere data, *Beluga, Osset, & Sterled,* accepisse se scribit.





Gravillat & F. de la



Tabul. I *






Figura 1. 1791




f.3.


f.4.



f.2.



f.1.








f. 1.



f. 2.























f.1.




f.3.




f.4.



f.2.









Tab. X.


f. 1.




f. 4.




f. 3.



f. 2.



Gravé par G. Goussier

























JACOBI THEODORI KLEIN
HISTORIÆ
PISCIU M
NATURALIS

PROMOVENDÆ
MISSUS QUINTUS ET ULTIMUS
DE
PISCIBUS PER BRANCHIAS
APERTAS SPIRANTIBUS.

HORUM
SERIES SECUNDA


CUM
ADDITIONIBUS AD MISSUS II. III. IV.

ET
EPISTOLA: DE CORNU PISCIS CARINÆ NAVIS
IMPACTO.

Seneca Ep. 45.

Libros meos tibi mitto: Tu illos lege sic, tanquam verum quæram
adhuc, non sciam, & contumaciter quæram.

CUM FIGURIS.



GEDANI. LITTERIS SCHREIBERIANIS. 1749.

Hesiodus in Egeus v. 273.

Justitiæ animum adjice; violentiæ vero obliviscere
prorsus;

Nam hanc hominibus legem posuit Saturnus.

VIRO
AMPLISSIMO DOCTISSIMO EXPERIENTISSIMO
DOMINO DOMINO
CHRISTIANO GOTTLIEB
LUDWIGIO
M. D.
IN ACADEMIA LIPSIENSI
PHYSIOLOGIÆ PROF. PUBL. ORDIN. COLLEG. B. M. V.
AMANTISSIMO

SUI

f. d. AUTOR.



Conticas habui cunctationis cau-
sas, quo minus intra quadri-
ennium publici juris fecerim
MISSUM hunc in ordine QUINTUM;
haud procul absfuit, quin recondidissem,

ne

ne me superflite in luce apparuisset; sed obtinuit religio votorum, quibus ex umbra-culo ultima in hoc genere otia mea evocarunt Amici. TUA quidem consilia maximi apud me ponderis fuerunt, & humanissima officia, quibus in gratiam opusculi TE ad-dixisti, nunquam dememinisse patiar; ne autem vel post cineres confescescant vivida argumenta benevoli TUI erga me affectus, eadem presenti epistola nuncupatoria con-signo. Vale in commoda reipublicæ litera-riæ inque bonum eorum, qui TUIS inni-tuntur consiliis, & quoad ipse cursum non confecerim, me amare perge. Dabam e Museo VIII. Id. Nov. 1748.

DE



DE
PISCIBUS
PER
BRANCHIAS APERTAS
SPIRANTIBUS
SERIES SECUNDA



§. I.

erimus adhuc inter Pisces BRANCHIENVELOs, five e. identer branchiatis, quorum VI. fasciculis in MISSU IV. deposuimus; modo SERIES SECUNDA reliquos totidem fasciculis superaddere animus est, cum in ipso li-nime ceteris emur, quod si. und. levia obstat. la em. nus apparent, qua nos progressu arceant. *Naturelem* omnium ordinem per spectum quidem habemus, verum nobis obviam veniunt nonnulla coga & ambigua quando-que sibi. s. p. equi- valentia, descriptiones improprie, figure alterantes a vero & erroris palam obloqueutes, confusus cumulus generum & specierum, vel vice versa, & lexcentia alia, quæ de multitudine rerum arduarum perimelente inslere fatigarent. Neque eo secus ambulemus, quam elegimus, vram hinc inde sententis oblitam, usque dum cur. aculum abolverimus, & re. ap. p. p. lices, quot. iot. pramonitane natura attingere integrum nobis erit, ab habitu corporis & a Characteribus quibusdam externis, mox in oculos cadentibus, in classes summas redegerimus. Aliquando & dentes a)

A

in

CALLARIAS,

lateralis alba. Afellus major vulgaris; Codfish or Keeling *Willughb. p. 165. Tab. L. m. i. n. 1. fig. 4.* Cod, a Keling, a Pellwel *Charlton.* Cabillau, Cabbellau, Bakkeljau; Bolch; arefatus, Stockfish *Belgicis*; *Dens*; *Zorgdrager.* Morrhua i Molva altera, *Aldrov. Gess.* Morrhua vulgaris, maxima affellorum speciei, *Bellon.* Molva, *Rondel.* Afellus major, *Schonev.* Gadus, dorio tripterygio, ore cirrato, cauda aequali fere, cum radio primo spinoso, *Artedi.*

2. *Callarias barbatus*, ex terreo albicans, in lateribus macula nigra, cauda parum divisa, mandibulis minutis, sed acutissimis dentibus alperis. Afellus i. onos antiquorum. Afellus tertius seu *Aeglefinus Rondel. Gess.* *Aegrelinus Bellon.* the Radock *Willughb. p. 170. Tab. L. m. i. n. 2.* *Sibbaldus, Hist. aum. in Scotia p. 23.* *Callarias Plinii*; *Schellfish Schonev. p. 13. n. 2.* Gadus dorio tripterygio, ore cirrato, corpore albicante, maxilla superiore longiore, cauda parum bifurca, *Artedi.* *Callarias, Gasteris, Gaxia, Haak, Voor John Charl.*
3. *Callarias barbatus*, dilute olivacei coloris, pinnis thoracis festolis. Bibar Blinds, *Corumb.* Afellus luteus *Raji.* *Willughb. p. 166.* Afellus mollis latus, whiting *Poutes Lond. Willughb. Tab. L. m. i. n. 4.* Afellus barbatus, *Charlton. p. 3.* Gadus dorio tripterygio, ore cirrato, officulo pinnarum ventralium, in longam setam producto, *Artedi.*
4. *Callarias barbatus*, dorso & lateribus super albo & viridi lutescentibus maculis pictis, ventre & gula argenteis, iride oculorum alba, cauda in exta aequali, pinnis ex cinereo viridicentibus, nostris. *Tab. I. f. 1. Helensibus: Orde Panamuel,* omnes antecedit sapore; quandoque ad 24 pedes excrefcens.
5. *Callarias barbatus*, lividis maculisque fuscis variis, gula ventreeque albicanibus, iride flavicante nigro mixta; pinnis fuscis; Afellus varius & striatus, *Dorich (Julius)* & *Epichemdorich Schonev.* qui quatuor pedes longum, raro speculaculo, vidit, cum communiter a pedali longitudine ad 14 pedes excrefcet, nec plus ultra. *Helensibus:* dicitur *Stein-Panamuel*, quod plerumque inter saxa vel litus in vicinia arenæ *Kaliphe* capitur; notatus paulo rictu, prout quidem omnes, valde hiat, unde *Chaper: Tab. I. f. 2.* Afellus varius *Jonstoni*; Gadus dorio tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda aequali, *Artedi.*

Tab. I.
f. 1.

Tab. I.
f. 2.

CALLARIAS,

Squamis minutis & tenacibus lavis. *Suscis: Torfik; Linn. Fauna Suec.*

6. *Callarias barbatus*, rostro nigro, iride oculorum albis; ab oculis ad exitum usque caute, in subellum terminantibus, pinnis dorsualibus & ultima post anum crebris densisque lividis ex flavedine nigris, pictis; pinnis branchialibus, gutturalibus & prima post anum, ut & extremo ventre sibus & nubiculosis; linea laterali alba, lata, recta; pinna ano proxima brevis, duplo major secunda cauda proxima; hæc cum tertia dorsali similis longitudinis & latitudinis. Pifcis toto corpore calligato; a pedes & quinque pollices longus; carne arida delicatulis esci non est. *Helensibus:* das Sdygerden, und das er lo maget, als ein Bbandh (vertegus) quod, ad ejus infar, corpore tenui & macilentio; raro venum exponitur; nullibi, ni fallor, vel pictus, vel descriptus. Iconisum ad naturalem magnitudinem fecit filia D. J. G. d. Jun. 1744, pifce a me antea non viso; squamas habet evidentes, sed valde tenaces. *Tab. II. f. 1. Tab. II.* dimidio minor in ære sculptus. f. 1.
7. *Callarias barbatus*, maculis ex rufo in aurantium colorem vergentibus; *Helensibus: Orde Panamuel*, quod rarissime littora salutat, sed in sinu Pucenti, ubi fundus maris, algis, fucis atque plantis herbaceis atque filamentosis seracissimus, constanter fore degit. *Tab. II. f. 2.* Tab. II f. 2.
8. *Callarias barbatus*, Hornbogen *Helensf.*, quoniam in arcum agitur, cum de hamo solvitur; lingua soluta, quam reliqui habent, carens; non nisi tempore æstivo capitur.
9. *Callarias barbatus*, corpore contracto, cauda sinuata. Afellus natus, cauda sinuata, acili duobus locis luxata vel fracta fuisse, *Dorich: Dorich, Krummet, Reis-Bisch,* dux reliquorum affellorum, *Schonev.* omnine felici capturz amplissima, ubi primumprehenditur.
10. *Callarias barbatus*, omnium minimis, ventre, præ reliquis, carinato (bist getadilet); branchiarum operculis & maxillis punctatis; dorso dilute fusco, ventre fordide albo. Afellus mollis minor, altilus omnium minimus *Raji.* *Willughb. p. 171. Tab. L. m. i. n. 2.* Anthiz secunda *Species Rondel. Gess.* an Merlangus *Belloni?* Mollo, vner. Cappelian, *Mollu* hveni esse *Rondel* dicit, sed male: sine squamis; quas tenues quidem, densissimas & tena-

tenacissimas habet. *Gadus* dorso tripterygio, ore cirrato; corpore lescunciali; ano in medio (*) corporis. *Artedi.*

(*) Omnium ascllerum anus in medio fere corporis, prominulus, sanguinolentus.

§. V.

CALLARIAS, imberbis.

1. *Callinoris*, dorso dorifere virefcente; gutturalibus pinnis albicantibus, reliquis & cauda brida nigricantibus; ventre albidio, lateribus ex viridi opacis; linea parum arcuata. Acellus virebens, *Robitumbe*, *Eco-Pere*, *Oxyphete*, *Sebenoe*, qui varietatem habet: Acellus flavicantibus, pinnis minoribus, lateribus ex flavo opacis, biancis *Robitumbe*, gelbe *Robitumbe*, linea laterali magis arcuata. Gadius, dorio tripterygio, exo inberbi, maxilla inferiore longiore a), linea laterali curva, *Artedi*.
2. *Callinoris* *apellus* maculatus; alaceris plus minus longioribus, aetioribus; ita ut fulvius spectet rem peraculorum f.
3. *Callinoris inberbi*, capite & dorso carbonis ad instar nigricantibus, ventre leviter albefcente, pinnis color ad instar nigris, argente infectis; an, Colvich *Beloni*: i) recte descriptus. Acellus viridis, carbonarius, *Robitumbe*, *Sebenoe*, *Whitling* p. 169. Tab. 1. f. 3. Gole-*Art.*, *Gold-*Art.**, *Rautila-Pollak*. Gadius dorio tripterygio, exo inberbi, maxilla inferiore longiore, & linea laterali recta, *Artedi*.
4. *Callinoris inberbi*, argentei splendoris, dorso canefcente, ad pinnas minus laterum radices macula nigra. Ejusmodi maculas & ad pinnas post minus irroratas habet, lineaque lateralem curvatum. Acellus mollis major, feus albus; an Merlanus Radol. *Gefin*: f. 1. *Whiting* *Whitlbg* p. 170. Tab. L. m. n. f. 5. Candidus pinnis *Sebenoe*; *Dann* & *Helenburg*: *Whiting* *Charlet*. *Whiting*, *Wiedling*; Tab. III. f. 2. In hunc Puccini & vicinia pagi *Heyl* 1741 capitur. Gadius dorio tripterygio, exo inberbi, corpore albio, maxilla superiore longiori, *Artedi*. *Sueri*: *Whiting*, *Wiedling*, *Linn*. *Favna* *Sueri*.
5. *Callinoris inberbi*, macula linea dupli (squamarum fere densitate); in dorso & lateribus tuberculis; in ventralibus & pinnis dorio pinnis dorifere longis, ad exortum caudae haud latae, cum fimbriae ex opposito. *Curvata-Pinnia*, *Brafil*, *Boito*, *Luft*, nificis *Cordocav* mazimidine *Margravii* b).

b) Dicht

h) Dicitur autem caret squamis, et tegitur solummodo cute in medio laterum; mox autem addit: linea — duplici squamularum serie inferiorem insignitur, et tota est *zoster*; — duplici serie *squamulae* notata. Sed *marginis* — glomerum itaque autem idem significat, quod *læve*; et *linea*, si ad lineam *lævis* — pilis notabiliter infersis, ut *læber* fit, non tunc corpore reliquo exiguum, est *lævis*, *squamulae* potius exiguae et *topicalia* producta, ut *læber* apparet.

[illegible]

Re sic comparata, utique ex analogia lapillorum affaci marini & fluviatilis conjicere licet, quod ille pariter ac fluviatilis crustam suam deponat, & ex marinorum lapillis nova crusta generetur, prout in fluviatilibus generatur crusta nova, ita ut cum lorica senectam deponant affaci utriusque loci.

Verum re potius curatus considerata, lubenter quidem concedimus, verum esse prius, quod scilicet lapilli amborum abeant in crustam, non tamen quod necessario sequatur & posterius: ambo alacris antiquum depone- rent loricam. Non negamus lapillis in alacris *marinis*, nec in dubium vocamus, generatos ad loca sua *nitida* tandem abire in crustam; eorum tamen abesse, ut sequitur, ergo quotannis nova ex lapillis alacri macini genera-
B
ratur

ratur lorica, ut succedat in veteris locum. Cum grano salis gustanda sunt, quae a Dn. Autore acceptimus; consideranda diversitas structurae lapillorum, horumque materia vel substantia diversa, quae in asiacis murinis facile confringitur & comminuitur. Substantia loricae asiaticae maxime porro diversa est a substantia lacustris vel fluvialibus; illa ad siliceam propius accedit & sonantem, haec cornes magis; illa durissima crassa, verrucosa ex senio etatis; dixerim itaque lapillorum materiam utque abire in crustam maiorem, hancque per itas susceptionem prout testa cochylionum vegetare c); etiam insuper pemo lacteus deprehenderis asiacum marinum sive mutationis proximum sive nova caque molli (ut in fluvialibus) lorica praedium, vel sub crusta, vel antiqua rejecta, neque crustam integram & antiquam vacuam nisi forte pinctuam anni nati; ceteram lautatus Dn. Strobeus lapillos frustula quae sicut in varis canerorum speciebus, in squillis inque *astacis* minoribus *celastis*, vulgo *Jungfru Hanneris*; & polito: dari nihilominus tamen, prout autumnanus, in *canceris* & in *squillis*; idem tamen dicendum de his, quod de asiacis maioribus murinis in medium protrulimus. Sed reverentius in viam!

c) Haec de re salis.

§ VI.

PISCIIUM BRANCHIIS APERTIS FASCICULUS OCTAVUS.

PSEUDO-TRIPTERUS i. e. post secundam pinnam dorsalem, versus caudam, pariter ac ex opposito post pinnam, vel potius post anum, qui *penicillis* filamentosis, aut, si fallant figure, *pinnulis* vel processibus *cuneatis*, triangularibus & humilibus, quasi *pelamides* dorsum tripterygium mentiens. *Artedius Ichth. P. II. §. 33. p. 17.* vult, non dari aculeos dorsii & ventris omnino discretos & solitarios &c; cum tamen eorum in *Glaucis* rationem non habuerit, rursusque pinnulas in quibusdam *scambis* in usum versent, & denuo pinnam secundam *Trutte* vel *Salmonis* cistaceam, sive adiposam aut cartilagineam omnino repperit? vide infra *§. X. not. a)* — Motum circa processum triangularem vid. *§. VIII. in fine.*

PELAMYS. *πτερυγία* Gaza Linnaean vertit, *Plinius* Limosam, *σαρὰ* τὴν τοῦ χαλὸ μύτι, quod in cetero se occultat; *Platareus* a grege, quod gregatim nuncat pelamydes; revera gregales sunt, prout balceae & alii pisces statim temporibus in greges coeunt. Qui in historia piscium deliderunt, illos letare non possunt, insipientie eadem nomina diversis, & diversa nomina fisdem piscibus imposita esse; quae *amphiblogia*, accedente rerum neglecta peritia, ampliam confusionem densaque tenebras in historiam piscium, simul ac in universam historiam naturalem, introduxit. Operavit aliquando

Gala-

Galenus: res posse tradi sine nominibus, ut *Sophists* & natura contentiosis, eriperetur de nominibus decertandi & calumniandi occasio. Sic *PELAMIDES* & *Thunnus* & *Cordylus* & *Orcynus* & *Pompylus* & *Melandrinus* & *Scombri* salutantur, quod *Cordyla* vel *Cordylus* esse dicuntur *Thunorum* fratus, *pelamys* minor *Thunno*, *Orcynus* maximus, & sic porro. Nonnulli *PELAMYDEM* pro genere sumierunt, alii *THUNNUM*, quibus *Tritoneum*, *Synodontidam*, *Sardam*, *Pompylum*, *Melandrinum*, *Scombrum* comprehendunt. *Artedius* constituit genus *SCOMBRI*; nos *PELAMYDIS* nomen genus adoptavimus, prae reliquis systemati naturali magis congruum, quod nobis cum *Bellonio* (*) multum absterium audit, *Pelamydes* ex *partus* *Thynus* originem ducere. Dicunt pelamydes sive *scombros* *quamvis* *carere*, nudosque esse, quod fallit; teguntur omnino squamis, nonnulli satis magnis, sed ita ad amissum compactis, ut incaute considerantibus iis carere videantur; dehiscunt coctione, tumque perspicue apparent tenui membrana contexti; unde est, quod ab *Aristotele* inter *leves* numerati.

(*) Ille «Ego *Pelamydes* cum *Thunni* aliquando constati, eundemque ambobus habitum figuramque deprehendi: pinnas, eadem ac *regoria* appendere utrique pinnas eademque forma toratos, verum etiam *Pelamydem* cum *grando* *scombro* si quando confusus utriusque eodem pinnarum ordine & corpore eodem pacto efformatum esse conspexit; sic quoque *Uclius* cum *Scombro*, & *Scombro* cum *Laetio* (*Psali* *grano*) conveniunt. Interim *Laetio* *Scleromus* *Saurum* *Saurum* *Saurum* esse constituit *fol. 122. b.* de *Thynnis* autem *scitis*, magna parva erodere licet. *Scandura* *similis* est *Thynnis*, nisi quod ille ex minoribus, hic vero ex maioribus est numero, *f. 127. a.* & *Strabo* *Thynnos* *pelamydes* vocat.

§ VII.

PELAMYS, — *penicillis* *psendotripteris*; vel quinquae, vel octo, vel decem. Singuli in exortu tenues, in immo dilatantur, radis caudam respicientibus. *Pelamydes* pisces cynosii sunt, vel ventre sint casso vel tenui. Dorsum in aquis plerumque sulphureum; extra undas & emortui pisces plumbeum habent vel caruleum nigresque maculis pictum; Praeter pinnas dorsales, duas laterales, totidem thoracicas, unam post anum; hanc *penicillat* *rot*, quod *pinnam dorsalem secundam* excipiunt. Os satis profunde fissum.

1. *Pelamys*, lineis nigris octo vel novem, a medio dorso in ventrem castrum obliquis, versus caput tendentibus; lateribus lividis, cauda fusca. *Pelamys* vera, seu *Thynnus*, *Aristot.* *Rondel.* *Pelamys* *Bellon.* *Amia* *Rondel.* (*p. 180.*) & *Willughby* *p. 109.* *Am* *Welch*, *Pencer?* *Pelamydem* male interpretantur. *Scomber* pinnulis octo vel novem b) in extremo dorso ex fusco ad pinnas ventrales, *Artedi.*

b a

a) Qui

a) Qui Amiana pro Thyngo habet, cum tamen Roszel. diversitatem docet.

- 1) *Furte: limas ovali vel ovatus; nam Bellini Pelamys non nisi quinque parvulus in totide colligendos perit annu habere; nec uteli qd, quid parvulus ex foliolo duri ad primas ventres indiguit volentes tolerabilibus nutre, qui & Amam Andalusiis pro Cusaco quidem p. 179. habet.*
- 2) *Pelamys, maculis latis & transversis; sibi pinhis brachiorum squamis exasperatis; pinnullis vel septem; ventre crassio. Tab. III. Plinii. Arbernet. Pelamys five Sarda Rondel. Gefn. Willughb. 179. Tab. M. f. 2. cauda innata. Arredo eadem effi cum precedente.*
- 3) *Pelamys, pinna dorsali fœmida rubro aut flavo colore infecta; pinnullis octo vel decem; caudæ gracilis pinna erectilens lunata; juxta eandem curv in quadratum tenuata. Thyanus seu Thunnus, Bellini, Gefn. Aldrov. Orcynus Rondel. The Thunnifish or Spanish Makrel, Willughb. p. 176. Tab. M. f. 3. quandoque septem pedes longus c)*
- 4) *De penibus Willughbii novem, interdem decem, pinnullæ æguli prope spatula facientes ad eandem usque extenduntur. Hæ in exorta exorta in fœmæ d'istort, radii longæ, eandem spectantibus, cum tamen in figura (Tab. M. f. 3) non possint, sed invertea penne penitus propea caracæ in exorta latis, infœmæ autem, humilis, tria quatuor & sequentibus apparet.*
- 4) *Pelamys, lineis obliquis ad dorso, brevibus, & nigris punctis notata. Crurum, ad vici infra, disparato, ut optici nervi conspicui sint, cauda diffusi; evidente lunata d. Colas Rondel. Arhen. Gefn. Willughb. p. 182. Tab. M. f. 1. Monedula Græc.*
- 5) *Squalus integrus parvi & tenuis; Willughb.*
- 6) *Pelamys, corpore castigato; lateribus & capite argenteis, dorso ex creruleo viridi, nigricantibus ductibus rectis, incurvis & flexuosis; pinniculis quatuor; cauda pinna forcipata. Tab. IV. f. 3. Rondel. Gefn. Bellon. a Makrel or Makrel, Willughb. p. 181. Tab. M. 4. Cavallo, Scombrus, Macarello, Salvatini. Moteste nobilis aliquid, quodammodo, quodammodo, notaque littora prægantis salutatis; communiter pedalis magnitudinis e). Scomber pinnullis quatuor in extremo dorso polipetigro, aculeo brevis & immo, Arvedi. Scomber nudi petoralium viginti, dorsalium duodecim, Succi Makrlj; Linn. Fœmæ Sæc.*
- 7) *Quomodo Cellas & Scombrus inter se differant, vid. balæum fol. æg. 2. qui*

Tab.
14.61.

tamen vapulat, quod stombrum omni no liquum carece dixerit. Sie schmecket frisch
gestochen oder gebrochen, denen, die Fisch-fett lieben, sehr gut, sonst etwas erlichse.
Andersson p. 99.

6. *Pelamys*, albo penicillis in caudati tempore, corpore omnino cinereo, hinc laterali et ventrali parva alba et alius recte latiusque latius, cauda recta, Guni. phaeo. (Kongsiu, Pusan, H. N. p. 59. *Margy*, p. 179. Alb.) "Si ad species europaeas referatur, in misceatur legatur, autem, quam Pelamys dicitur, et hinc Aristoteles convenit, quoniam corpore proceritate et corpore, ut in eadem, quoniam digitate, atque ad peret, *Wright* p. 16. Tab. 15. f. 1. Guni. hinc et comitatus cum *Margy* p. 16. Tab. 15. f. 1. et *Pearl*, in misceatur, autem, ad eadem, dicitur.
7. *Pelamys*, albo et fusco variegata; pinna prima dorsali ad cervicem usque, secunda usque ad pedem longius; finili postrema; postbranchialis brevior; ore circumdata; fuso laterali loco carinae, quodam subfinita per integram longitudinem elevata; corpore minutum spinatum. Albacore fise Thyinnus, *Sloani* H. Jam. p. 12. Tab. 1. f. 1.

§. VIIL

- [illegible]

entacea Salmonis idem prolat, quod altera pinna Dipterorum, five sit cartilaginea, five ossis radiata & elevata epae membranae ossibus alligata; sic non comprehendit, quae per secundam Salmonis pinnam esse membranaceam, globatam & adipo-^{sa} non interjeta membranis mollioris & humidis, de qua ratione quatuorque promiscuit, et appendicem membranaceam nullam usum in aquis habere. Ita, nec; opinus autem quod natura quicquid facit laetetur.

[illegible]

§. XI.

TRUTTA — altera pinna dorsali cutanea; Dipterus piscis.

Præter duas in dorso, totidem ad branchias & in ventre habet pin-
nas, unam post anum, inermes. Sunt vel *dentate* vel *edentule*.
Ille plerumque & in maxillis & in palato, & in particula illa
cartilaginea vel musculofova vel ossea, quæ lingua dicitur, recurvis
vel hamatis dentibus abundat.

Dentata.

1. *Trutta* tota arctica; maculis fasciisque a dorso subfusco ultra lineam et in pinna dorsali variegata — (quandoque rubris vel flavicantibus aut aureis maculis picta) a). Salmo autotimus, vel magnam molem excrefens. *Tréb. V. f. 1.* Salmo cinereus, aut griseus, *Jonstuni, Rapi p. 63.* Salmo *Schonefeldi, Solani sol. 100.* *Willughbi p. 103.* a) Salmon the Grey p. 129. Iquams cingius pro corporis mole et acubus. *Rafes.* Salmo maculis excisus, cauda extremo aquali. *Arcted.* — Salmo rostro ultra infremum maxillam sepe prominente, *Arcted.* a) *Tru-*

Tab. V
f. 1.

TRUTTA

[illegible]

2. *Trutta dentata*; toto corpore, ventre extremo excepto, crebris ac
diversis characteribus ac lituris cinnabarinis fuscisque vario, man-
dibula inferioris extremitate insigniter hamata & in superiore
intrante b) dentum loco maxillis ipsis obtuse serratis, *Tab. V. f. 2. Tab. V.*
Ladeforelle, Gangrich, Rheinlande, Jünländ, Kleinlager. Hæc f. 2.
C *Trutta*

Trutta

TRUTTA

Trutta Salmonata anno 1661. d. 14. Jan. in Motlavia intra Civitatem Gedaniensem prope hortum nostrum; ad locum qui Wrabanek vocatur, iuxta glacie capta 42 libras pendens, longitudine 42 pollices superans. Hujus figuram, licet non ex omni parte absolutam, videris inter tabulas *Gerbuwaldianas*, nondum editas. Similis est *Salmoni*, maculis characteristicis picto, sed maxillis aequalibus c) *Marfus* Op. Dan. Tom. IV, 1. ub. 27.

17. *Colobus* de ad naturalem pacis magni ad rem a Sam
Anno 1653. d. 14. Jan. de tunc 1703.
1703. a. m. d. 1. de tunc 1703. a. m. d. 1. de tunc 1703.
den an der Universität zu Gießen.

e Ruedes ad insulam anteriorem Salomonum fariam recurram vel undatam esse, sed
in v. l. m. ap. s. non affirmat bellonem. Piskatores britanni in mare tantum cu-
runt et in p. m. qm. aut; et Gauranus a Yoshino acceptum habet, in mare
tanta volente et p. m. qm. de effe. in undam curvat, que continet ad superio-
rem appello toramen in ea fish exeat, uno poltrum extremum interd. v. gentis
percutit aut. W. v. h. p. 226. Dicitur et Yoshino vocantur et Aut, dicitur v.
toratur um formam esse pediculus, nostrum narem.

- [illegible]

d) Nella Malesia, ed intorno a Telfia nell'Albi li maggiori salmoni s'istendono da 24 a 36 libbre; nell'Eiveta presso Zug alle volte se ne pigliano di 40 libbre; *Alie Serpentina*, *serpes delle maras, della natura p. pag.* con Weigh Ober, Ergebb. XIV. Gents. (3) :

5. *Trutta dentata*, lateribus, ventre & pinnis maculis flavicantibus pictis; dorso nigricante; Salvelin Germ. Salmo pedalis, maxilla superiore longiore. Art.
6. *Trutta dentata*, dorso e viridi olivaceo, maculis albicantibus subobscuris, pinnis pronis rubescentibus. Umbra minor Aldrov. Gesn.
- Torgoch

TRUTTA

1. *Argoch. Willd.* Reutele *Germanis* aut Roetele; *Willd.* *g.* p. 106.
Tao. A 7. *Pinus* a stran figura non habet, nec maculas albi-
 entis, 7 a. *Cedren* *et* *h. maculis ruberrimis*; Möll. *Dau-*
dit *Sili* *et* *pa* *caulis*, *peti* *et* *venis* *et* *br.*, *maxilla* *inferiore*
pa *et* *ca.*, *Arct.* Me iudice, hoc *Truta* gustu *et* carne
pa *et* *ca.* *et* *ca.*

- 7 *T. laticornis* rostrum carulefcescente & prominente, dorso cineritio,
gula & subcapite vario, lateribus & ventre argenteis, cranio pellu-
cido. Soma pede minor, quinque dentium ordinibus in palato
e) *A. laticornis*. *Carpio Benacensis*, *P. Jovis*. *Carpio lacus Benaci*, *Reli-*
gionis. The Gilt charre, *Willughb. p. 177. Tab. N. 5.* *Carpione Sa-*
laniani *fab. 99.* Inhi videtur varietas precedentis & dicitur *Carpio*
piscis pretiosissimus in Italia, *L. C. L. II*

Che beve malvasia & mangia Carpion

In capo d'an va in prigion.

8. *Trutta dentata* dorso & capite dilute ex viridi caeruleo-fenestris; maculis nigris undique & in pinnis adiposulis apertis. Vertus extrinsecum cauda macularum ordo transversus; cauda forcipata. Trutta Salmonata Gallorum. Trutta lacustris Germ. Aldrov. A Salmon, Trutt Willughb. p. 198. Tab. N. t. f. f. Salmo cauda bifurca; maculis solum nigris, sulco longitudinali in ventre, Ardeti

- 9 Trutta dentata nigris maculis parvis, vul nigris & rubris apertis,
ventra argenteo. Si maculas nigras habet, Fornio, Forio, Rofeo,
Gozelle, Gedan. Si nigris & rubris confecta, ruginosa, quatuor ignis-
tus, vul ardens, Goltzboe, Gedanusfius Lachyfoe, Tab. V. f. 3. Tab. V.
Zim Meifen. Zier-Gebürge sind die Waldstörche, Zedendorf f. 3
gelbe, Zedendorf gar gelblich all. c. cap. 2. Salmo maxilla inferioris
paulo longiore, maculis rubris, Arzetti. Trutta fluviatilis Germ.
Rond. Bellon. & aliorum s. Trout Willughby, p. 199. Tab. N. 4. f. 7.
Trutta Marulli Op. Dan. Tom. IV. Tab. 26. Innumere intra et
extra Gedanum quotannis invadunt.

10. *Trutta dentata*, ore valde fisso, dentibus innumeris in utraque maxilla; inferiore longiore; squamis medioocribus, fuscisq; ventre per integram longitudinem albo, cauda furcata; inde rubente. Saurus ex cinereo nigricans; the Sea Sparrow-Hawk, *Caterbeji* p. 2. f.)

5

f) *Sarros maximus non maculatus*, the Sea Nettle, or Schiffs *Slane* p. 284. *Taf.* 27, f. 1. unicam pinnam habet in medio dorfi; forte alteram cutaceam non obstruunt *filicr. antea*.

11. *Trutta dentata*, dorso oblique ciserinto, ventre argenteo, squamis densissimis, cauda bifurcata; ad osse pulcritudinem lino. P. larus, *Randel*, & aliorum. *Epeanus Bellon*. *Spirinacius Schonvelderi*. *Stenichthys*, *Stint*, *Sinulet*; ad palmos dorsi ext. cernis. Osmorus radiis pinnae aut septendecim, *Arctid*. De illo *Schonv.* Os habet dentatum, ut & linguam — Pinnae in medio dorso unan, fimbriae confanctae octo aut novem; alteram *Trutta* aut *Albulæ nobilis* infat, *adiposum* vel pinguem. Feb. ex. concenat inmodice utentibus. Elixa cum aceto, cui infricatus raphanus, comesta & ex butyro fira melior; plerumque sale compulsi & dolis exceptus exportatur Hamburgo.

6. XII.

12. *Trutta cinctula*, tana argentea, femidaphna, plerumque trium raro quinque cinctum; reccis ingrati odoris; elben cubus papparo, quam tamen & divites, iulculo ex acet & burreo fervefacto, aliquando appetunt; piliculus cum offibus & viceribus confilumendus, qui prerogativa nemo piscum edulium gaudet. Stincus vulgo; *Pruffis*: Etlin. Albuli minima *Genz*, varietates videntur: Albuli caerulei *Genz* & Bezola, *Rondelet*. Tab. IV. f. 2. 3. 4. an Coregonus cinctulus, maxilla inferiore longiore, *Aristed*? *Kuibe* Etline, *Koenigsmeyer*. *Schneuw*, p. 71.

13. *Trenta edentula*, dorso ex viridi-caruleo & argenteo resplendente, lateribus carinatis, post lineam tota argentea, ventre cutellato. Albulæ Gedan. Dente Echæ, *Pomeranus*. Tab. VI. f. 1.; in Terra-
leus Lemani descripto Genevæ similis, *Rondelet?* Willughb. p.
189. in Albulæ nobilis *Shonev?* ut putat *Rapier*, Willughb. 19.
Curinatæ Brasiliensium Marcgraviæ similis. Coregonus maxillæ
superiore longiore plana, pinnæ dorsi officulorum quatuordecim.
Arctidi.

14. *Trutta edentula*, maxilla superiore rotundata, inferiorem superante. Oxyrinchus, Hautin & Outin, Flandris; Rondeletii, Germ. Aldrov. Willughb. p. 187. Tab. N. 1. f. 3. Coregonus maxilla superiore longiore, conica; *Arsch.* 2)

g) Pungitur dorso *eripiternis*; sic & apud *Aldrovandus* pinnis tribus inaequalibus
spatiis a se in vacem distantibus. Sed ad hoc *Willughby*. in Hollandia frequens una

Tab
IV.
f 2 3
4.

Tab.
VI.
C 5.

nec aello velis: sine brevis otiosi errandi in numero pinnaos dicit: *Romuleus*
 verum quicquid fecerit latius otiosus in dactilo perperam attribuit. &
 paulo patet. Inter funtium collum & pinnae dorsale antepinnae initium intererat
 digressionem $\frac{6}{2}$, hinc ad initium pinnae posterioris *ve carilligina* digitis erat $\frac{4}{2}$.
 Ergo ad Trutras referendus est plicus, qui in suspensio reliquamus. *Alfio* $\frac{1}{2}$ =
 p. ad. Sed quod *Winkelgheyl vel Rojai*, *Romuleus* culpas non meliores, *epi-*
 tas deducere, cum melius descriptum plicem, qui in mandus habetur?
Sellm. Piculem, quem *Romai* Argenti nam vocant, a *Gallis* *Meris* appellari fir-
 ve, ut notavit *ardens* *libro* $\frac{1}{2}$. *Argenti*: longius in *Sphyranam* vertit: sed
 quonia fit consilio de *Sphyran* secunda specie, vid. *Crimen*.

15. *Trutta dentata*, labiis, pro dentibus, lime ad inflat exasperatis, ventre plano, dorso repando & in acumen contracto, imbricis vix tenebrosis. *Eggs*, *Aësch*, *Aësch*, *Aësch*, *Marmar.* *Imbricis* *fluviatilis* *Watson*, *Rond. Brill.* *Lavaretus*, *Thunero*, & *Thymallus*, *Bellon.* *Thymus* *Salviani* *f. sp.* *Thymallus*, *Albrecht*, *Thymallus* *Gen.* *Gryling*, *Omni*, *umber* *Angli*, *Willughb.* *p. 127*. *Tab. N. 3.* *Eggs* *Eden*, *Graculus* *piscis* *piscis* & *laubris*. *Tab. IV. f. 5.* *Corveo*, *Th.* *maxilla* *superiore* *longiore*, *pinnæ* *dorsi* *virgini* *triun* *oculorum*, *IV. 6.* *rum*, *Arædi*. *Aësch* *ist* *in* *Deni* *Br.*; *Salm* *ist* *in* *Gen. Gen.*
16. *Trutta dentata*, ægænto toto, squamis tenebrosis; inferiori mandibula imbricata. *Marena*, *Murene* *Sechevaleri*. *Warne* *officis* *Tab. VI. f. 2.* *melius* *Moryna*; *alibi* *Silencia* *lucetis* *fate* *piscis* *704*. *in* *Bavaria* *Immer* *nuncupatus*. *Beyler* *Exer* *Exer* *Exer*, *J. Th.* *pl. 78.* *Piscis* *delicatus*, *vel* *sile* *vel* *sumo* *coctus*, *ex* *in* *credibilibus* *multitudo* *in* *lucibus* *Cassibus*; *Sub* *glacie* *capitur*, *mortem* *alio* *hibens*, *liberi* *erpi* *in* *periculis* *capitur*.
17. *Trutta dentata*, inferiori labio lunato, membranoso, ad latera ossis utrinque in cirrum delincente; pinnæ carinæ prope caudam, spinæ conculcatae; capite ad actum imbricis, colore doli prope maculosus. *Gucieri* *Morg.* *Willughb.* *p. 277.*

§. XIII.

DIPTERORUM, *pinnis* dorsalibus *radiatis*, plus minus aculeatis, hactenus VII. genera offendimus, quorum

- 1 MULLUS. Inter cataphractos & Coriifiones, five pisces galeatos, (Missa IV.) euculos quidem, corvos, hirundines, milvos, Lyras, Lucernas autorum habuimus, quos Arredus TRIGLARUM nomine investivit, nullos tamen Mullos; cum Mullus poins & verteribus relin & receptioribus

C

GOMIO

4. *Gobio* vix 13" longus, in pinnis dorso & lateribus transversis fuscis variis; corpore tenui, apertis; dorso latiusculo, venter prope apertis; oculis prominentibus albis; pinnae sunt *Gobionina*, maxime illa ad ventrem. *Joannes* tenuissimus *Tab. VI. f. 3. n. 1.* *Abu-cobates Aldrov. Rondel. Mario venet. & Pignatelli. Willg. p. 207.* *Gobius Aphyca d) & Marlio dictus, Arde.*

Tab.
VI;
4

5. *Aphyca* h. e. *dur* *dur*, quasi non nata; *dur* *dur*, nimis pulchro corpore, vel nimis omnino creberrime. *Tab. VI. f. 3. n. 1.* *Abu-cobates Aldrov. Rondel. Mario venet. & Pignatelli. Willg. p. 207.* *Gobius Aphyca d) & Marlio dictus, Arde.*

6. *Gobio* candidus, aliquando rubescens, nigricantibus oculis; in Ligulico litore; quem *Rondel.* *Aphyam* veram vocat; a rubedine *Rondel.* ab albedine *Blanchetti* *Genuent.* *Peici* novus, *Roma, Bel-*

§. XVIII.

VI. ASPERUS US. ASPREDO. *Budel, Bâgel, Strever.*

Ex squamis parvis, duris & elevatis asper; ventre equaliter in caudam gracilescente; capite macro, superne & ad latera preste; pinnis in dorso equalis magnitudinis; sculeans; duabus branchiis, eodem ventribus, una post anum.

1. *Asperus*; dorso acuto, squamis vel elure fuscis & nigricantibus arcuatis vel radiis solaribus multum exaltis terrae similibus, iterumque nigris arcuatis notatis; alba albescente; ore medioeris dentata; pinnis in dorso acie furvis, & ubi exteinte, pellucuntibus. *Piscis Danubianus Ahrvandi L. f. c. 28. Asper pisciculus I. Manfili. Op. Dan. Tom. IV. p. 27. Tab. IX. fig. 3. Zingel Ger. diversus ab aspero Randel.* Idem erit *Aspredo* *Joan. Caji* rar. anum. hist. (*) Similis piscis, toto corpore asper, pinnis spinosus; in Britannia, praecipue in Hervo flumine frequens

(*) Qui ejus rariore opuscula, quae primam Londini anno 1770 & 1774 exco, non vult, consulas eadem a Du. & Fels. M. D. recognita & Londini 1789 recusa p. 107.

§. XIX.

VII. TRICHIDION

Trichion, vocis *Aristoteli* est piscis, qui ossa habet pilis similia. *Trichion*, parvus *Trichias*, *Aldrov.* Licet captum superent ossa pilis

TRICHIDION

pilis similia, tamen nominamus *Trichidia* pisces dorso dipterygio & pinnis branchialibus, vel ex squamis pilosis.

1. *Trichidion*; corpore oblongo, ore acuminato, amplo, edentulo; a indubili *Cepi* longiore; iride aurea; pinnae praeter caudam septem. *Tab. VI. f. 3. n. 1.* *Abu-cobates Aldrov. Rondel. Mario venet. & Pignatelli. Willg. p. 207.* *Gobius Aphyca d) & Marlio dictus, Arde.*

§. XX.

Dipterorum plures dari, nobiscum convenimus quidem, quos tamen vel a suis autoribus perturbatos ad certum numerum revocare vix ac ne vix quidem fidem nobis habemus. Schemata quippe pariter ac historia adeo fallant, ut nihil facilius sit, quam pro capientis piscibus, nosmet ipsos in retia illabi. Interim tamen operam nostram historiae redintegranda despondimus, ubi vel repetitis lectionibus auctores pisces scilicet *Trichion* & *Trichidion* similis illis restituere integrum nobis erit.

§. XXI.

PISCUM BRANCHIIS APERTIS
FASCICULUS DECIMUS.

PSEUDO-DIPTERUS; Pseudodipteros decimus pisces, qui vel ante pinnam dorsalem, cauda proximam, aculeis nulla inembra contentis, vel ante pinnam dorsalem longam pinnulis aequales, vel duobus in capite cristati sunt b).

a) Sic *Rondel.* & *Willg.* de *Clavus* & *Manfili* in *Tab. VI. f. 3. n. 1.* *Abu-cobates Aldrov. Rondel. Mario venet. & Pignatelli. Willg. p. 207.* *Gobius Aphyca d) & Marlio dictus, Arde.*

b) *Trichidion*, & *Trichidion* gale proxima; sic non in *Trichidion* cum *Trichidion*, & ante pinnam dorsalem, quae plerumque ab initio dorsi exorta, ad caudam usque, continuatur, processus pinnosus & rugosus occurrunt vel in *Trichidion* & *Trichidion* videntur. *Pseudodipteros* itaque duos nominamus: *GLAUCIUM* & *LEUCIUM*.

L PERCA

durs, Carolinenses *plerumque uncam, ventrales*; omnes post
anum *unicam*; illas *incrines*, hanc *sæpius vel uno vel duobus*
radis prioribus acutis sustulit; squamas *densas, duras, asperas*.

$$a) \quad \epsilon = \frac{1}{2} + \gamma, \quad T$$

1. *Percia*, pinnis centralibus dactylis; aequalis nigricantibus a dorso in
 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

б) Уπόδω Επιστολήν ἀπὸς Ἀθήνασιν Lit. II. fol. 119. αἰόλας vocat. i. e. variat.

2. *Perca*, buccis crassius, canalis (segmenti globi forma) pinus ventralibus duabus et totis ex cinereo argenteus; pinosis dorsilibus maeulosis, capite nigris productis; dentibus caninis in utraque mandibulum extremum, superiore paulo longiore; inde aures; linea laterali fimbriata c). Lucio *perca* Geisneri, Schönew., aliorum Zinnar., Zandier., Zand. Lucio *perca* Schult. f. Nageusalium Germanorum., *Gera*, paridip. Lucio *perca* Schell., *Small Marjuli* Tab. 22. *Hyphent* Verling; *Schönew.* *Perca* pallide maeulosa, dentibus utrinque majoribus, *Arctici*. *Perca* pinosis dorsilibus distinctis laetecida radiis viginti rubris, *Gies* *Suec.* *Linn. Fauna Suec.* *Willingbachi* figura nihil valet; meliorum vid. Tab. VII. f. 5.

Aliquando viginti horae prodant. Antiquis incognitis sunt pueri. *Attendantur di-*
vinetur: Afilius a *Danis* & *Baragis* Zandur vel Zandart appellatur, alii arena, qui omnia-
ber septemtrionem hinc Eandem dixerit, cui fa Afilium & alios pices abdon-
dere scribit *aripetiles*, non nisi dulcibus & dulcia aqua gaudet. Magna ejus copia
in Prussia, exortus vix pauperum cibis: in Germania natus longe lateque trans-
mitur.

L PERCA

instituitur, imprimis Francofurtum ad Viadram in Saxoniam. Adibi saltem quoque desin-
ent exceptis distribuitur.

4. *Perca*, *pinnis duabus ventralibus*; dorso altoiore ventre; squamulis argentes et auro splendentibus; in lateribus septena magnus flatus longitudinalibus, coloris fuscii lucidi; in capite nigra lata linea deltoconatus utraque, ore caruleo, pinnis et cauda divisa luteis iride rubra, fulco et alba mixta. *Aura pinna figura perca minime, Margravii. Sloane It. Jonata.*
4. *Perca*, *pinnis duabus ventralibus*; dorso elevato; pinna post animi firma spine munita; docti medietas pinna spinosa in rima reposita; bulbis; cauda bicorni; squamulis argentes aliquid auri repletentibus; in lateribus lineis crassis aureis duabus, limbo cupri livescit; ventre albo; pinnis cinereis; iride argentea. *Capena, corpore oblongo, Margravii.*
5. *Perca*, *pinnis duabus ventralibus*; firma spine munitis; dorso et ventre pifcis ovatus est; squamis argentes splendentibus ex paululo auro, *Fenille mris*; pinnis cinereis; cauda divisa; in ore supra et infra orificum habens, dentibus minuis praeditum; iride auri cum albo mixta. *Piramba, Bras. Chayquirona, Lufie. Margravii.*
6. *Perca*, *pinnis duabus ventralibus*; in inferiore mandibula dentibus ad acicularum initium, in superiore duobus longis et crassioribus, intercedentes minutissimis munita; iride languinea ex auge fere; media parte pinna dorsalis in rima repositis; et cauda fere tota squamis argentes languineo color umbratis; ventre et faucibus albis; pinnis, praeter ventrales, languineo coloris. *Acanyma, corrupte Garani, Margravii.*
7. *Perca*, *pinnis duabus ventralibus*; dimidia dorii spinosa arcuata et in rima repositi, ventraibus circinnatis, alia post animi dura et acuta; pinna mixta; cauda laxa; tota argenteo coloris; in dorso unitatis; ventre albo; pinna dorsali, apudque ventrem non defendentibus; umbra arentis; ore denticulato. *Corocoro, Margrav.*
8. *Perca*, *pinnis duabus ventralibus*; cauda subrotunda furcata; ante pinna branchias aculeata; pinnar et in ventralibus; squamulis
- b 3
- luratis

4. *Pera*, pinnis duabus ventralibus; dorso elevato; pinna post aunum
frena pinna muata; dorfi medietas pinnae ipinoia in rima reponi-
bus; cauda bicorni; squamulis argenteis aliquid aurei resplen-
dentibus; in lateribus lineis crassius aureis duabus, summo capite
livescante; ventre albo; pinnis cinereis; iride argentea. Cape-
na, corpore oblongo, *Marcevaui*.

- 5 *Perca*, pinnis duabus ventralibus; fixa spina munitis; dorso & ventre piceis ovatus est; iugum argenteis splendentibus ex paulillo aureo, *Fenile mors*; pinnae cineris; cauda divisi; in ore supra & infra ossiculum habens, dentibus minutis praeditum; iride aurea cum albo mixta. Piramiba, Bras. Chiquarra, Lufit. Margarac.

6. *P. r.*, pinus duobus ventralibus; in inferiore mandibula dentibus ad aculeum inflexis, in superiore duobus longis & crassioribus, intercedentibus minutissimis munitis; iride sanguinea ex argenteo, media parte pinna dorsalis in rima reponibilibus; cauda fere equali; funimus argenteis langoineo colore umbratis; ventre & faucibus albis; pinis, præter ventrales, sanguinei coloris. Acanthia, corrupte Ganatha, *Margravii*.

7. *Perca*, pinnae *subab ventralibus*; dimidia dorsi spinosa arcuata & in rima reponibilis, ventralibus circinctis, illa post aum dura & acuta spina nixa; cauda lata; tota argentei coloris; in dorso umbratilis; in lateribus octo stris, adque ventrem non descendentes; ventre albo; pinna dorsali, postbranchialibus, & cauda ex dilata umbra argenteis; ore denticulato. *Coroico, Marzag.*
Desp. H. a. l'ep. p. 301. Cornicinis affinis facie; cum ex descriptione pro *perca*, pinna longa interrupta, habendus.

8. *Ierca*, pinnis duabus ventralibus; cauda subrotunda furcata; ante
pinnas branchiales aculeata, pariter & in ventralibus; squamulis
l. 3 seratis.

1. PERCA

lertat, argentea; capite supere incarnati coloris & hispidio; pin-
tis omnibus rufi coloris (Willingb.), preter anteriorem dorsilem
spumofam ex auro umbratam. Super oculos macula tanguinea;
iride argentea. Jaguaraca, piscis medicinis perze magnitudine,
Margravii.

9. *Perca*, pinna unica ventrali; ore amplo, squamis ex auro umbra-
tilibus, pinna dimidia dorsi, cum pinna ani & cauda vixilis,
rubentibus. Is had fix Fins, one of the middle of the Back of a
triangular Form, one extending from thar to te mil of a red col-
our &c. *Perca* marina, pinna dorsi divisa; the Croker, *Cate-
beji*, Tom. II. p. 3.

10. *Perca*, pinna unica ventrali longa; ore parvo; tota rubra, preter
ventrem & duas spinas anteriores pinnae ani albicantes; posteriore
parte pinnae dorsalis longissima; anterior 12 aculeorum, quorum
quatuor & quintus altissimi; cauda insigniter forcipata; *Perca* ma-
rina rubra; the Squirrel, *Catebeji* th. p. 3.

11. *Perca*, rostro retulo, ore denticulato, anterior pinna pars octo
aculeis, posterior radiis inenibus (vel, ut loquitur *M. cath. 11*,
nullis aculeis) Cauda lata; squamis laeis & obliquis; corpore
paulo longiore quam latiore (Salvian, umbra d), ombrina, *Salviani*
fol. 115. Willagbb. p. 306. *Tab. S. 19.* Sciencia, ex nigro varia,
pinnis ventralibus nigris, *Arredi*.

d) vld. Supra §. XIV. *Oficium* p. notam c)

12. *Perca*, rostro retulo, appendice brevi in inferiore maxilli & ro-
tunda; ante oculos incutibus amplis c), squamis latiusculis cereis,
ventre argenteo; dorso & lateribus arcillis latis, obliquis, undu-
tilibus, aliis favis, aliis liventibus, alternatim politis; extremis
operculis branchiarum pinnisque nigris f), uno aculeo rigido
pinnam post animum suffulcente. *Rogantios*, *Coracinus*, *Corvo*
Salviani fol. 118. b. Willagbb. *Tab. S. 21.* an idem, qui *Salviani*
an *Coracinus* albus *Rondelietii*?

e) *Salviani fol. 117. b.* has membra admodum amplas audita, & c) & f) citis necesse est
dicit

f) Unde *Coracinus*, *Corvinus*. *Atheniens Lib. 7. fol. 111. q. 81.* consueverunt multa
genera esse tenet; quae *Salviani* declaravit *fol. 118.*

13. *Perca*, tota fere nigricans; aculeo ad pinnam ani rigidiore, lon-
giore; rostro retulo, non verrucoso; ceterum cum precedenti
conve-

I PERCA

conveniens, sed multo minor. *Coracinus niger*, *Corvo* di for-
tera *Rome*, *Salviani fol. 118. b.* *Coracinus niger Rondelietii*. *Wil-
lagbb.* *Tab. S. 20. g.*

g) Alii pinna *Willagbb.* piscem, quem *Salviani*; hic pinnam dorsilem interruptam
haberi, ut in *perca* apparet; ille ambas pinnas duobus humilibus acutum membra-
nue conjunctas. Forte *Willagbb.* calis in duas fuit (de quibus supra nota a
§. XXIV. media.

14. *Perca*, capite mox a tergo declivi, pinnis duabus ventralibus, ocu-
lis magnis, iride aurea, pupilla nigra; branchiostegis lamellis &
lateralibus argenteis, dorso, rostro, gulaque flavicantibus; cauda
aequali; per latera a branchiis caudam versus descendunt g vel de-
cem lineae, aquis intervalis, aureae, punctatae; *Mus. olim nelli*.
Tab. VII. f. 5. f. inferiori mandibula paulo longiore. fob
vii
f 5.

§. XXVI.

Pinna unica, LONGA (sinuosa).

II. PERCIS. *Angida* & *perca* eundem piscem Graecis appellasse iudicat
Salviani, qui incuria *Plinius* accusat, quod *Lib. XXXVII. cap.*
XI. PERCIS & PERCIDES nominat, ita ut utriusque varia tri-
but; *perca*que *Salviani* a *percidem* alium piscem non esse con-
cedit, cum tamen ipse minus accurate *Perca* *Channe* & *Peyda*
similimum esse dixerit, quod majorem incuriam involvit. A
qui bonique faciamus distinctionem *Dioscoridis* & *Plinii*, quod *Per-
cam* & *Percidem* unius quidem generis esse, inter se tamen vel
vois quibusdam specialibus differre cognoverint, velu capite,
aculeis iuxta membranas branchiostegas, spinas etiam in medio
branchiis, denticulatis erantem apparentibus, pinnae dorsi una ob-
longa & continua, imo colore, quod antiqui *PERCAM* simpliciter
variari dixerint, *percam* vero fluviatilem nunciam *PERCAM*
auratam, unde *Aquila Tragii* (*Gen. Aldrov.*) *Aspreto Jo. Casti*,
vel etiam a dorso, ad porci fere in modum declivi, & uti porcis
hastis, quare non absurde *xolpis*, porcus fluviatilis *Strabonis* a)
eiusque vestigiis. Obviat autem sit, cum *Dioscoride* & *Plinio* er-
rare malimus, quam praeferat omnem necessitatem ambos negli-
gentiae acculare. Moncat *Perca* (quae *perca*, porcus *Frysi*)
PERCA b) pinna dorsali continua, seu sinuosa, anteriore medietate
spinis pungentibus suffulta, posteriore raditis mollibus inermis, in
concursum sinum plus minus altum formantibus; cum simpliciter
Perca

II. PERCIS

Percia habet dorsum monopterygium quidem, aut pinnam fuleo nobiliter interruptam, ut incipit bipennis vix fuerit huc, atque. Convenit in super PERCIDES cum PERCA in ea, quod aures gaudente pinis vel sex, vel quinque, domo cauda, i. e. aut unica dorsali, duabus post branchialibus, totidem ventralibus, & una post anum, aut unica dorsali, duabus postbranchialibus, unica simplici ventrali e) & una post anum; sed differunt simul a PERC 1 & inter se, quod vel aliqui non nisi tres habeant pinas, scilicet unicam dorsalem, unicam ventralem & unicam post anum, nullis post branchialibus d).

d) Vid. placiens §. XXIV. not. a).

e) Percidem Generum quatuor, *Cajus* Alpersternum, quatuor *Sellinus* Cernuum flaviatrem. *Germanus* Baitlberg, *Pillarius* Alpersternum, *Angli* a Ruffe i. e. alperum, item the Gole perch (a vocale Baitlberg, *Phil. Trans. Angl. Vol. VII. p. 405* seq. 1791. 1792. 1793. Sic *Sellinus* 1) Percidem plurimum maculatus — Cernus; hoc genus summo signo demonstrat, quod *Sellinus* branchialium segmentorum, sex sunt, i. e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alia rima luteam habet — Sed & hoc a PERCA differt, quod *perca* duas in regione pinas habet, cernus vero tantum unicam, nullaque dentibus, sed per 1, 2, 3, 4, 5, 6 manifeste praedita est; vid. placiens aureum. *Baitl.* Una cerna; *pellinus* — men non habet, & apud *Sellinum* de la nature & diversité des poissons latus cabulo, Cernus, vocatur.

f) Non duabus in sinum pinnam ventralem cussatis, quod pinna Gobionidus sinz. a. ris est, ut supra §. XVII. monemus.

g) *Alig. IV. habundum XIPHIAS* §. 5. & 9. pinas, nullas post 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

§. XXVII

1. *Percis*, pinis sex; anteriore parte dorsalis 14; post anum duabus spinis rigidis suffulta, tertia & quarta altissimas; post finem radius mollioribus; dorso ex viridi flavicante; ventre argenteo; toto corpore pinis & cauda subulcus crebrisque maculis; operculis branchiarum denticulatis & crenatis; squamis rigidis; cauda pauper divisa. Cernua fluvialis *Bellin*. *Percia fluvialis minor*; *Aurata Tragi*, *Germ. Aldrov.* A Ruffe Cole-Perch, *Angl.* *Percia* dorso monopterygio capite cavernoso; *Artedi* *Percia* pinis dorsalis conduntis radius viginti septem; aculeatis quindecim. *Suec. Giers*, *Snorgers*; *Lin.* *Fauna Suec.* *Schrollus* *Danubianus*, *Schrolli*

II. PERCIS

Schrolli *Ratisbonae*, *Germ.* *Percia minor* *Schrolli*, *Willughb.* p. 334. 345. *Tab. X. 14. f. 2.* *Schrolli* *Frug.* *locustis* *Tab. VII. f. 1.* *Tab. fluvialis* & recentis *Habi* *Tab. ead. fig. 2. 3.* *Percia* *II. fluvialis* *Tab. Morfili* op. *Dan. Tom. IV. Tab. 23.* *An.* *Schraitler* *Ratisbon.* *Willughb.* p. 335, ubi differentias notat.

1. A. Quando in recensibus *Percia* *Schrolli* *Frug.* *locustis* & *Tab. VII. f. 1.* *Tab. fluvialis* sub pinis capitorum & *Percia* *II. fluvialis* *Tab. Morfili* op. *Dan. Tom. IV. Tab. 23.* *An.* *Schraitler* *Ratisbon.* *Willughb.* p. 335, ubi differentias notat.

2. *Percis*, pinis sex; aculeis duobus anterioribus brevissimis, tertio longissimo; *Schraitler* *Willughb.* p. 335. *Schraut*, *Schretzel* *Percia* *III. Morfili* *Tab. 23*; pro varietate precedentis habenda; differentias vide apud autores citatos.

3. *Percis*, pinis sex; rubescens; in ventre ex rubro & albo maculatus; in lateribus puniceis maculis & nigris variis; pinis rubris nigro maculatis; 10 spinis pungentibus in dorso; squamis ita complentis, ut levis videatur. *Jurrucapeba* *Margravii*, *Turdus* *affinis* *Raji* *Syn.*

4. *Percis*, pinis sex; coloris miniat per totum; creberrimis punctulis nigris magnitudine feminis papaveris inspersis, praeterquam in ventre; squamis lunatis; ceterum precedentis congenere. *Carauna* *Margravii*.

5. *Percis*, pinis sex; undecim aculeis in dorso, tertia longissima; ventralibus pinis & illa post anum unica spina firmatis; macula sanguineis rotundis in toto corpore & in pinis; pinna verius eadem latiore; oculis magnis, iride nigra cum auro & sanguine mixta; squamis parvis ad tactum glabra, nisi a cauda versus caput fricatur; *Pirapixanga*, *Brasil.* *Gatvuchi*, *Belgia*, *Margravii*.

6. *Percis*, pinis sex; branchialibus & post anum circinatis, coloris ex obscuro auro hepatici, itum retinendi cineris, per totum corpus obrenis, squamis ad tactum glabris; ore amplo; oculis parvis. *Pnati* apud *Margravii*.

7. *Percis*, pinis quinque; toto corpore nigredine tincta; venter ventrem in abdomen abiens; iride rubra; ore profunde incisio; pinis nigris, lateralibus in exitu croceis; per integrum corpus maculis rubris rotundis; tertia ex 10 spinis dorsalis longissima; magna aut aequaliter molli bi. *Percia* *macina* *venencia* *punctata*, *the* *Rockfish*, *Catebiji* *Tom. II. p. 5.*

II. PERCIS

b) *Marina* percidis radiis vel unum vel duos anteriores plenas ani aculeatos habent.

8. *Percis*, pinnis *quinque*; in capite striis longitudinalibus caeruleis & luteis, alternatim positis; iride vivide lutea; squamis fuscis margine luteis; ore amplo, iucus rubro; mandibula inferiore longiore, 13 aculeis in dorso, quinto & sexto altissimis; pinnis branchialibus longis, angustis, omnibus, ut & cauda forcipata, cinereis; unico aculeo ad ortum pinne anal. *Percis marina*, capite striato, the Grunt, *Catebeji* p. 6.
9. *Percis*, pinnis *quinque*; 15 aculeis in dorso; sexto, septimo & octavo altissimi; duobus rigidis post anum; bruni coloris; toto corpore ad rostrum usque densis maculis caeruleis punctato; ore medioiore; iride & pinnis branchialibus croceis, longis, emula aequali. *Percis marina*, punctulata, the Negrofish, *Catebeji* p. 7.
10. *Percis*, pinnis *quinque*; albes; duobus aculeis in dorso, quarto altissimo; unica spinna ad ortum pinne ani; dorso fusco, ventre albo; sex lineis croceis a capite versus caudam notatis; cauda media forcipata, & alba furcata emula; iride cinerea. *Percis marina*, emula nigra, the Black Tail, *Catebeji* p. 7.
11. *Percis*, pinnis *quinque*; fronte angulosa; iride crocea; ore parvo; spinis in dorso octo; tribus ad ortum pinne ani; dorso ad ventrem usque sub fusco; maculis umbratilibus subluteis, ventre quinquefarium lineato, punctis brunis ex mixto albo & flavo variis; cauda lunata, in exitu rubra. *Percis marina* seditrix, the Rudderfish, *Catebeji* p. 8.
12. *Percis*, pinnis *quinque*; dorso gibbo, in quo aculei decem; ventralis unica; ex spinis quinque duabus curvis ad pinnam ani caput respicientibus; labio inferiore lato & longiore. Ultra medium corpus ad infimum ventrem ex obscuro in lucidum colorem caeruleum divergente; ventre luteo; operculis branchiarum caeruleis, sex lineis flavicentibus; ad extremum angularem macula rubra uigram intere-piente; quae ab omnibus distinguitur; pinnis & cauda, obsolete divitis, huius. *Percis fluviatilis* gibbosa, ventre luteo, the fresh-water Pearch, *Catebeji* p. 8.
13. *Percis*, pinnis *quinque*; in mandibula superiore oris amph dentibus duobus reliquis majoribus; aculeis novem rigidis in anteriore dorso; rostro lavis; iride flava; capite pallide rubro; dorso bruno, ventre albicante; toto corpore & pinnis post anum, anterus duabus

spinis

II. PERCIS

spinis crassius donatum, rubris maculis creberrimis picta, cauda lata, circumata, ex fusco fimbriata. *Cogupiquaco* Bial, the Wind *Catebeji* p. 14. *Silene* fr. *Jam.* Tab. 247. cum *Cogupiquaco* congeneri *Epid.* Tab. 243

14. *Percis*, pinnis *quinque*; aculeis dorsilibus duodecim, quarto altissimo; unico valido & longo ante pinnam ani; post branchialibus longis; omnibus cum cauda forcipata luteis; iride lutea; ore medioiori; squamis griseis ad usque tertiam spinam dorsii, in reliquo corpore squamis croceis & griseis alternantibus. *Percis marina* rhomboidalis, fuscia; the Porfish *Catebeji* p. 4.
15. *Percis*, pinnis *quatuor*; in dorsali posterioribus radiis alioribus, postbranchialibus carens; duabus vel tribus (quae proxima sunt branchis, una post anum, spinis & sicuti tractantur conjunctis) unam in anteriore dorsali parte, ad scilicet glabra, ore ultra oculos inflexo; oculis magnis, iride flavicante; lamina branchioflexa angulosa, in tria. Jam de hinc, nati & amplius rotundatis, 1 per toto corpore, caudalibusque pinnis, plumbei coloris, ex laterio vel sanguineo emortuo variegata, muc. olim nostra. Tab. VIII. f. 3.
16. *Percis*, pinnis *tribus*; postbranchialibus carens; una dorsali, una ventrali, & una post anum, a ex dentibus 4 atior spinis, quoniam in terro laugulata, octo aculeis in dorso, primo & tertio a mit. m. cauda angulosa, in extremo & indubile 1 peroris genibus operculis huius, spinis amplius obtusere rubris vel luteis; oculis maioris; iride lutea, pinis caudaeque terdite luteis. *Percis marina* pinis branchialibus carens; the Scholmaler, *Catebeji* p. 4.
17. *Percis*, capitata, levis & brevis; capite, quod Nani habere solent, majori pro volumine corporis; mandibula infimorum longiore; subcinerea; pinnis dorsii & caudae aquatilis varis punctulis fuscis; iride alba intra latum circulum nigrum; pinnis sex. Cottus fluviatilis capitatus *Suenkildia* dicitur Müller, *Scutolaptum*, *Scutifish*; cui Cottus, vi. 30 Gobius fluviatilis capitatus plene alius pinnis, dorso dipertigo, Cottus depidatus glaber, capite diantho. *Aridi*. Habemus piceolum licetum. The Bull-head, Cull, Pilcers thamb, Gobio capitatus, *Charit.*

Tab.
viii.
f. 3.

III. MÆNAS

Rondel. & Bellon. the Gaper, Ginfish, Willughb. p. 327; Tab. X. 4. f. 2. Traditur nullum sexus dulcissimi deprehendi, omnesque vulvas habere, omnesque gravidos capi, *Rondel.* Caudam habet æqualem. Labrus adus, Chanois recentiorum, *Artedi.*

c) *A. zæmus*, quod ore hiat (sicut canes & alii pisces ore hiant) unde *Επικαρπια* *μεγαλοστομαχος* vocant. Cæterum *δελφινος*: Tanta est huius piscis cum arbo, *Hyperis* & *perca* pinna, cum quo *palus* *diversi* solit, *similitudo*, ut pilum pene eundem cauda hinc. Differt ingratius penna dorsali, capite, rostro, caudæque; item emipetæ compellitur; consuetudine *Perca* & *Peroides* sapia.

8. *Mænas*, rostro acutissimo; fuscis lateralibus obscure nigris, transversis; toto capite & anteriore ventris parte ductibus minicatis caruleisque pictis, tergo ex flavo nigricante; ventre livente; cauda æquali, lata; radiis pinnae post animum spinosis. *Perca* *pelagia* *Jooni*, *Salsiani* d., *Germ. Willughb. p. 327. Tab. X. 6. f. 13* *Perca* lineis utrinque septem, transversis, nigris; ductibus minicatis, caruleisque in capite & antica ventris, *Artedi.*

db) *Fel. zæp.* « *Chanois* & *Physodi* magnitudine, atque fere etiam colore simillima est... In figura *Salsiani* lineis non sunt expressis. Quicquid sit, hunc piscem cum *Physide* & *Chanois* non dixerim *perca*; sunt tamen *perca* quadammodo affines, ad *Mænas* referendi; cuiusmodi *δελφινος* p. 124. *perca* *marina* *unio* & *concomitans*, & *perca* *fluvialis* *data* in dorso tribus pennis. vel, *forma* *de* *perca* *nat. d.*; consuetudine simul *perca* *marina* *affinis* cum *perca* *marina* *affinis*.

§. XXX.

IV. CICLA.

Græcis *κύκλι* vel *κύκλας*; antiquis TURDUS, quod alio variis, ut *Turdus* *avis*, sit; turdumque *πελοποννησιος* appellat *Nicander*; eorum *Salvællæ* Lib. VIII. cap. 17. complura genera includit. *Salvællæ* id explicatur haud facile esse asseverat, additque *caeruleum*, ne omnes picturatos pisces *Turdos* vocemus, turdosque non esse, nisi qui variis alvum habent (*obscurum per aque obscurum explicant*) cum admonitione, primarium eorundem distinctionem ex corporis figura atque magnitudine desumit, unde duo genera prima continuit, vel minorem & latum, vel majorem & oblongum, quorum uterque propriis pingitur coloribus, rursusque majorem, ex colorum varietate, subdividit in viridem & rubrum, ita ut *tria* sint *Turdorum* genera, minorum unum, majorum duo. Quinto *Rondeletius* undecima vel duodecim genera composuit. Sic

IV. CICLA

nemo auctorum, vel antiquorum vel recentiorum, *essentiales* *Turdorum* *characteres* exponit. Retinebimus antiquum nomen *κύκλι* vel *CICLA*, quod & *Artedi* in *append.* in nimio habuisse videtur. Rationem nominis in eo ponimus: Ornithologus consuevit, *Turdus*, *merula*, & quæ plures huius generis aves, rostro lobata longius, ita, a. *andada* *rostrum* *superiore* *circum* *radicem* *mobilitatem*, qualis solent, ita ut *hinc* *a. plavium* *attulere* & *supplendunt* *in inferiorem* *mandibulam* *hinc* *sonitum* *conferre* *possint*; hac ratione *peritiam* *animi*, « *pices* *pinna* *dorsali* *longa* *et* *equata*, *corpore* *vel* *largo* « *vel* *quadantenus* *complicato*, *capite* *prohito*, *ore* *fatis* *fisso*, *acutis* *que* *dentibus* *interdolo*, *capite* *complicato*, *cuius* *mandibula* « *superior* *quasi* *lobata* *videatur* *mobilitas* *est*, *ut* *supra* *a* *inferiorem* *ex-* « *istam* & *recurvat*, *rursusque* *ad* *lobam* *sub* *rostrum* *et* *an* *parte* *re-* « *tenit* *positum*... Iurdo vel *CICLAS* vocare. Hanc characterem sufficere arbitramur, ut modo resare liceat, quid valeat antiquum in hoc genere piscium nomen *κύκλι*. Figuræ *Catesbyi*, *Salsiani* & *Rondeletii* rem illustrant.

1. *Cicla*, dorso fusco, ventre ex albo virescente; pinnis postbranchialibus aureis, ad podicem & in tergo flavis, nigris caruleisque maculis alperis; sub oculis variis; labiis crassis rugosis, cauda lata, maculosa. *Turdus* primus *Rondeletii*.
2. *Cicla* aureus; linea alba ab oculis ad caudam; unica pinna ventralis; *Turdus* 5tus *Rondel.*
3. *Cicla*, rostro aquilino, lineis ab oculis ad caudam caruleis. *Turdus* 6tus, *Rondel.*
4. *Cicla*, dorso aureo, maculis viridibus & lineis rufis tortuosis; ventre candido; labris viridibus; operculis branchiarum caruleis una cum cauda, & pinnis magna ex parte, *ex*, *Ardenas* *sive* *Ceris*. *Turdus* 7mus *Rondel.*
5. *Cicla* viridis & aeneus; linea candida. *Meneftrier*, *Tibicen*; alius *Gama* & *Bille*. *Turdus* 8tus *Rondel.*
5. *Cicla*, viridis, operculorum branchialium extremitatibus, pinnisque ventralibus, purpureiscentibus; ventre ex purpureo albicante; ore garro; *Turdus* 10mus *Rondel.* an *Turdus* minor, sive *Verdone* *Salviani*: *Cicla* cubitalis, *Artedi*; *Willughb.* p. 320.
7. *Cicla*, capite caruleo, dorso virescente; tenai lineam viridi; ad exitum paulo supra caudam macula rotunda; pinnis ex parte purpureis, reliquo

V. SYNAGRIS

3. *Synagris*, ex caeruleo nigrescens, *μελασσοχρως*, sive nigra macula in cauda; dentibus acutis serratis. Hepatus veterum c) *Rondel Genn. Willughb. p. 314. Tab. V. t. f. 7. Ray. Syn. p. 133.* Jecur marinarum vel Hepatus *Heruiolati*. Hepatus *Artedi* app. p. 113.
- 4) *Ariflor*, quod ante velatur, dentibus serratis, colore nigro, oculis maribus, caudi trigono, albo. *Atheniensis* scribit: sille carere, dum lapides in capite habere. *puachles*, veteri non esse albam, sed quod hepatem habeat albam, etque trigonam & alba ptebus commixta sit
4. *Synagris*, dorso obscuro viridi, lateribus fuscis, intermicante aureo; iride argentea, pinna dorsi cincta capiti caudaeque aequaliter proxima, aculeis undecim rigidis, *theulibus* tredecim; in superiori maxilla prioribus dentibus acutis sex, in inferiori octo, mandibulis ambobus tuberculis exalperatis. Aunna *Rondel. Bellon. Al-drov. Willughb. p. 307. Tab. V. f. 5. Salviani f. 175.* Donde *Hispanis*. Sparus dorso acutissimo, linea acuta aurea inter oculos, *Artedi*.
5. *Synagris*, dorso elevato & cincto, bruno; ventre argenteo; unico dente acuto in superiori, duobus in inferiore maxilla extrema; pluribus in palato; pinna ventrali unica, postbranchialibus longissimis; dorsali capiti caudaeque equaliter proxima, aculeis 18 minutis. Aurata Bahamensis; the Porgy, *Catesbej p. 16.*
6. *Synagris*, dorso nigricante, lateribus ventrique candidis, oculis aureis; a capite ad caudam novem plerumque aureis rubentibusque linea *μελασσοχρως*; ventrali pinna unius; macula nigra ad bases branchialium; pinna dorsali caudae proximior. Salpa *Salviani fol. 180. Rond. Bellon. Willughb. p. 316. Tab. V. f. 7.* Sparus lineis utrinque longitudinalibus undecim aureis parallelis, *Artedi*.
7. *Synagris*; a branchiis ad caudam lineis, aliis argenteis, aliis aureis; minus quam in Salpa illustribus; pinna caudati pinna similibus. Porgy, Box, *Ariflor*, primus *Rondel. Box prima. Bellon. Willughb. f. 317. Rondeletius* adhuc duas alias species habet. Sparus lineis utrinque quatuor aureis ac argenteis, longitudinalibus, parallelis, *Artedi*.
8. *Synagris*, dorso purpureo, extenuis in lateribus; a plurimis in totis lateribus crebris, a mixto quibus lam ptebus rutilo colore, in a mixto crebris crebris, dentibus dupli ordine in a mixtis, caudis, acutis. *Cynedus Belloni. Atheniensis* d) *Rondeletius, Willughb. p. 323*

V. SYNAGRIS

- p. 323; Steinfish, Stonefish *Angl.* figura similis Salmonate *Ensternum*, Labrus luteus, dorso purpureo, pinna a capite ad caudam continua, *Artedi*.
- d) *Atheniensis* c) *Ariflor* veteribus homines fidulios & incognitos, in hris Alphe-
tredis inveniendo datur, forte quod semper ibi capiantur, & alior alios ad caudam
eos *Ariflor* ut
9. *Synagris*, iride purpurea, sulphureo circulo inclusa; toto corpore sulphureo; ad os decoratus, ut splendet, linea angusta a capite ad caudam; rictu amplo, denticulis crebris, oculis ingentibus. *Tab. Tab. IX. f. 2.*
1. *Synagris*, iride caerulea; a dorso infra lineam squamis ad oras viridescens; in ventre rubescens super flavicante colore; linea a capite ad medietatem a capite nigricantibus lineis varia. *Tab. IX. f. 3.* *IX. f. 3.*
11. *Synagris*, iride alba; capite brevi, flavicante, rostro retuso; squamarum oris nigredine imbutis, ad caudam lineam macula nigra t. h. notatus. *Tab. IX. f. 4.* *IX. f. 4.*
12. *Synagris*, iride rubra; squamis & pinna postbranchialibus violaceis; profundius in dorso & in ventre coloris; pinna unica ventrali; dorsali caudae appropinquante & ant. pinna luteis; cauda rubra; octo lineis luteis a capite in caudam *μελασσοχρως*; lineis c. 1. quae in dorso *αλευρ* sive variis. Salpa purpurea *Ariflor* *the Lane Snapper, Catesbej p. 17.* (Pinna dorsali leviter fuscata, ita ut ad Peroides referri posset).
13. *Synagris*, dorso ex caeruleo nigricante; lateribus alboque ventre subcaeruleis; nigerrima macula ex suprema parte ad mediam usque caudam profuscente *μελασσοχρως*; nigricantibus lineis lateribus a capite ad caudam *μελασσοχρως*; ore parvo; parvis sed acutis dentibus; pinna dorsali spinosa, cauda proximior. *Melanurus f. Salviani fol. 181. Bellon. Rondel. Willughb. p. 310. Tab. V. 2.* *Oculata Garze*, Sparus lineis longitudinalibus variis, macula nigra utrinque ad caudam, *Artedi*.
- e) 1. e. Macula cauda; alior alia ptebus macula, vel potius macula infestam caudam, vel in medio vel in ipa pinna cauda, habet.
- f) *Μελασσοχρως*, cauda nigra. *Melanurus salpinx* proxime adeo ad *Auratus* figuram accedens scribit. ut non abs te *Alphides* apud *Atheniensis*. cum proportionem habere cum *Auratus*; licet palm longissimum parum superet.

V. SYNAGRIS

14. *Synagris*, capite complanato, argenteo, ventre subalbido, corpore reliquo rubescente; ore parvo mediocribus & acutis dentibus; dorsali pinna spinosa, exsertitur a cupio & cauda distans. Erythrinus g) sive Rubellus vel Frevelinus *Salmon fol. 239. Willughb. p. 306. Tab. V. 6. Erythrinus Roudelii, Genari. Pagrus l) Jovi. Sparus totus rubens, iride argentea Artedi.*

15. *Quad. Cereulaceus rubens Erythrinus in unda. Totius corporis figuram Desoleatus Aurata simplicem exhibuit.*

E Sive *Phagus*, quod est *Quoyis*, ab eadem est quod duos dentes habet, ita ut ostendat. *Willughb. p. 311. Aurata sequitur Vign. sive Phagus, Fragilis vulgo dicitur — quoniam sequi palmo inoproductione carissimum, in dentibus sive sin-*
dentibus erant communis piscium confusum existimavit & p. 43. c. XII. Sin-

15. *Synagris*, ventre & iride argenteis, dorso & capite fuscis, pinna dorsali spinosa; cauda nigra furcata; branchialibus pinnis densis, cum ventralibus caret; una brevi post anum. *Mormyrus ex cinereo nigricans* Poisson oleux, the Bonelish, *Catebeji p. 13.*

16. *Synagris*, dorso & lateribus ex viridi exulescentibus; denis duodecimve faucibus transversis, nigricantibus, intervallis aequalibus cinctis *Desol. l)* in latera minus compressis, quam *Aurata*; ad oculos argenteus; iride aurea; ore dentibus exiguis instructo; pinna dorsali spinosa, a capite & cauda aequaliter distans. *Mormyrus Roudel. Aldrov. Willughb. p. 319. Tab. X. 6. f. 2. R. Mormyrus, morononi Salmasii fol. 182. Mormyrus ejusd. fol. 183. ad iconem; Genari. Sparus maxilla superiore longiore, lineis utrinque undecim; agris, transversis, parallelis, Artedi.*

17. *capite, venter pilosus; pilosus Mormyrus dicitur, Oculi & f. 2. A. verbo morononi, comparatur ad aqua, Mormyrus, angustulus, quam derivatorem anomalis improbat.*

k. 168

V. SYNAGRIS

1) *Item p. 322. Quamvis alii nonnulli pilos, ut v. gr. Sargus, & Perca (perca) utraque spumidi areolis transverulis oblectant. canes Maurus multo insigniores & . . . sed ore Item pag. ead. Figura corporis dentis simili est, ad latera compressa. Aurata angustulus, Memad longior*

17. *Synagris*, capite superne fusco, inferne ex violaceo & rubro subculato; dorso elato; pinna dorsali spinosa badei coloris; ventrum verius rubens super albo; iride zinabarina; ore lat. amplo, simplice serie acutissimorum dentium, pinnis branchialibus, unica ventrali, una post anum & cauda lata divisa rubris. Ine Murgon-fish; Anthia quartus *Roudel. Willughb. p. 325. Tab. X. 5. forte etiam Orpheus veterum, Roudel. Gen. 252 f. ita Catebeji p. 25.*

18. *Synagris*, umbre dilui coloris, ventre albicante; labiis crassis, rubicundis; in extremitate mandibularum duobus dentibus caninis validis; operculis branchiarum quadratus ceruleis; pinna dorsali spinosa, cauda proximione, unica ventrali, una post anum; branchialibus carens; the mangrove Snapper, *Catebeji p. 9.*

19. *Synagris pagri vel Erythrini forma, argenteis squamis, dentibus tenuibus, rostrum aquilino, pinnis caudicis, ad quatuor radices macula ex nigro rubescens. Acroce Roudel. Inter Fragilissimos Roma & pro Erythrino venditur, & cum non nisi colore ab hoc differat, Willughbeus illum pro varietate non pro specie habet.*

20. *Synagris*, totus ceruleus, iride saltem rubra, capite baleniformi; ore modico, dentibus in utraque mandibula simplicibus, acutissimis, tam acie sibi invicem conjunctis, ut Os deusculatum simplex videatur; pinna dorsalis spinis alta membrana conjunctis, duobus postbranchialibus, unica ventrali, & una post anum; cauda ovata. Novacula cerulea *Willughb. p. 214. Tab. O. 7. Poisson bleu, the blue Fish, Catebeji p. 18.*

21. *Synagris*, labiis crassissimis, superiore duplente; ore mediocri, denticulato; oculis nigris, auris; corpore toto, super distincti viridi, variis coloribus, ad pavonis instar, picto; anteriore parte pinnae dorsalis aculeatae ex fuso rubescente, posteriore partim vi-rente, partim violacea, maculis ceruleis, una ventris & cauda violaceis, pluribus rubentibus maculis per totum corpus sparsis. Pavus D. Ambrosii Pavo Philoprat; Iphidri; Salomoni. Turcus perbellis pictus, an Pavus Salviani? *Willughbeus p. 322. Tab. X. 3. Labrus pulchre varius l), pinnis pectoralibus in extremo rotundis, Artedi. Turcus secundus Gen. Turdus Belloni. Papagallo Romae.*

g 3

h. 171

[illegible]

22. *Synagris*, dorso admodum elato, capite parvo, rostro acuto, denticellis acutissimis; iride argentea; totus fuscus, ventre parum albicante. Tab. X. f. 1.

VI. HIPPIURUS.

In veteribus dictis. *Melissa* *isotriaea* nominavit in saeculo; *Nomenclat. apud Arbes.* Lib. 7. §. 10. ubi; quo Graeco nomine (HIPPURUS) & Plinius ait; unde autem pisci nomen importum sit, certo non constat. Graza Hippurium Episcipen vocat conf. Radcl. Genl. Remedio quoniam ipse piscis, quem descripsit, incongnitus fuit, cum nec Aristoteles Lib. V. c. 16. nomenclatum indiglataverit. Incertum Reductus rationibus continet ad, piscem hunc esse Hippurum veterum & *scaphia* nomen unde id alludere (de quo verbum est lib. supra §. XXII. ubi de Blennio) ait. Quod si recte sit, Hippurum esse piscem, qui dicitur Hippurus certe articulus *cauda equina* nomen habet, quod pinna dorsalis finit et medio capitis erigit, & veluti cauda equina longa vili multo constans ad usque caudam pilis productior, korporena autem a pinna in vertice incipiente & veluti cristata in eadem erigente nomen trahit, cuiuslibet patrib, ambo denominationes aequae parum valere. Jam, quod utraque vulgare, melior erit condito HIPPURI per denominationem Caudae & nam nomen facile loquens, pinna sequatur *episcipen* reverte cristam in exortu capitis, quumque *cauda* *equina*. (C. 16.) ad iudicandum. *§. 16. Inducendum est quid sit pinna equina* quae a caute ad caudae veniem elongata cum cauda equina quaedam comparari potest, facillius concederetur. Claudijs

fic utraque nomenclatura, nescio, quare perspicacissimus *Ardeus* per *Hilpuro*, quæ nomen item auctorum esse ipse *Generi XII* latenter, adoptaverit *CORPHINAM*. Loquimur cum *Antiquis*, donec magis adequatum nomen generis nobis in mentem venerit: *HILPUSQUE* dicamus piteus: Pinnæ dorsalis coarctata longissima, a summo ret. lo. et in altum educto capite ad erudum usque protensa; brachialibus latioribus, ventralibus angustioribus; corpore producto, lato & plus minus compresso, dorso cultellato; pedice in medio corporis; ore acute denticulari.

b) *avetida* II. p. 66, *canone* II. Interfuit nomina piscium genericis, quæ quadrupedi-
bus pilosius, *avetida*, *anophis* &c. communia sunt, omnino delenda, secundum
Dei. Linn. Fuvd. 234. inter quæ connumeraverat p. 66. HYPPIUM, h. e. cauda
equina; jam vero *eripia* alior propria est & communis, prout et *cauda* quadrupedi-
dina quocunque trago secundum *avetida* & CORIPHENA p. 78, & *Gen. XII.* omnino
effici delenda.

1. *Hippurus*, *pilis* brachylabris decastris, brevibus doli latius; in ventralibus longioribus, nigricantibus; ore medioctis; in maxillis fatiscentes et lingua acuta denticulatus; iquamini minutus; cauda furcata; ceterum Glauco coloris. Hippurus Roudel. Germ. ad Domodo e typicus auratus Lychnantrum, Willgibbi p. 245. Tab. O. r. f. j. Co-
pifcus cauda bifurca Aridi.
2. *Hippurus*, qui Guaranepina Brasil, Margis & Dorado e i. Auratus pilis Nuerbergis Dollyn, Belgis; idem cum precedente: coloris in capite, dorlo, lateribus, uti et in pennis, ex viridi et argenteo mixta; in ventre albis; toto corpore maculis variegatis ceterum; vel Magnatum et Willgibbium p. 214. Tab. O. 2. f. 1. Delphinus le Bruyn Virens p. 335. Ed. Angli. Phil. Dorade Maculata fortis & du Terrie; et Delphus des Marchais per Labor t. p. 48. Neuticum tamen est Delphus des Phyciter, DELPHACUM le-
caudis Mijfi li.
3. *Hippurus*, quatuor digitorum; vride auratus, cauda panellio grammata; Alter duo fil rubra in fronte, imae maxilla inferiore duo squamino denticulos longos & acutos, alter maxillas rofratas quatuor et minimis denticulis compositas habens; ultimus in lateribus latus curvis oblique purpureis variegatus est. Punaru dua species Mar-
gravijs

VIII. CYPRINUS

officulatorum viginti, linea laterali recta, *Artedi*. Cyprinus pinna
ani officulorum viginti, linea laterali recta *Linn. Fauna Suec. Tab.*
XI. f. 1. Differentia crassioris, corpore producto, minus lato,
coloris super aureo umbratilis. *Tab. XI. f. 2.*

5. *Cyprino brevius*, totus fuscus, minutus; cauda attenuata, cuius pinnæ alba incutita brevibus; capite declivi & reliquo corpore ovatus, lateribus carinatis. *Tab. XI. f. 3.*
6. *Cyprino brevius*, leucophagus, capite declivi & breviusculo pectore, quo albicantibus; inde aurea. *Tab. XI. f. 4.* pilis tenuissimis vix perceptibilibus in capite ex squamis & radiis planarum fluctantibus, brevibus.
7. *Cyprino brevis cingens*; posteriori corporis parte angulosa, capite producto, pinnæ caudæ attenuatæ longissima; ventre plumbeo, quinque Zonis transversæ brunni super carneæ ad ventrem usque; pinniculis minutis. *Tab. XI. f. 5.*
8. *Cyprino* pinnæ nudi duplæ caudæ trifurcæ. *Adi. Stœckh. 1740. p. 405.* Sincerus *Linnaei*, in *Dania* educatus; *vid. Faunam Scæ. num. 331.*

§. XXXV.

IX. PROCHILUS, πρόχουλος, προχουλός, *labris prominentibus*, labrosus.
Ore edentulo.

- Tab. XII. f. 1. 1. *Prochilus*, ovary figura; macula fuita magna, ad infus aulorum
epiphili et dorso dependente; squamulis levigatis. Tab. XII. f. 1.
- Tab. — f. 2. 2. *Prochilus*, corpe angustior, in medio fascia lata a dorso ad imum
ventrem, duabus dimidiis vixi caudam, conicis; huiusmodi fo-
luta ore exferens. Squamulis levigatis. Ibid. f. 2.
- Tab. — f. 3. 3. *Prochilus*, levis; lateribus cernatis; pinnarum ventralium loco duas
big gutture fere, s. bifidis; coloris leucopis; dorsali pinn
nonnulli punctata, post nati, qui in medio ventris, longa; late-
ribus hinc inde laevis grisei maculis. Ibid. f. 3.
- Tab. — f. 4. 4. *Prochilus*; capite protracto; pinnis ani, dorso caudaeque maculatis
branchialibus oblongis, albis; reliquo toto corpore, ad latus in-
flar, maculatus & fasciatus. Ibid. f. 4.

5. Pro-

IX. PROCUJAS

5. *Prochilus*, lingua soluta; ad latera septem lineis longitudinalibus, dorso proxima linea ex horulis fenestralibus conjunctis, reliquis Tab. XII. f. 5.
ex circulis concatenatis variis. Tab. XII. f. 5.
6. *Prochilus*, parvus; ex albo & fusco variis. Ibid. f. 6. Tab. XII. f. 6.

§ XXXVI.

MONOPTERUS: PINNA BREVI, ad medium dors.

I. BRAMA.

[illegible]

- a) Cum Cyprinus pinnam dorsii habeat longam, & parallelam, ab ano autem brevem; Præterea e contra habet pinnam dorsii brevem, ab ano longiorem.

- B. brama*. primo radio pueris fulvisque (non hamato, ut in
Cyprio) in auro exeruleo nigricans, velus ventrem ex auro
albescens, ceterum plumbus; quomo ita amplius caput hinc
per corporis magnitudinem parvo; Longitudinis quodque hic
palmonum, latitudinis fluiti; Dorsum arcuato & cutellato, ventre
infimo caulum compresso; pinis & periculis brachiarum furvis,
fere exeruleo nigricantibus; alisque vixit quam Cyprius, gra-
tior enim glimatur carne duratius & hepate praeflo. Valde
apud nos pinguis. Cyprius latus & hepate praeflo. Valde
Gedan. *Hem. Hem. Brama*; *Erta-Brama*. Cyprius latus
omnibus nigrescentibus, pinna ante oculosum vigenti legenti
Arcti. *Brama l. mas*, & *Brama l. fasciata*, *Edipis*, *Edipis*,
H₃ Mar-

III. LEUCISCUS

quem Miseni Zorte vel Blike *Gerueri* vocant. An idem cum Naso
Willughb. p. 257. *Cyprinus*, Capito Anadromus dictus *Arctedi*.
Capito Anadromus *Marfilii* *Tab. 6.*

d) *Peripera andromedae* multas Leuciscus in mare deferat. Accolae fluviorum superius Germania admodum hic huius generis pisces summorum, quod est in omnibus temporibus in hoc locis capiunt. Ascendunt equidem in deferendo eam in montem perenniter. Alii tamen non mittunt in mare, sive in aquas salinas, promittunt Sturionem ex Trutinario familia Salmones, sed nec in marium sinus transferunt, quoniam hoc sitis temporis retinetur.

4. *Lucifera*, in dorso & lateribus flavicans; imo ventre albicante; quinque argenteis; pinnis branchialibus ex furco purpureis, reliquis ex flavo rutilantibus. Menibus April & Majo masculi prominentibus duris, albis, interne cavis figurati e) ex quinque extuberantibus; post evanescentibus. Ortus Germanorum, *Marfili* Tab. 5. Capito fluvialitibus subruer, Nerling, Reum; *Sich Generi*, Vrowhif *Willughb* p. 253. Cyprinus, Ortus dictus, *Azedi*. *Diedrich*, *Eupel* in *Albi*.

e) Front. *Crana l. meridionalis*: Martin & Agrell. Hatt i fr. Berg vund i synnaryd i Skebba
Egon an et Orfus dextr. Willughb. Q. 9, toos : 6 linj, 1727. d. 12 Febr. Roberg
Atiq. cum icon.

5. *Leuciscus*, sp. nov. max. longitudo: squamis majusculis, in dorso fur-
vis, et quasi viridibus ex cernitis solidiusculis; argenteis in lateri-
bus. Capito fuvialis, seu fuvialis minor Aldrov. Marfilii Tob. A.
Mugilis vel Cephalis fuvialis species minor Gernerii Willughb.
p. 261. Halil German. Hasle Tigur. Schnotfisch, Argentina.
Weisfisch simpliciter Mshens. Cyprinus gracilis, oblongus, cras-
sifuculis, dorso crasso, pinnis ani officulorum novem. Artedi.

6. *Leucipis*: Pinnis brachialibus flavicinctis; dorsalia, ventralibus, et canda pallide fuscis; iride laeta, intra amplum circulum punctum; Nafus natus. *Tob. XVI. f. 1.* Alter, femina f. 2. Hæc pinnæ dorsali ipsoque dorso ex f. 1. nigritudine; ventralibus pinnis et brachialibus cerreis; iride apice argentea. Gedenæ natus, cerceam arctis planis habentes. Dicitur autem NASTI *Scritta a Trefro arctis f. 1.* Os habet dorsum levissimum, sed et huius Nafus Alberti. *Adirov.* Simus et platyrhinis *Gruvi.* Sed et huius, Suen Bellon. Chelon fluviatilis, Labeo, Nafus, *Nafus.* *Rufi.* *Greiter.* *Nafus Schwenk.* Nafus natus et femina *Marphi.* *Tob.* Magnitudine a notris differit. Pileis dicitur *Sarracini.* *Tob.*

III. LEUCISCUS

devisis & vilis est pretii. Masculi tempore generationis multis
nigris maculis per totum corpus imo & in pinnis notati; v. d. apud
Marjillum marem Tab. 3; apud nos ejusmodi plicis variis crebris
maculis luteis, pinna post anhem ventralibus & branchialibus ru-
bentibus binitis dicitur Tab. XVI. f. 3. Cyprinus rostrato na-
torum, prominente, pinna ant. officulorum quatuordecim, *Ariedi*, Tab.
xvi.
f. 3.

f) A rostris obtuso, pikeum appellare *Nasum*, vel Nasutum, mileris; quod non habent nasum: et nasutus, non quidem eo sensu, quo *Plautus* utitur, sed loquendam com. 1. g. Habet *Arcterus* alium Cyprinum 32) rostris *nassiformi*, dorso acuminato, pinnis ant. officulorum vaginali quatuor. An Capita Anadromus *nasiformis* Tab. 6?

7. *Lenticular*, brevis, pinnis branchialibus parum rubentibus, dorsali sinuosa, cum reliquis & dorso ipso ex caeruleo fuscis, ceterum argenteis; capite parvo, iride argentea lata; *Gedan*, des Geisslers *Tab. XVII. f. 1.* XVI.

8. *Leuciscus*, corpore valde castigato; ceterum *Leucisco* imo colore
similis, præter pinnas branchiales, quæ flavicant; capite producto,
oculis minoribus. *Gedan. Gaster, Thorn* (Thurm-) *Fisch*; ob figu- Tab.
ram corporis producti, quasi turci. Tab. XVII. f. 2. XVII

♀ *Leucifera*, dorso & pinnae dorso ex caeruleo fuscis, reliquis cum cauda rubris, ceterum argenteis; capite & operculis branchiarum ex argenteo & auro variegatis; iride aurea; inter Plocenas, Mößen, numeratur. Sunt autem Mößen rubelliones, quorum caro sine oris. *Tab. XVIII. f. 1.*

10. *Leuciscus*, capite, dorso, pinna dorsuali sinuosa, & cauda ad nigredinem fuscis; branchialibus, ventralibus & ani rubris, iride tenui aurea; reliquo corpore argenteo. Mohren-Kayff; Gefenke Gedar. Tab. XVIII. f. 2. XVII.

11. *Leuciscus*, argenteus totus, capite parvo, labiis crassiss. Squalus
Salviani; *Alburnus Aufsoni*. *Leuciscus Galeni*. Capito sive Co-
phalus Gesneri, *Rondel*. *Capito Aufsoni*, *Alt Bavarorum*. *Marfilli*
Tab. 4: vide apud ipsum discrepantiam autorum.

12. *Leuciscus*, ex albo dilute fuscus; in ventre dilutior; ad branchias pallide rubens; ore amplo; maxilla superiore longiore, in inferiore quinque vel sex excrecentias habet breves, quas dentes (potius verrucas) dixeris. Alburnus americanus; Merlan de la Caroline; the Carolina Whiting. *Catesby* p. 12.

LUCIUS

nobis adeo gratus est, *Generis nomen* fortiantur pisces perpauci, quibus *pinna dorsalis* est *brevi caude proxima*.

1. *Lucius*, *Rondel*, *Salviani*, *Bellonii*, *Schenep*; & omnium autorum; Rostrum est quasi anserino; inferiore mandibula longiori & cochlearis modo curvata, dentibus in os recurvis, quibus superior caret; palato tamen duobus dentium ordinibus instructo. Squamis parvis ac tenuibus, ut iis carere videatur; dorso survo, ventre candido; maculis corporis variis asperis; pinnis ad branchias imis; duabus ventre inferiore; prope caudam quinta post anum, cui opposita superior sexta; cauda pinna divisa; omnes fuscæ flavicantes maculis nigris variegatæ. Non est, ut quidam putant, gregalis, sed ex ovo solitarius prædator, suam gentem devorans. Fallo *descriptores* Nil, & *descriptores* alteri *Oppiani*, the Pike or Ficherel, *Willughb.* p. 236. *Tab. P. 2*; Hecht; Belg. Snook; Poloni; Sazka vel Siuk. Juniores dicuntur Gräs-Hechte; *Tab. XX. fig. 1. 2.* Dantur varietates. In *Scania* ex lacu amplissimo ad Nobile perducunt Robelof, haud procul a Christiana Lucios vidi ultra 6 pedes longos; cons. *Albin. Meisn. Land-Ähren. fol. 316.* Panthera fluviatilis *Alberi*. Adde: *Lucium* candidum, *Schwenkfeldii* qui in piscina Trachebergensis baronatus reperitur. Vivacissimus piscis; cons. *Cyprianum* p. 2449. de Lucio Frederici II. Imperat.

2. *Lucius*, dorso a rostrum ad caudæ extremitatem in linea fere recta velut regula ducto; sensum ex ore ventrem versus curva linea decre-scens, post branchias in ultimum ventre latissimus, ab ano versus caudam rursus lente decrescens; toto corpore inferiore ciliatula; lateribus sensum depressis; lato dorso; quodammodo tereti coloris; exterum totus piscis argenteus; oculis magnis; pupilla nigra; iride lata argentea; pinnis omnibus ex argenteo umbratilibus. *Tab. XX. f. 3.* Ziege, i. e. Capra, *Gedan.* Piscis nullibi quod sciam exhibitus vel descriptus;

3. *Lucius*, corpore tenui, duarum & mediz epichamæ longo, octo vel novem pollices lato; squamis ad cervicem atrocruentis, ulterius fuscis, in lateribus argentatis, latis, tenuibus, facileque deciduis; capite quoque lateratili preffo; circa cervicem in gutture teres; ore edentulo; inferiori mandibula acclivi longiore; superiore in filicem mesofium curvata, curvitate dorsum spectante; dorso cum cauda in linea recta fere æquali; pinnis sex; branchialibus cineris; reliquis ex rubro & cæruleo colore permixtis; cauda bifurca; A falce messoria *Eichst.* *Eichsting* dictus, Sabar *Morfilli* p. 21.

Tab.
XX.
f. 2.

Tab.
XX.
f. 3.

LUCIUS

p. 21. *Tab. VIII.* Saracho *Aldrovandi* congenerem putat auctor; id vero, collatis amborum descriptionibus, asseverare non possum, multoque minus, ad Harengos referendus piscis; quin potius Lucio adeo magis congener sit, quam Saracho *Aldrovandi*. Tum in Danubio; tum in Tibide degit.

4. *Lucius*, squamis parvis & dorso ultra lineam virefcentibus, lucentibus, in ventre solum albus, unde piscis viridis dicitur; pinnis quaque; duabus postbranchialibus subulcis, unica ventrali annuola, quarta post anum elongata, cui similis superne opposita in cauda; pinna caudæ falcata, his omnibus cinereis; iride aurea; pupilla nigra, ore amplo dentato. Saltatrix, le Sauteur, Skiplack *Caterbeji* p. 14.
5. *Lucius*, pinnis branchialibus latissimis longissimis, corpus totum æquantibus; rostrum acuto, inferiore mandibula longiore, ore edentulo; in dorso unica pinna brevi, flexili, caudæ latius vicina, & cuius fere regione aliorum paulo minor imo ventri statim ab ano subest; caudæ pinna lunata; ventralibus angustis & longis; squamis latis tectis; dorso ex cæruleo nigricante, ventre albicante. Hirundo, pesce Rondine *Salviani* fol. 189. Hirundo, poisson volant, the Flying fish, *Caterbeji* p. 8. the Flying fish *Shann* 12. *Fam.* p. 27, quem ex genere Harengorum esse putat, ad quod tamen nullo charactere evidenti trahi potest; it is a Kind of Herring, with very large Fins, with which it can fly some time in the air, it loses itself in the Bontons in aqua; volucresque rapaces in aère. The Swallow fish, *Charleston*: *Stigender* *Bâq* *Neubey* *Sina* p. 209.

§. XLI.

PISCIIUM BRANCHIIIS APERTIS
FASCICULUS DUODECIMUS;

ET
MULTIMUS.

PSEUDOMONOPTERUS. revera Pseudopterus.

Pseudomonopteros dicimus pisces, qui pinnarum vel dorsaliarum vel & reliquarum pinnarum loco *radios* tantum habent *diffusos*, ut pinne videantur quasi laceratæ, sive, quod membranæ, quæ in

K 2

alis

PSEUDOMONOPTERUS

aliis piscibus inter aculeos vel aristas flexiles intercedere solent, quia maximam partem fuerint substat & rejecta. Proprie itaque pinnae dici nequeunt; cum tamen vel ipsis radiis pices tales pseudopterygi ad natationem utantur, dorsum pinna consideranda veniat, ac si integritate sit restituta, membranis integris, picesque tunc monopterygii dicuntur; cum autem reveri pinnarum loco aristas distinxerit habet, utiturque anomalis instrumentis utatoris, pseudomonopterygius dicitur; Pari ratione *pseudopterygius* appellavimus pices, qui post secundam pinnam dorsalem habent vel penicillos vel triangulares qualescunque processus non intercedentibus radiis; *pseudopterygius*, qui ante pinnam longam dorsalem, vel in ipso dorso, aculeis discretis, vel processibus in vertice, instructi. In hunc fasciculum non intrabunt nisi exoticarum regionum pices; sed optandum, ut cum fiduciam plures quam unicum piscem, vel unici piscis varietates duas costringere liceat. Reliquorum vel descriptiones ubique maneat, breves, incertae, admodum imperfectae nulliusque fere usus, vel icones multum rudes, haud raro fictae & manifesto monstruosae vel certo certus a vera figura abducentes; quales pices ad felicitiora tempora remittimus recensendos. Nostrum non alio, quam *Pseudopteri* donabimus nomen.

1. *Pseudopterus*; qui Perca Amboinensis, *Willgbb. a) App. p. t. Tab. 2. f. 3.* Colore subobscuro aut fusco, lineis subcaeruleis; sub rostro variis, unde & *pinnae*, quae vocatur, contiguae cartilagineae. Laterales seu postbranchiales subvirides sunt & maculosis b).

a) A Jeanne Nicolson delictus pice.

b) Adhuc *Najari* fecit repraesentare arcuolos transversos obsoletos, a medio dorso per ventrem ad latera ductos, ut in *Perca*. Pinnam dorso medio imitam non velle *piscem* *subpice*, radiis *discretis*, nullo intercedentibus membranis connectis, intercedit quidem membrana sed non nisi ad ortum anularum, unde est quod piscem totum *arcuosum*, *PSEUDOPTERUM* vocaverimus.

2. *Pseudopterus* praecedenti similis, musei olim nostri; croceis coloribus & radiis variegatis tenuibus egregie explicatis; in fronte duos circos habens fatis longos, caudam non forciparam, sed radiis discretis partem circum describentem. Capite anguloso, rostro resinoso. *Tab. LV. f. 6.*

Tab.
VI. 6.

§. XLII.

FASCICULUS DUODECIMUS.

§. XLII.

Absolutis, modo quem elegimus, piscium FAMILIIS, harum plurimum GENERA latitare, neminem in dubitationem adducimus; quotquot interum colligere nobis licuit, totidem comportavimus. Nobis nondum felices in exitum optimus successus; Offendit & specie monstruosae terrificaeque pices, non quidem fabulosos; Eiusmodi LARVAS appellavimus; e. g. *Diabolium narium*, *Zec-Duyvel* *Willgbb. App. p. 5. Tab. 9. n. 3.* vel etiam: *le Diable du des Marchais* par *Labat L. p. 83.* quales pices, formae insoluit, pro re nata Generibus vel LEIOPATI vel DASIBATI (*Mysu III.*) subsumi possunt, & quo referendi pices ad formam humanam quidamtenus appropinquantes, apud autores; confer. *Maillet* sive *Maisier I. cit. p. 119.* *Labat* relat. de l'Est. occ. I. p. 187. *Bradley*. philol. works of nature Tab. V. fig. III. *Siren Mayu* coll. 9. *Emile* annu 1403. delata; quae ut fert relato, se vestire pasta, pane & lacte alia, & fila etiam & colu ducere edocta, quae venerunt pices *corpore insolenti & caudati*; Alter diximus *Batrachum* Xmuu, Tab. IV. f. 7. Alter est *Almus Batrachus*, praecedenti similis Tab. IV. f. 8. vide additiones. Habemus porro piceculum, qui *Crayracion* ovatus, levis, strumolus, altericis vel stellulis notabilis, *Crayracioni* suo *laxissime* iungendus vid. Tab. VI. f. 4. *Crayracion* alius ventris *vel* *Reffit*, capite anteriore in parte cinereo, fronte nigra, a medius laterum ad caudam usque sulcus, ceterum albicans & reticulatus, lavis; vid. Tab. VI. f. 4. *Crayracioni* 24to (*Mysu III. p. 21.*) addendus, una cum *Crayra-VIL* *tionis* *grabbio*, sive piceculo Amboinensi, triangulari, gibboso, offeo, & lateribus undique spinosis *Kuysehii* *Tab. Anim. I. Tab. VI. f. 1. II. D.* ita sic porro.

Iam rebus, quas in *Mysu* LV. nobis subiecinus, spatio sequenti Colophontem imponimus, DEUM Ter-Optimum, maximum, benignissimum, omnipotentem procat, ut omnia cedant in sui NOMINIS GLORIAM.

K 9

§. XLIII.

§ XLIII.

PISCUM organa Auditus inter se differunt. PULMONIBUS præditi organa habent quadrupedum organa similia. BRANCHIATII habent organa illis analogæ, omnesque lapides in capite. *Missu I; & Maurissa Ichth. de SONO & AUDITU piscium.*

PULMONIBUS spirantes sunt PHYSETERES *Missu II. Balena Walffsch. Narwhal Einboem. Einboem-Balein. Delphaces: Mæro-Schwein. Orca Det-Schwein. Delphin. Delphin. Phocæ. Læmæ.*
Spiracula ad latus: Cynocephalus Dunde-Roff. Galeus Epig-Nase. Profus. Egar-Schnauz. Cetracion. Greshmidt. Gannus-Riff. Rhina Wundt-Enat-Riff. Bærochus. Gresh-Riff. Crayac on Riff-Riff. Capulus Rans-Woda-Maud. Conger. Mal-Schlang. M. rani. Murene. Petromyzon Blam-Nage.

BRANCHIIS
occidit
Missu III.

Spiracula in thorace: Narceon. Krampf-Riff. Rhinobatus Engels-Rap. Læobatus Olas-Rap. Dufylæon. Brundert-Schnauz.

Formæ: Balæne formæ. Missu II. Falc. I. Særus. Wale.

Figuræ: Falc. II. Acipenser. Egar-Længus. Riff-Riff. Niphant. Schwed. tråge. Mæssecentelch. Wurf. Epig. Plæstomus. Baagert. Schnauz. Solenotomus. Wale-Spitz-Schnauz. Amphidilen. Janus-Riff.

Oculi. Falc. III. Solca. Cople. Zung. Pæller. Glander. Rhombus. Wotte. Rhomboides Cæropum. Wotte-Westat. Tetragonoporus. Glander.

Armature. Falc. IV. Cæptæradus. Riff-Riff. Coristion. Hæm-Riff. Cæptæradus. Pænter.

In seruo & in capite. Falc. V. Oncorion: Riff-Riff. Echenes. Stopt. Riff.

Corporæ vinnib. Falc. VI. Enchelyopus. Mal-Woffert.

Missu V.

TRIPTERUS. *Falc. VII. Callæus. Bannschel.*

SEUDOTRIPTERUS. *Falc. VIII. Pelamys. Egan. Matzels.*

DIPTERUS. *Falc. IX. Tetra. Tula. Roff. Mullus. Malle.*

Cetæus. Mæro-Riff. Labrax. Egar-Woff. Sphyrana.

Wale-Riff. Gobio. Roff-Riff. Waffer. Alperulus.

Alperdo. Ringel. Serret. Trichodon. Sæd. Riff.

SEUDODIPTERUS. *Falc. X. Glæus. Wauling. Bannus.*

Sæd-Mæro.

MONOPTERUS. *Falc. XI. Perca. Perch. Parfch. Rant. Parfch.*

Max. Parfch. Waffer. Cich. Drossel. Maut. Syngæus.

Mæro-Waffer. Hippurus. Schwægel. Dædæ. Særgus.

Wetigaph. Cyprinus. Karpe. Procnas. Wadmaul.

Brama. Wædem. Wæstern. Mytus. Wengen-Riff.

Wæden-Riff. Leuciscus. Schwægel. Wæst. Rapp.

Wæst. Hærengus. Hæreng. Schwægel. Wæst.

SEUDOMONOPTERUS. *Falc. XII. Pseudoperca. Giossen.*

Wæst.

F I N I S.

ADDI-

ADDITIONES

AD
MISSUS II. III. IV.

CUM EPISTOLA AD DN. P. COLLINSONIUM.

MISSU II.

§. II. nota b) add. *Majalus* coll. g. refert. Maclovium Britanniz Episcopum aliquando ex navi velut in montem, ut sacrificaret, cum vectoribus se contulisse, sed in medio sacrificio molam bellum terculo moveros; peritulis lauca, monente Episcopo ad meritum finem — *Albertus Magnus* l. 24. de Cete testatur, se vidisse piscem, capis oculorum caver 20 homines singule caperent. Huc pertinet: Scolopendram putent centip. eam, si hancum monerent, omnibus intestinis egelhis humoque rejecto, eodem resorbere; *Majalus* l. v.

§ XIV. p. II. lin. 6. add. Whale Bones are covered with Hair like Horse Hair — Some of them are two fathoms long — on each Side there are commonly 250, in all 500 pieces. *Egede Hist. of Greenland* p. 67. Fidem superat, quod scribit *Dn. Deslandes* p. 180. quod aliquot fois bonder 11 Balæne & s'élance bas de la mer de 15 à 20 piques de haut, elle retombe en suite avec un bruit épouvantable.

— lin. 7. Balæna vern Zörgedingeri add. Balæna fistula in medio capite, dorso caudum versus acuminato, *Art. — Linn. Fauna Suec. Groenlands Wallfish.*

— p. 12. nota d) add. & No. 471. which live on a Kind of Loise, brown-coloured, who moves so slow, that he may be taken by Hand. This Creature is only, and when it moves, it produces a rain.

— lin. 21. Balæna albusans, add. The white Fish without Fins on the Back. *Egede* p. 75.


— lin. 30. Eusdem. add. *Egede* p. 72. *Anders. Nachr. von Grönland* p. 196. Balæna minor edentula, dorso non pinnato.

— p. 13. lin. 13. add. Balæna fistula in medio capite, tubere pinni formæ in extremo dorso, *Art. I. Hist. Linn. Fa. Suec. Anderjont.* Balæna minor edentula corpore structiore, dorso pinni mucronata notabili p. 196. figuram vide apud *Egede* p. 69.

§ XIV.

MISSU II.


glaubhafter Muffe aber hat mich vor gewis versichert, daß jeder Belugen Krey in seinem Kopf habe, nur seyu sie bey jungen Belugen ziemlich weich. Des ses hat mich auf die Gedanken gebracht, es könten wohl die 2 größten von ihren Ostiulis audius piscium seyn. Weil ich aber meiner Sachen gerne, so viel möglich, gewis seyn mag, so habe einen über Africam mit der Ostland schaff nach Persien abgereisten Meutrum (de D. Lerne) sehr gefragt, die Sache nach Ostien inspection zu bestatigen oder zu widerlegen. Daß in den Erdren, wo der Nahme des Hrn. von Hicofus Ostia ist cor. insper aus Ostia, (Erd) anzugehen scheint, so große Steine sollen gefunden werden, ist nicht wahrshenlich — „Circum suum interitum vir doctissimus addit: „Lapides Hicofus forma illum satis bene referunt, cuius imma ginein Missu II. tab. IV. f. 7. dedisti, maximi dimidium pugnum, mi nimu nuncu molochianu volumine equant. Color ex albo luteus, nuncu dilutior, nuncu uterq. fior. Interu liliu-ma (vid. fig. 3.) nitens candida. „Textura est ex lamellis concentricis, pro ratione exterioris lapidis figure (fig. 1. & 2.) ellipticæ, q. et fibræ vel radus h. len. t. c. s. a centro in periph. riam extensis. „Adj. nxit vir hu. an. sinus egregias figuras, æqu. bonique h. b. ut easdem cum publico committerem.



MISSU III.

§ VIII. pag. 7. lin. 2. Requies add. Du Tertre Tom. II. p. 202. & eundem p. 224. de pite qui dicitur pite, requiem egregie vocante.

— lin. 6. non tamen omnibus add. vid. Olear. Gott. K. Kammec t. 24.



MISSU III.

† 24. f. 5. *Lindfob* parte 4. cap. 4. *Mandelio* cap. 13. du *Tertre* pag. 202: Ces dents ne sont pas icriblables ny egales en tous.

§. VIII. p. 7. *lin. 12. add.* On trouve dans la tête deux ou trois cueil-
leres de cervelle blanche, comme neige, qui étant séchée, mise en
poudre, & prise dans du vin blanc, est excellent pour la gravelle, du
Tertre p. 202. Sic autor lapides, de quibus missu II., pro cerebro ex-
siccat & indurato habuit.

— *lin. 22. add. conf. Phil. Trans. No. 299. p. 124. seq. Arif.*
Lib. 6. c. 8. & 10. *Æliam* L. 1. c. 18. *Ritteribus* comm. in lib. 1. Halicut.

§. IX. p. 7. *GALEUS add.* *Galeus* non est nomen proprium, inquit
unt *Massarius* & *Charletonus* mant. anat. p. 82, sed genus ad omnes
cartilagineos longos spectans, ut: vulpeculam, caniculam, Hinnulum,
Stellarem, Spinacum & reliqua generis ejusdem.

— p. 8. *lin. 2. a fine: picked dog add.* The prickly Houndfish,
nonnullis Hogfish. Succis: *Hol. Linn. P. Sv.*

— p. 9. *lin. 25. add.* The smooth-skinned Dog-fish; *Cornub. a*
Plat'her.

— p. 10. *lin. ult.* Sea fox or spee *add.* the Sea fox Hound; alii *Siniama*
marinam the Sea-she diverfium volunt esse *Galeum* a vulpecula marina;
huc trahunt galei genus *Cluiffi*, *Willagbb. t. B. g. f. 6.* Sed *Cluiffi* figura
nobis valde suspecta.

— p. 11. *not. f.) add.*

Vivum animal vulpis parit, in semetque receptat,

Praque metu magno protegit ore lucos.

Mirus amor, species si quantum parvus eorum

Qui propriis fraudant quos genere bonis. *Bouffartus.*

6 VII. pag. 17. *lin. 25. Angli. add. the Ponk, Pond, Devil-fish,*
Fishing-Frog, Charlet.

— *lin. 29.* Sub majores pinnas duo quasi brachiola in longum
p. sita per cavitatem, quæ fertur ad branchias, articulata & musc. le
adornata; *Severin* Zootom. part. IV. p. 248. Anatonien vide apud
Charleton mant. anat. De ossibus auditoris nervisque eundem p. 82.
Si folliculi fellis particula vel cicoris magnitudine assumpta, horrenda
symptomata infert; sed præiens est remedium cancer marinus contusus
& cum vino propinatus.

— p. 27. post num 9. *add.*

10. *Butrachus fuscus*, ore amplo, duobus my-
stacibus ad nares; oculis minimis; corpore complanato, in medio dorso
non nihil elevato; loco pinnarum branchialium ad foramina utrinque
os pro brachio habet arcuatum, compressum, in utraque acie spinis in-
curvis serratum; unica pinnula triangulari in dorso ubi cauda incipit; paulo
L 5 supra

MISSU III.

supra hanc ad latera alia pinna utrinque; cauda praelonga angulosa in teretem cum tenuibus filamentis exeunte.

11. Batrachus præcedenti similis, fed major, ex fusco & albo variegatus, insularibus crassioribus, oculis pro volumine corporis magnis, caudæ in exitu distincte filamentosa. Amborum figuras vide Missu V. §. XLII. tab. IV. f. 7. 8.

§. XIV. p. 13. lin. 9. a fine; Plinii; add. Orbis non spinosus *Beisleri*. — p. 19. lin. ult. Mus. Adolpho Feideric. p. 31. t. 2. f. 4. lin. 12. add. Poisson armé du Terre II. p. 209. Se sentant arrêté — & voyant, que toutes les violences ne lui servent de rien, il employe la ruse, il baise tout à fait les pointes, souleve tout son vent dehors & devient flasque, comme un grand mouillé.

— p. 20. lin. 11. a fine add. Cochon de mer; Coiffe; bourse, du Terre II. p. 211. tres particulier dans sa forme: car vous diriez, que ce sont trois cartons pointus, appliques les uns contre les autres en forme de triangle; le haut de ce triangle n'aboutit pas tout à coup jusques à la gueule. Quand il est pris il grande comme un cochon.

— p. 21. post num. 24. add. 24. b. Crayracen gibbosus; pisciculus amboenis triangularis, gibbosus, ossibus & lateribus undique spinosus, Rayssé Th. I. anim. Tab. VI. fig. 1. lit. D.

— p. 22. post num. 28. add. 28. b. Crayracen quadrangulus; poisson de Coiffe. Il est à peu près quaré, plat de tous côtés, & dur comme du bois; jaune, semé de petites taches noires; ayant aux deux côtés de la tête une petite nageoire, & une troisième sur le corps proche de la queue. *Le Draya Voy.* edit. Amstel. in fol. p. 344. t. 204.

— p. 23. lin. 5. Moie, add. vel quod informem molam representet, vel quod rotunditate corporis, dentis pinis uole molenam similem, secundum *Rondelet*, Orthogoriscus, forte ob similitudinem quadam porci nam Lacedæmonii lactantem porculum *Ophægætes* nuncupabatur, quod mane prostrarent in foro venales; & hic piscis, cum capiatur, porcorum more grunire solet. *Charlet.* de diff. pisc. p. 9. vid. t. *Plinius* Lib. 25. c. 2. de orthogorisco Lacedæmoniorum. *conf. Bonifacius* de nat. aquat. p. 179. Optimum figuram superirine largitus est de historia naturali meretricibus *Seneca Plancus* arimaneis.

— p. 23. lin. 19. per foraminula; add. vid. *Albrandus*; qui de Dracunculo *Rondeletii*: sine ulla ad brachia scissura, sed huiusve supra caput utrinque foramen est, ut in *Hippocampo*, quod nisi dum piscis vivit, eoque aquam trahit & emittit, manifestissimum est. Sed vid. *Missu IV. §. XXVI.* Corythionem 10. Aliter *Severinus* Zootom. parte IV. p. 351. Sub ossibus autiformibus branchiæ latent. Bipartitum est ejus corpus. Pars altera, quæ supra anum, pars altera, quæ infra.

Super.

MISSU III.

Superior tota contesta munitaque cortice toti corpori communi. Inferior ventres cæteri veluti lacum, sed hic uterus consistit; ibi ventriculus cum hepate, intestino, vesicula, renibus, corde. Anus initio facili se offert non facile conspicuus; viviparus est, si quis præcipue impexerit.

§. XVI. p. 25. post num. 7. add. 7. b. Caprificus, e regione pinarum lateralium in dorso aculeo, altera acie serrata. Pisciculus *Amboenis* cornutus, *Ruyssé* Th. anim. I. Tab. VII. f. t. lit. E. Sinus angustus, in quo cornu scilicet insinuat, lit. F.

§. XVII. p. 27. lin. 1. add. La Murene est une espèce de Serpent marin, qui a la forme d'une anguille, mais moins ronde; du Terre II. p. 220.

— lin. 9. add. Serpens marinus, *Beisleri*. *Aristoteli* *halæon*; & Hydrus. *Ælianus* sabulam fert, quod tantæ sit magnitudinis, ut tres milia apprehensas evergat. Similem nobis propinat *Olaus M.* Circa Norwegiam 200 pedum longos viros esse hydros, tantis aliquando supra mare spinas erigentes, ut navis per usum transire possit; secamus *Jo. Caban* architectum horti Sanitatis. De pugna serpentum aequalium cum terrestribus in regno *Genich*, ad Civitatem *Sampson*, ubi 8000 Serpentes occisi, vid. *Nic. Serpente* p. 364. *Lahar Voy.* aux Isles de l'Inde-rique V. p. 335. piscis memuit congruissimis, ignoti omnibus; capite compresso serpentino aut latius longo & quasi filamentoso, corpore crasso, 3 pedes longo, cauda lata & furcata, dorso pinna, præter reliquas donato, dentibus longis nigris; Quod nemo novit piscis huius naturam, suspensus ad arborum truncos; sequenti mane scissum erat in aquam materiam viridescentem & fœtulentam, ut non nisi corpus superfluum, cum corpus antea visum optime consistentem — propter hoc phenomenon pro viperæ marini habitus.

— p. 27. lin. 12. a fine; mandibula superioris. add. *Maillet* par *Maistre* description de l'Égypte II. 118: Ce qu'il y a de surprenant, c'est, que dans cette quantité étonnante de poissons, il ne se trouve gueres que l'anguille, qui ressemble à ceux, qu'on prend dans nos rivières d'Europe. Il est vrai cependant, qu'en Décembre, en Janvier & Février on pêche ici de tres bons Harangs.

— lin. 3. a fine p. 343. add. *Aristot.* L. IV. cap. XI: Anguilla neque mas neque femina est, neque prolem ex se aliquam potest procreare — & L. b. VI. c. IV: habent mares omnes semen generale præter anguillum, quæ neutrum neque ovum neque semen fortia est. *Geor. Erenus* N. C. G. Obs. 119. „Anguilla esse viviparas, viperarum inftar, observatio una atque altera in hollandia me docuit — unde cum somnam præteream, quæ illas effaret, illas vidi extrahere, nescio quid,

MISSU III.

„quid tumidi ex anguilla, ex qua dum quærerem, quidnam esset, illa
„annuebat, esse utrum, quo aperto varie in diversis membranis invo-
„lute hærebant anguille, ex quibus cognovi illa esse annuenda & i-
„multis viviparis &c. „ Nos vel Stomachum vel partem intestinorum, u
„tulle illud tumidi quid, in quorundam membranis hærentur hæc veniculi
„anguilla tormes, quales ad osia petrola plocane observavimus, vid. Müll. p
„five revera proles anguillarum ex ovis pollitis excludit & devorant, quod
„non videtur, cum & Lucii pullos suos devorant. Sed vide *Adam-
„vium* opere diversis Tom. I. p. 223 seq. & ibid. p. 244, ubi contra *Fle-
„mum* scribit: „effere colā vergognola ad un filiofio lo stabilire un
„fenoumo di tanto pejo sopra l'asserzione d'una donna, la quale annue-
„bat: esse utrum, „ Paulinus de anguilla p. 57: Nos, ut omnia ani-
„mala ex ovis seu feminis suis, sic etiam anguillas ex iis nasci dicimus,
„ficut *Plinius*, *Aristot.* *Jo. Vassus* (lib. 4. Idol. c. 1. p. 128) *Schottus*
„phil. cur. lib. 10. c. 5. p. 267. cum pluribus aliis, ova seuque decen-
„gent, clumantes, nunquam aliquam captam esse, que aut semen genitale
„habuerit, aut ova — & p. 60: nec ex purcedine aut limo, aut cadave-
„ribus, nec ex serpente complexu, nec ex arena viscosa, nec cespiti-
„bus roris madidis, sed ex sui generis femine mediante coitu omnes na-
„scentur anguille; conf. *Frantzii* hist. anim. sacra III. c. 1. p. 600; & de
„la *Marre* trinité de la police Tom. III. lib. V. E contra *Leuwenboeck*
„(Trans. phil. No. 377 p. 242) anguillas (prout etiam *Squallas*, pisces
„conelater NB. & varas mules) omnes femellas esse iustine, que fructus
„edunt hac in parte convenientes cum fructibus arboris, quorum in se-
„minibus plantule delitescunt; Sic hermaphrodites dixeris anguillas;
„conf. *Hist. de l'academ. des Sciences* 1737. p. 51. dunc Carpe herma-
„phrodite. Nescio, quare pisces coubator, id est: conchyliis marina &
„fluviatilis *Leuwenboeckii* hermaphrodita esse sustineret, quod in co-
„chileis terrestribus omnino negaret, harum feminis ovarium est, unde
„penis, quæque congregiuntur, & in congressu prout omnes coherant.

— ad fin. p. 17. add.

7. *Conger* squamis rhomboideis, ex rufo cinereis, saturate fuscis & lu-
„xulis, decurrentibus, distinctis; ventre albicante; capite & pinnis la-
„teralibus, prout in anguilla; lingua bifida. Caudam versus supra & infra
„emergunt pinnae tenuibus spinis insulse, confluentes demum latifusca-
„lam formant caudam, murena æmulam. Murena seu conger africanus,
„Seba II. p. 71. t. 69. No. 2.
8. *Conger*, pinnis lateralibus emigentibus, flavescens, nigris lineolis
„maculatis; ex luteo cinereis, viridibus & saturate rubris maculis partim
„rotundis partim flammæ in corpore sibi invicem permixtis; utrinque a
„capite ad tumidum usque & acuminatæ caudæ apicem bini decurrunt,
„albi-

MISSU III.

„albantes gracilesque, lennisci (Zander); venter dilute flavescit, nigris
„que deliis lineolis postum decurrentibus, punctis quasi intertextis densis
„variegatus. Murena maxima, orientalis, lingularis; Seba lib. num. 3.

9. *Conger*, robusto corneo, acuto; pinnis lateralibus colore coarctatis; lu-
„perno corpore dilute flavo, maculis circularibus ex rubro luteis, nigri-
„dis ad instar; venter ex cinereo dilute flavet. Anguigena; anguilla
„marina tigrina, Seba II. p. 40. t. 40. f. 9.
10. *Conger*, quinque funiculis thalassini coloris per dorsum rufum proten-
„sis; squamis ventralibus insignibus rufis; pinnulis coarctatis. Seba ibid.
„f. 4.

§. XX. p. 28. lin. 8. MURENA add. In tanto honore à romanis
„fuerunt habitæ, ut iis magno summo vivaria edificarent, magno imple-
„verint, & tandem magno aluerint; *Charleton*

— p. 29. post num. 5. add.

6. *Murena*, ex rufo flavescens, in oculis luteis r. lris superne; inferne
„cinereo rubore; in oculis circularibus gemma terete dispositis; ventre
„cinereo luteo cinereo, per dorsum & cinereo creta decurrit pinna, qualis
„in murena caprellenensis capite serpentina. Serpens marinus, seu
„murena maculatus, africanus; Seba II. p. 71. t. 69. n. a.
7. *Murena* saturate fusca dilute viriditate adeo elaborata, ut characteres
„arabicos punctis nigris conspersos & in se mutuo, flammæ ad instar,
„confluentes & variegatos putaret. E medio corpore, caudam versus
„supra & infra emergunt pinnae longæ, quæ demum concurrentes in in-
„tricatam caudam terminantur. Seba II. p. 72. t. 69. f. 4. *Mars* f. 9. *se-
„murena*. In hac prævolat color dilute viridis, prævalent quoque plures &
„mutabiliores macule nigre.

§. XXI. p. 29. lin. 11. derivatur. add. velti fulgore, quasi lampas pe-
„tre nomen derivat *Charleton* exere. de pisc. p. 34

§. XXII. p. 30. lin. 8. Neunugen add. Polonij: Minag, Węgor-
„zyca.

— ad num. 4. add. Hone *Rajus* apud *Will.* in app. p. 18.
pro *Platys* pride fluvii litoris, pro *Schwenkfeldii* *Lampetra* medæ & pro
„illo qui nigro numero in *Mertens* fluvio, *Lanceltram* a *Cesira* diri-
„mente, capitur, habet.

— ad num. 4. add. *Lampetra* minima ænola *Schwenkfeldii*,
qui cum pro *Lampetra* minima a *Gesneri* apud *Will.* in app. p. 18.
pro *Platys* pride fluvii litoris, pro *Schwenkfeldii* *Lampetra* medæ & pro
„illo qui nigro numero in *Mertens* fluvio, *Lanceltram* a *Cesira* diri-
„mente, capitur, habet.

§. XXIV. p. 31. ad num. 1. add. venetus, ne in foro picatone ven-
„datur, cautum est.

M

§. XXIV.

MISSU III.

§. XXIV. pag. 31. ad not. a.) add. Moniteur de Reanmur a developpé le mystère du ressort caché, qui produit cet effet surprenant (mirabilem hanc *idiotayopas*) dans la Torpille; *mem. de l'acad. des Scienc. 1714.*
— ad not. b.) maculis saltem; add. vid. *Grevinus de venenis Lib. I. cap. XXXIII. XXXIV.*

§. XXV. p. 32. lin. 16. cum *Parda*, add. vid. *Miff. IV. §. V. not. d.)* de l'ucio-Petta; & *Tragelapho* animali quadrupède, que dicuntur animalia nuxta. Melius *§. Caput raron* de Hippelapho, p. 65, quod sit *fas* quidem generis, sed mixta forma.

§. XXVI. p. 33. ad num. 1. add. Du *Terre* altera species singularis *Rajæ Tom. II. p. 217*: Il a au haut de sa queue deux dardillons en forme d'aiguë, dont les piqueures sont mortelles; an, *Lejebatus* 3?

— ad num. 3. add. *Bastinaco* *rayon*—Caudam habet longissimam & levissimam; e medio caudæ aculeus procedit acutus utrinque ferratus; *Grevin. de venen. Lib. I. c. XXXI*; parvos habens oculos, & ob visus aciem *obscure* dicta. An *Raja* an *passinus* sit? cuius dux *Terre* meminit II. p. 217. *Rajæ* prima species singularis, que sit prius a S. Christophe en 1634 — Sa grandeur étoit de 12 pieds depuis la tête jusques à la queue, & dix d'un aileron jusques à l'autre; & *Argensola* de Insul. Molucc. lib. 7. *Rajæ* mentionem facit ad Insulam *Cernæ* capax, que tantæ magnitudinis fuit, ut omnibus quinque navium sodalibus pro duobus prandis sufficeret.

— ad num. 4. add. The *poysón fish*, the *Fire Flaco* or *Catfish*; *Charlet.*

— p. 34. ad num. 7. add. The *Hornely*, &, obsecro nomine, *white-cunt* and *Flare*. *Mucola* & *Bayola*, *romants.*

— ad num. 10. add. The *Sting-Ray*.

§. XXVII. p. 35. ad num. 1. add.

Pulsis illa quidem *lethalia* vulnera figit.

Piscantes si quando viros suæ acuminis caudæ

Percutit, aut *lesæ* cum ramis arboris hæret. *Nitander.*

iberisca.

— p. 36. ad num. 5. add. *Raja Sabiani* f. 140. *Raja* proprie dicta *Bellen*, the *Thomback* *Shane* It. *Jam. II. p. 277*. *Succ. Râcha*, *Lin. F. Sv.*

§. XXXII. ad lin. 12. p. 42. add. De ovario ovisque *Rajæ* confertur *Charlet. Exerc. p. 10*. vide *Rajæ* Th. I. Tab. III. ibi: fig. II. factum *Rajæ* extra testam parte supina visum & sectum *Rajæ* prone parte, sed in testâ sua maxima parte adhuc contentum f. III. cum ovo *rajæ* succoranda & testa delumpto f. VI. evoke in testa f. IV.

MISSU IV.

§. I. p. 2. nota c) lin. 12. a fine, *Sorices* aquatici &c. add. Quis dixerit *ARDEAM amphibium* cum *Sennerto* in *Epist. scient. nat. lib. 7. c. 10. p. 668*, quod velicatur pulcibus & conchyliis? Sic *Jonston*, & *Schoetus* *CVGNUM* in numerum amphibiorum reulerant. *Grammondus* *hist. gall. ad a. c. 1617 p. 178*: *OLOR* amphibium animal est &c.

§. V. p. 8. ad finem note a) add. M. *Deslandes* traité sur la pêche des *Saumons* p. 177: Les *Saumons* sont couverts de petites écailles — Il est vrai que quelques autres poissons en manquent tout à fait; mais on remarque, que leur peau, si on la considère bien au microscope, n'est elle même qu'un assemblage de petites vives, qui échappent aux yeux.

§. VII. p. 11. ad note a) n. l. *Silurus* hodie *agracis* &c. sic vocatur, tanquam per aperturam, pro *Oxyrinchus*; & *Oxyrinchus* *Calpis* *Sturio* v. d. u. potat. *Gen. IV. p. 666*.

— p. 13. lin. 6. indistincte lect. onem. add. vid. *tamen* *Joannis* c. 4. p. 19 circa finem. *Diplan* per sum expirant & refrigerantur *littum*, cui autem pro ore utuntur *Sturiones*, quum — per naves & parvas *branchias* aerem pro vitalibus refrigerant &c. attendunt; & p. 21: preter *fidulam* oris *branchias* manille *littum*, quamquam parvas & angustas; si illas tantæ mole vixi comparemus.

— lin. 13. a fine; *Stercoris* add. *Sigismundus*, liber Baro, inter cetera magni Principis *Moscovitarum* dona, nullam quoque piscium frusta insillit, aere durant: *Belgae*, *Qstetri* & *Sterled*, accepisse se scribit. *Gen. I. 4. p. 94*.

— p. 14. num. 7. add. *Anatomen* parvi *Histonis* ex *Pado* & acipenseris, qui sequitur 891, vid. in opere *Danubiali Comitiss Marfilis* *Tom. VI. Tabula XVIII. XXIII.* ille ingena ex parte ad *Histonis* *Danubiales* five acipenserem 6 & 7 referendos.

§. IX. p. 17. in fine add. *Thynnis* *Xiphias* infensissimus dicitur; vid. *Deslandes* recueil de diff. trait. de *phyl.* p. 166. & *Epistolam* ad *Do. Petr. Collinsonum* post additiones.

— p. 20. lin. 6. *branchiis* carens. add. in *summa* non nisi tres *pinnas* habens; *Averduus* *V. II. §. 10. no. 5. p. 4*. *indistincte* *Xiphis* quinque *pinnas* nec pauciores nec plures adjudicavit.

— p. 21. ad lin. 9. a fine add. vid. *Miff. V. §. XI.* ibique *Truttam* edent *littum* tertium.

§. X. p. 22. n. 6. *Salviani* *fol. 68. addit*: *Acus* *Cajii* p. 110. — An *legallus* de *mer*, ejus meminit du *Terre* *Tom. II. p. 213*? (in cuius *Bibliotheca* dederantur rarissima *Joannis* *Cajii* opuscula *Londini* annis 1590 & 1574 per *Sorcinum* & *Dominum* *excultu*, facile sibi comparabit studio *J. Jelski* *M. D.* denuo recula *Londini* apud *Car. Davis* anno 1729.)

MISSU IV.

§ XVII. p. 37. *lin. 14.* Theobott. *add.* Heilbut *Daniz.* Hellefist Norv. in mari german. ad. 130, juxta Islandiam ad 400 libras excre-
scens. *conf. Anderson.* p. 93. 94.

— *post num. 4. add.*
5. *Rhombus*, pallens laevis, oculis a sinistra, in supina parte albus; qua
fortiori pulsi & fimbrii, capite magis contracto; maculis flavis vel
aurantiis in trunco, pinnis caudaque, quae macula siccata cute evane-
scunt. *Gedan.* Glander-Botte.

§ XIX. p. 37. *post num. 14. add.*

15. *Rhomboideus* lineis sex transversis longitudinalinem lineam, arcuata
dividentibus. Passer lineis transversis notatus; *Sloane* Itin. Jamaic. II.
p. 277. t. 246. f. 2. *Raji* Syn. p. 157. A Soles of Braile of an Anony-
mus Portugal ap. Purchas; Lib. 7. c. 1.

§ XX. p. 38. *ad lin. ult. add.* Aliis, ut du *Terris*, *Labato* &c. ejus-
modi pisces vocantur Lune & Carange. La *Carange* est un poisson
blanc, plat, & qui a pourtant deux yeux aux deux cotes de la tête —
Nous avons de deux ou trois sortes des Lunes, dont les unes sont ainsi
appelées, a cause de la rondeur de leurs corps, ou des petites écailles,
qui sont autant de petites Lunes jaunes, sur une couleur bleue; d'au-
tres, a cause de leur queue, qui se termine de croissant. Ce poisson
est presque rond, & n'a gueres plus d'un pied de large, & au plus deux
ou trois pouces d'épais.

§ XXIII. pag. 42. *lin. 7. a fine.* Cottus *add.* Cottus *Salsitano* Citus.
Solut. *Archeologus*, ut *Gaza* legit Cotti *(Cottus)* nomen; alii legunt
Archeus sed qui piscis sit, haud facile intelligitur; ubi *Aristot.* Lib. IV.
c. 8. pisces audire declarat, inquit: «addo etiam pisces alios fluviantes,
» *Citoz*, nomine (cottos ut verit *Gaza*) qui sub faxis subulantur, capi-
» untur enim a nonnullis lixo percussio, sub quo latent, protinus enim
» inde exturbantur, ut qui nudant — » *Arctedus* inter nomina præci-
» pue a se recepta & *Citrin* habet (p. 72); nomen derivatur a *κίτρις*, quod
caput *Hefistia* significat, quia caput respectu corporis magni est;
cum iam inter nomina vere latina numerasset *Gadum*. Sic *Balanus*,
quod caput respectu corporis magnum habet, & plurimi *Astia* forent
Cotti.

— p. 44. *add.*

12. *Encephalobranchius* novemcetus novæ Angliæ. Cujus amplam descrip-
tionem vid. apud *Catesbeum* in appendice.

§ XXIV. p. 45. *ad lin. ult. add.* Suecis: Knorrhane, Scanis: Kno-
dang; *Linn. F. S.*

§ XXIV.

MISSU IV.

§ XXIV. p. 46. *lin. 4. a fine.* uterque fol. 71. *add.* pinna interrupta
dorsali, a vertice ad caudam usque spinola, ventrali ab ano pinnis bran-
chialibus proximo pariter longa.

— *lin. ult. Arctedi add.* Farling *Succ.* Fissling, *Linn. F. Sv.*

— p. 47. *ad num. 11. add.* Cottus alepidotus, capite polyacantho,
maxilla superiore paulo longiore, *Art.* Rot-Simpa, Skrabba, Skial rya,
Ulla *Linn. F. Succ.*

— *post num. 13. add.*

14. *Coryphæa* officulo pinna dorsali primo longissimo; Cottus, officulo
pinna dorsali primo longitudine corporis Jo. Fr. Gronovii in act. Soc.
R. Upsal. 1740. p. 121. Lyræ harvicensis, pinna dorsali longissima ma-
culis creruleiscentibus, *Peripetris* *Grazoph.* t. 22. f. 7. Trachinus maxilla
superiore longiore, pinna dorsali priora albidissima *Linn. F. Succ.*

§ XXV. p. 48. *lin. 15. a fine.* Arctedi; *add.* Spieg *Linn. F. Succ.*

— *lin. 9. a fine.* Arctedi. *add.* Benninge, *Linn. F. Succ.*
§ XXVI. p. 50. *lin. 14. a fine.* Anglis; *add.* Cyclopterus *Art.* Sju-
rygg-silk. *Linn. F. Succ.*

— *lin. 8. a fine add.* quod 1748. sum expertus, cum hunc
piscem exciserem; qui totus tuberculis rigidis horridus.

§ XXVII. p. 51. *post num. 2. add.* Du *Terris* H. p. 222. multos
vidit 1½ longos.

§ XXIX. p. 52. *post num. 1. add.*

1. b. *Encephalopus* capite serpentino, facie precedenti congener; compres-
sus; pinna aorali unica longa, humilis, aculeata ad caudam usque
furcata; altera post anum; duabus postbranchialibus; mandibula
inferiore longiore in callosam substantiam terminante; ore denato;
lingua ad instar ossis; tres pedes 7½ longus. Serpens marinus coun-
prellus lividus, *Sloane* I. p. 27. t. 1. f. 2.

1. c. *Encephalopus*, capite colubino; corpore teroti, versus posteriorem de-
crecente, pinnis omnibus ad instar papaveris foliorum tenuibus,
subtilissimis, & mollihus radis turgentibus, Microscutes (?). Tercia
d'Alto (i. e. murinus) *Marggrav.* Will. t. N. 13. f. 2.

(?) *Microscutes* *libos* *reilus* ib. 37. c. 10. gemina est papaveris capriolatus *reilus*
notum dicitur folliculus sine velis p. 11, in quo continetur ejus stratum p. 2 &
substantia tenuis capriolatus piscem *Microscutes*.

1. d. *Encephalopus*, capite viperino, maculis fuscistratum horulis hexago-
nis limitibus; pinna dorsalis primo medio prelongo, in fete tenuis-
simam excurrentem, reliquis, numero octo humilibus & decrelescentibus;
duabus pinnis gurnalibus, totidem ventralibus, unico inferne caudæ

M 3

pinna

MISSU IV.

pinnet proximo; omnibus angustis & inernibus, caudæ pinna levis iter lunata. Flicæ tereulculus; capite elevato, ad verticem sinuato; oculi prope naris in alium podii; ricu valde patulo, rectangulo, nonnisi in inferiori mandibula mobili, quæ longior, superiore caput quasi truncatum descendentem; crudeliter dentatis ambibus; dentibus in superiori utrinque quatuor, primo tertio & quarto recurvus sive caninus, secundo ad apicem angularem incurvo; in inferiore 11 utrinque, quorum extremus recurvus, in os non intrat; omnibus æquiliter cuspidatis. Coloris leviter fuscæ, hinc inde flavicantis; ad oris mandibularum parum rubet. Longitudine 8 capite ad exitum caudæ æquat 18 uncias anglicanas. Ex freco Gaditano. *Catechy* app.

§. XXIX. p. 57. ad num. 13. add. *Matthiæ*: Gobius fluviatilis; similes huic tenia marina *Salviani* f. 231.

— p. 59. ad num. 3. add. *Fundulus* Grunbl, *Morsilli* op. Dan.

— post num. 3. add.

- g. b. *Euclyptus*, varius; *Erin-Schmerling*; *Albini* *Weiss*. *Endo-Ehren*. p. 314. *Turdus* luxatilis, *Fabries*. *Sarcobius* modernis, *Kiut* *Epist-Schmerling*; hunc marem habeo.

P. S.

AD

MISSUS V. §phum V.

Typus jam expedito *Missu* V. legi in *Trans angl.* No. 478. p. 70 seqq. *Dni. Petri Collinsonii* Observata ad insulam *Wight*, in Epistola: de Cancro majore. Incertus aliquando hæsi, utrum *Cancer* sive *Pagrus*, *Tascher-Strebs*, an vero *Astacus marinus*, *Gummes*, intellexerit clarissimus *autor*? quod autem nomine anglico Crab animal appellavit, & ad *Astaco* marine sive *luxatilis*, *Lobster*, nec non ab *Astaco fluviatili* vel *lacustri*, *Crawfish*, distinxit, *Pegri* speciem esse iudico. Observationibus præmissa historia, quam ab incolis relatum habuit *Dn. autor* (*), quod scilicet *hericani* quorundam deponat *cancer*, æquale patrocinarum videtur doctrinæ *Dni. Kil. Stobei* sententiæ, quod *Astaci marini* pari ratione crustas suas deponant, quæ dentata sua mutant *Astaci fluviatiles*. Ne vero me arguere velit celebris & amicissimus *Collinsonius*, rogo, si contumaciter in dubium vocare aulam

rela-

relationem *insulanarum*, quoad *ipse*, vir perspicacissimus, non offenderit vel sibi non extrahi curaverit ex angustis & probe delectis antris sive fissuris rupium *Cancros* quosundogenitos? Nullus enim dubito, quin ejusmodi homines, vel optime famæ, de *Astacorum fluviatilium* historia (& pueris nota) *preveni* peritosos is sentiant omnes, deponentiæ cum senectæ lorice analogiam quandam intercedere inter *Cancros* marinos & *Astacos* fluviatiles, quam & omnibus crustatis communem esse credant „the way „of Growth appointed for this animal and others of the crustaceous species.“ Ecne perperis & consideratus tam figura animalis, quam structura partium, ipsaque substantia locustorum, & quæ de marum reliqua, usque dum laboro morbo opinionis: non offensum in *Cancros* crusta sua orbato, vita salva, nedum malibus suorum corporum partibus quasi difformis & in *insulanarum* coactum sive in *jur gelatum*, *Galei*, ullo tempore convertis „bring an ill-„Shopen Lump of Jelli-like substance“. Interim tamen causâ hæc & *Astacorum* & *Cancrorum* marinorum plane singularis ulteriores meretur dilquisitionem *illustrium autorum*. Hæc animalcula non apparent in tractibus pelagi juxta litora Gedomæcium. Reliqua sancta, quæ oculatissimus *COLLINSONIUS* *ipse* observavit, summam merentur attentionem, utpote quæ de mirabili talium *cancrorum* naturâ testantur. Ceterum notandum, quod in *Hamb. Magasin* Tom. II. p. 477 seqq. iuxta vocabula *Lobster* & *Crawfish* levis irreperit errata: Sie legen ihre Schuppen, wie die *Zustern*, einmahl im Jahr ab; item: Daß der *Ärösch* seine Hülse wieder hervorbringt.

(*) These hints I collected from People of good Character, whose Emloy was always amongst them.

Page 34. circa finem adde: Vesica ærea in *Lucioperca biceps*, in *Pereca* ac *Cernua* superiori extremo serotiforatus tantum.



EPI-

EPISTOLA

AD

VIRUM

IN REGIA SCIENT. LONDIN. SOCIET.

CELEBRI

DOMINUM

PETRUM COLLINSONIUM.

Nuperrime in Vol. VIII. *At. Phys. Med. Acad. Cef. Leop. Franc.* legi observationem doctae euciolam Dn. D. *Abrahami Baech* Med. Præd. Stockholmi. Acad. N. C. *Cristodomi* II. de Cornu Piscis plane singularis Carinæ navis impacto; in qua doctissimus *autor*, præter alia ejusmodi spolia, quæ *Parisiis* & *Beralini* observaverat, simile Cornu quod in *TUO* *MUSEO* servante, facili opera *XIPHIE* cornu determinandum contendit, & incidenter conquiritur, *hæc* inconstituta fident antiquorum de facinoribus *Xiphidarum* permixta narrantium in dubium vocasse (*Missis* de Pisc. IV.) cum *immodica libertate* & adeo confidenter *ausum subtilis assumeretur* Veterandæ antiquitatis observata, haud alio argumento, quam quod non (*uti nec alii recentiorum*) talia phenomena viderim.

Non est, quod vercaris, Amicissime COLLINSONE, me male habere disensum doctissimi Viri male de me informati, vel quod delibaverit rationes, quibus juxta *Xiphidarum* naturam contra *Petrum* narrata utilis sum; E re tamen esse duxi, hanc materiam enodare, TE appellans Judicem melius informatum. TU feras sententiam, cuius hæc dictione perfecta, utrum malum opus fecerim, si quando cum doctissimo *autore* in castra antiquorum pedibus eundi deliberationem procrastinaverim. Quantum fieri poterit, brevis me expediam.

Præcellentium piscium *marinorum*, Armis singularibus in capite instructorum, non nisi tria generis, diversarum plane *familiarum*, comperta habemus.

- I. NARWHALEM vel Unicornu, aliis: Rhinocerotem marinum.
- II. PRISTEM I. Serpen.
- III. XIPHIAM I. Gladium.

I. NARW.

I. NARWHAL *Physer* est, i. e. Flator, aquam hausam per fistulam in capite cum impetu rejiciens. Piscis vivos edens catulos (f), pulmonibus & reliquis visceribus offibusque præcipuis, prout quadrupedia, imo similibus organis auditoriis, denta externa aure, præditus; cauda horizontali; Sic ad Cete, vel cetaceos pisces, certo certius referendus.

Omnes pisces Cetacei, sive *physeræ*, vel habent durissimos & eburneos dentes, vel carent dentibus. NARWHALES sunt vel Monodontes vel Didontes (b); quantum modo novi.

(a) Embryonem vid. in *Physic. Th. anat. IX. t. 2. f. 5.*

(b) *Missis* V. in addit. — vid. Dn. *Anderson*, relat. de Islandia dec. p. 206. — *Zorgdr.* de integro capite *Didontæ*, Amstelredami sale conditæ, p. 33. — *Oligero* *Yuccæ* fol. 14. videtur, ut plurimum *Didontem* esse — *Didontis* restitua *Rhinoceros marinus* vocari videtur.

Ejusmodi dentes sunt vel rubinati sive *versuati*, vel læves (c), vel, si figure *Zorgdrageri* non saliant, *sinuati* (sic sequi an eligens Dctm Ermi p. 36.) Per me licet, si quis dentes velit appellare cornua.

(c) Dn. *Anderson* p. 206. *Bæch* monacærol. p. 95. *Zorgdr.* p. 33. *Kæppel* in relation.

Omnes ex superiori mandibula (d) vel *sinuiforssum* vel *meringue* prodeunt, alii intus denum exelulis prorumpunt cretuncque super alveolis suis. Eorum *substantia* quidem ossæ, sed egregie dura, eburnea scilicet, ab ossæ substantia mandibularum plane diversæ; *molarium* dentium nemo hæctenus ulla detexit vestigia.

Propter multitudinem dentium, qui radicati inveniuntur, verisimile mihi videtur, aliquando a succedentibus novis deturbari dentes *geminos* (vid. *Zorgdr.* p. 34.) quod non solum *lactarius* in annario *Societatis* *Gedonensis* depositus (e) terra ex antiquo & pessimo denno solutus comprobat, sed & *Joan. Fleischerus* apud *Wormiam*, cum dentem a Rege sibi traditum, ut philosphice calcinaret, & in hunc finem terra juxta bolm qua partem dividisset, ac sortis aliquanto reliquum concutisset, testatur, *emisse* tenellum ac novum *dentem*, majori inclusis qui fuit, figura & substantia plane similem magno isti. Ideo quoque *dentes*, qua tertiam partem, *vacatos* esse *Zorgdragerum* autumnat.

(d) Optime *Gypsiæni* ad *francium* p. 2197: Ex proboside sinistra dens proterus, stratus & acuminatus probis. *capitis* *maxæ* & *canibus* sepe velatus — Ejus basis seu radix latet in rostro sinistro pedem unum cum quatuor pollicibus; pars, qua theca seu rostra includitur, videtur esse nulla & *aspera* fuit strata, in radice intus omni turbinata, cum flexu thecæ & fusi suo inclusæ, ut moveri, vacillare vel extrahi nequeat: ubi theca vel rostro egreditur, æquat in peristipha pollicem novem, hunc *gyri* incipit.

(e) Osus rotundus cum quatuordecim fere incisive Tab. XIV.

N

NARW.

Tab.
XIV.

exhibito, quod aliquam similitudinem habet cornu cum belemnitis stuevis quæ factæ vel externæ vel internæ. Secundum *Wormium*: Rostrum Xiphie est osseum, solidum, porosum, cinereum, paulatim in acutum terminatum — ex duabus quæ laminis ossis ac duris constitutum, quarum medium NB. porosum ac spongiosum quid occupat — & nihilominus tamen optimus auter minus considerate addit: adeo durum, ut eo nares perforari possent. Tamen vero abest, ut ejusmodi præcussus piscium cartilagineorum ossis & durus in æthiops vertere, vel cum dentibus aliorum animalium, necum cum cornibus sive Elephantini, sive Rosarii, sive Babrouse comparare mihi in mentem venerit: cum substantiam omnium Xiphiarum facili opera distinguimus, eorumque æquetem & cutem, quibus obducuntur rostra, oculis manibusque tractare licet.

- (b) Ubi *Nissa* IV. §. 9. de Xiphia *Arcthemmeri* verba mea sic sonant: Cujus gladium dentem dixeris ipsi Martialis, non infere licet, ne Xiphium autem pro Martiale agnoscis? ferre ibi est de gladio auriæ, præter ipsius culpam, perperam puto, quod textus comprobatur. Me jactat, rostra, quæ sicutum gladium (de quibus supra) non habent acutitatem, vel non sunt rostra Xiphiarum, vel sunt male pila.

Collatis modo inter se tribus beluis marinis, luculentè expatiscè confido, NARWHALEM sua natura Perissotorem esse, & cum violentia in quæcumque, vel magnæ molis, corpora eue ad conficiendum; PRISTEM vero & XIPHIAM gladiatoriam didicisse artem, & stare, cadere, stare consistos, cæsumque corpore, quæ persequantur, petere. Conf. *Nissa* IV. p. 19. duellum duorum Xiphiarum.

Sed cum doctissimus Dn. D. Baechius diversa spolia piscium vidit, non quidem piscem, ego vero nec spolia nec piscem ipsos vidit, idcirco ad Dni. auctoris descriptionem (1) attentus IPSE, peripicacissime COLLINSONE, judices, cujus ex tribus beluis expostis fuerit Cornu, vidit in TUO MUSEO feruatur, quocum piscis perforaverat asserunt nati, extimam atque tabulam tres pollices crassam.

- (1) p. 261: Cornu exteras foveas calore alio — Intus caridissimum amuletum erat, solidum & durissimum, ut eenechide licet, piscium fassa magna molis. — *peru* p. 262: durissimum eo circumferentia ovalis, acutiusa tereti, laceribus nullo modo in adiem compressis, perforescendo aperturam, non secundo — p. 261: Cornu ipsum substantia ossis durissimum, castide, quæ erat amuletum — & p. 262: nullo modo flexibile, mucronis acuminatis. Talla attributa sine phænomena, me hercle, non cadunt vel in Prallu vel in Xiphie colla.

Ad perarand nulla facinora utique non solum valor armorum sed & fortitudo adeo se solent; de levioribus delictis minorem suspicamus virtutem; atque majus & minus parum ad rem faciunt. Minus viperæ usque adeo mortu suo mihi impræneret mortem, ac omnium maxima viperæ cauditione.

Urget

Urget clarissimus auctor, cornus non fuisse torosa sed *levia*; hoc quidem varietate involvit; unde est, quod nescio quæ dispositionem nostram intrarint NARWHALES *levibus* dentibus. Legi meentur verba non satis laudandi Dn. *Anderssoni* quondam Præ-Confr. Hainburg. cit. l. p. 205 *Scy.* ubi simul ad objectionem respondet, ac si Hamburgum transita Narwhalis *levia* cornua cælaris fuerint testis, quod scilicet nunquam audierit animal quoddam cum cornubus in lucem editum esse. De XIPHIA aliter res se habet, utpote cujus mandibula superior rostro notabilis ex ovo adest, constanter longior inferiore, ni piscem ex ovo perdidit; ex adverso Acus *Oppiani*, qui *Isidori Salasiani*, ex ovo inferior nobiliter longior mandibula superiore.

Non vapulabo (ut inceptus viderer) si dixerim: Antiquos valde credulos fuisse, nec rite quidem obviassè & trutinasse quum plurimas relationes longe petitis & incompletis; sic singula eorumdem aliter & obviata non appellaverim experimenta ratione iustitia & probata. Equis e. gr. sibi prohibere potest, ne pro fabulis habeat hufionolas, quæ uberrime de Delphino nobis propinquant; Silesio (extrema alia. Adum esset de veritate, si omnes veterum relationes coeca admiratione gustare velimus. Interiti tamen magnificatio antiquos, quod vel ex fabulis eorum doctior evado prævasamentis aliquando recentiorum.

Quicquid autem sit, persuasum me sentio, quod veteres Narwhalem & Xiphiam (k) promiscue Gladios vocitaverint, cum res sit comperta, ante seculum XVII. obscuritas habuisset notiones de Unicornu marino, quod NARWHAL hodie audit; non enim sunt eam, dari piscem cornu sui se ferentem, quod per secula celebri Unicornu terrestri privative competere crediderunt, quodque nonnulli recentiorum pro ara & loco extulerunt.

- (b) Quod *Strabo* mucronem rostrum significat; unde & *Galeus Philae* de *Galeata* & eam *Straboni* & *Circumplexi* *Scy.* *Extrema* *non* *committitur*. De his die non puto, quod vel *coru* vel *derum* vel *gladium* pro *rostris* habent, licet verum sit, quod ex nominum canum corio *derum* sit; itaque tituli non quidam ad spolia alteram a *Derisimo* Dn. Baechio aliunde notati: Ein Horn vom Fisch Scy, besten Haut der Chagrin, vel: Ein runder fischer Schmelz von dem Fisch Scy, besten Haut der Chagrin.

Et quid dicendum de *Strabonis* *Galeata*? vix ac ne vix quidem in Xiphiam vertendum, ne Xiphias piscis edentulus confundatur cum canibus marinis, prout titulus *Pescis* spado confundi solet cum Xiphia a *rostri*, & cum *Vulpecula* ex galeorum genere, a cauda forma (1); unde est, quod de Gladio *Nessro* non intelligamus, quæ legimus: „Xiphiam in Oceano indico in tanta augei magnitudine, ut validissimis rostris Lusitanorum navium, litora ad insularum aliquando perforant; vel apud *Plinium* *Frebio* nigro referent: „A cuius mucrone naves perissos mergi in Oceano;” vel ex *Aeliano*: „Maxima etiam Cete propellit & ulciscitur;” cum potius Xiphias, secundum *Aldrovandum* p. 333. summo opere exhorrescat fugatque

balenas, ubi, minus licet fideret, addit: „apparet itaque hoc genus piscium „ignorare sua ipsius arina, quibus se adversus balenam aliasque mars delius „tueri posset.„ Si vero balenas exheresceat, sine naves reformidabit, mi-
rum præterea audit & quid contradictorium, quod *Elhanus*: Durum adeo
atque *robustum* mucronatum *viratus Gladii* rostrum NB. gladio extincto in-
talium & in *effatus* reddi. Huc referenda, quæ de valde periculosa *venario-
ne* & de *captura Gladii Strabo* refert, telo scilicet hantato (Harpum) quo Mar-
whales & alia Cete feriri solent; rursum *Xiphias* dicitur *hamis* capi, postremo
& *retibus*, ut vult *Oppianus*. In Offio *Gedaneisum* utique capiuntur,
non quidem telo hantato nec hamis *Xiphias*, pilices ad lumen decem pe-
des æquantes (licet *Aldrovandus* nugis nugari eos perhibeat, qui 6 pedes lon-
gos describunt) sed retibus citra reium pericula, quibus irretiantur *acipense-
res* septus duodecim pedes superantes; & quid mirum? si dixerim à vero
alienum, quod nonnunquam gladio suo belum in mare facto impetu eam
perforet, sed non sine proprio vitæ damno; piscatores namque secuti *illius
maxillas ejus confringere*, navique clavo aliquo obturata viribus jam exhau-
stum e mari extrahere.„ Quidni ergo in dubium vocassim, ut fabulis annu-
meraverim, quæ ex antiquitate haui *Misſu* IV. p. 19. lit. c).

- (1) *Fregula* nobis expellat positioms barbarorum nominum piscium, quæ ser. 14. XIV. fre-
querata, uti sunt: *Aculeata* — *Asterius* — *Alota* — *Pastora* — *Coutas* — *Callopus* —
Callidolos & *Cor. illic* — *Corupis* — *Doreus* — *Gladiola* — *Gedius* — *Platinus* —
Rupopa — *Sonolus* — *Stenulus*, & perpleures appellationes, si in promptu non habeat
verisimilium circa annum 1492. Manosque quod in habundantia celebrat *Certhiola*
Pardell prope *Gedrum* affertur, non solum *piscium*, sed & *ovium* — *quodammodo*
& *verum* nomenclaturam complectens; cuius *antigraphum* iuxta *historiam* *ovium*
brevis fore tradendum & custoditæ gratia & ut obvenientia in *antiqui* *chronici* nomina
animarum piscium usitata interpretari liceat, cum publico iubens commendo.

Sane, *piscium* inprimis *historia* adhuc valde manca est, & desidia-
bunt per seculum, quibus cordi erit, verum a falsis relationibus & quando-
que obtusationibus discernere. Optandum, ne falsâ pro veris adoptantes
summa quondamque imis, quadrata rotundis, permisceamus: Hoc est, de
quo *Terentius* hoc tempore questus est: Næ, homines faciunt intelligendo,
ut nihil intelligant.

Sed, ne Patientie Tuae abutar, Vir in *Historia* naturali occupatis-
sime, Epistolæ finem impono, & ut bene valeas inque amare pergas voveo.
Dabam Gedani D. 4 Oct. æ. n. 1748.



Errata:

- Pag. 3. *lege*: GLAUCUS
Pag. 4. lin. 12 a fine *lege*: forte
Pag. 27. lin. 10 *lege*: Gobio
Pag. 35. lin. 4 a fine *lege*: interrupta
Pag. 58. lin. 5 *lege*: Scarus
Pag. 74. lin. 6 a fine *lege*: lateralliter
Pag. 80. lin. 8 *lege*: aut eu
Pag. 87. lin. ult. *lege*: illam
Pag. 89. lin. 9 a fine *lege*: Plotii.

reliqua levissima sunt.

F. 1



F. 2






Fig. I





Fig. II











































TAB. IX


F. 1.




F. 3.





F. 2.




F. 4.










F. 2.



F. 4.





F. 5.





F. 1.















TAB XIV.


















F3

F2

F1





F.5

F.4.

F.2

F.3

F.1






Fig I




Fig II






Fig III.



L. M. Salgmann sculp. Norbry





NO 81.94



Std. 122
1-5